









Bioquímica Clínica

Profa Msc. Joseana M. S. de R. Leitão




Amostras





© Can Stock Photo - csp1148501



Tipos de Dosagens Bioquímicas

Carboidratos

- Glicemia de jejum
- TOTG
- Hemoglobina Glicada
- Frutosamina

Lipídios

- Colesterol Total
- HDL
- Triglicerídeos

Proteínas

- Proteínas Totais
- Albumina

Tipos de Dosagens Bioquímicas

Enzimas Hepáticas e demais funções hepáticas

- TGO e TGP
- Gama-GT
- Fosfatase Alcalina
- Bilirrubina

Avaliação Renal

- Uréia
- Creatinina

Monitorização do Diabetes

- Glicose sanguínea
- Hemoglobina Glicada
- Frutosamina
- Cetonas na urina



TABELA – Valores de glicose plasmática (em mg/dl) para diagnóstico de diabetes *mellitus* e seus estágios pré-clínicos

Categoria	Jejum*	2h após 75g de glicose	Casual**
Glicemia normal	< 100	< 140	
Tolerância à glicose diminuída	> 100 a < 126	≥ 140 a < 200	
Diabetes <i>mellitus</i>	≥ 126	≥ 200	≥ 200 (com sintomas clássicos)***

*O jejum é definido como a falta de ingestão calórica por no mínimo 8 horas; **glicemia plasmática casual é aquela realizada a qualquer hora do dia, sem se observar o intervalo desde a última refeição; ***os sintomas clássicos de DM incluem poliúria, polidipsia e perda não-explicada de peso.

Nota: O diagnóstico de DM deve sempre ser confirmado pela repetição do teste em outro dia, a menos que haja hiperglicemia inequívoca com descompensação metabólica aguda ou sintomas óbvios de DM.

Sintomas do Diabetes mellitus

