

# Elevage des pintades

## SOMMAIRE

- 1- Température à respecter durant la période de chauffage
- 2- Alimentation
- 3- Plan de prophylaxie

La pintade vit encore à l'état semi-sauvage. On peut élever ces dernières en bandes importantes en claustration ou sur parcours. L'élevage en claustration peut se faire dans un bâtiment du type de poulets de chair à une densité de 10 à 12 sujets/ m<sup>2</sup>. Les pintadeaux sont très craintif s'entassent facilement jusqu'à s'étouffer à la moindre frayeur. L'élevage sur parcours se fera de façon que le domaine soit clôturé de toutes parts avec un grillage et faire de même un plafond.

## I - TEMPERATURE A RESPECTER DURANT LA PERIODE DE CHAUFFAGE

- 1ère semaine 38°C
- 2è semaine 34°C
- 3è semaine 28°C
- 4è semaine 26°C

## II - ALIMENTATION

On distingue trois phases :

### 2.1 - De 0 à 3 semaine

Energie : 2900 cal/kg  
Protéines : 24%  
Méthionine - cystine : 0,83%  
Lysine : 1,08%

### 2.2 - De 4 à 8 semaines

Distribution de l'aliment poulet de chair en croissance.

### 2.3 - De 8 à 12 semaines

Energie : 2950 cal/ kg  
Protéines : 17%  
Méthionine - cystine : 0,56%  
Lysine : 0,65%

### **III - PLAN DE PROPHYLAXIE**

5è et 8è jour : vitamines (Floxaïd, olivitasol)

vaccin : pestos

15è jour : sulfate de cuivre (eau de boisson)

3è semaine : Emericid ou Amprol

28è jour : vaccin : pestos

30è jour : Vermifuge : pipérazine

5è semaine : vitamines

6è semaine : polycoccidiox ou Emericid

8è jour : Vermifuge tétramisole tétramicen

10è jour : vaccin : pestos

12è jour : Tétramisole

*Source : La plate-forme de communication et de formation sur le développement durable en Afrique  
(DEVENET)*