

⑤ ميكروبيولوجيا الغذاء

No:----- Date:-----

ميكروبيولوجيا الغذاء : هو علم دراسة الكائنات الحية الدقيقة المتواجدة في الأغذية والتي لها تأثيرات مضيئة أو ضارة على جودة وسلامة الأغذية الخام أو المصنعة .

سؤال مهم : **ليه يعتبر الغذاء بيئة مناسبة لنمو وتكاثر الميكروبات ؟**
ج : غذاء يحتوي على كافة الاحتياجات الغذائية اللازمة لنمو الميكروبات .

الغذاء
← **أغذية حيوانية** : لحوم ومنتجاتها - طيور وبيض - الأسماك - الألبان ومنتجاتها
← **أغذية نباتية** : الحبوب ومنتجاتها - السكر ومنتجاته - الخضروات - الفاكهة
بالإضافة إلى : التوابل - البروتين الميكروبي (الفطريات - الطحالب)

* **الكائنات التي تتواجد بها قد تكون متناهية الصغر Micro أو كبيرة نسبياً Macro ومنها :** البكتيريا - الفطريات الخيطية - الخمائر .

* **تلوث الأغذية** : احتواء الغذاء على ما يجعله غير صالح للإستهلاك الآدمي ، من كائنات حية دقيقة ضارة أو مواد كيميائية سامة أو مواد مشعة قاتلة أو بعض نواتج التحلل الغذائي الميكروبي الضار .

← **يسبب التسمم + العدوى** ← **الحرض الغذائي**

وممكن **يسبب الفساد الغذائي**

مصادر التلوث : مصادر بيئية ← **النبات - الحيوان - التربة - الماء - الهواء - الماء الصالح للشرب**
مصادر التلوث أثناء التداول وعمليات التصنيع

* **حفظ الأغذية** : استخدام طرق لحفظ جودة الغذاء وقيمته الغذائية وملائمته للتناول .

← **طب بنعلها ليه** : لبعده مناطق الإنتاج عن مناطق الاستهلاك - للحصول على المواد الغذائية في غير موسم إنتاجها - لوجود تجمعات سكانية معزولة .

❖ الأسس العامة لحفظ الأغذية :

- ١- منع أو تأخير التحلل الذاتي للأغذية عن طريق:
 - ⓐ منع أو تأخير نشأ لم إنزيمات الغذاء.
 - ⓑ منع أو تأخير التفاعلات الكيميائية في الأغذية.

٢- منع أو تأخير التحلل الميكروبي للأغذية :

- * منع التحلل
 - ← إزالة الميكروبات
 - ← قتل الميكروبات بالإشعاع ودرجات الحرارة العالية
 - ← منع إعادة التلوث عن طريق التغليف الجيد
- * تأخير التحلل
 - ← إطالة فترة Lag phase
 - ← جعل الظروف غير مناسبة
 - ← إطالة generation time
 - ← استخدام أغذية تحتوي على عدد قليل من الأحياء الدقيقة المسببة للفساد
 - ← الحرص على عدم انتقال الميكروبات من الأدوات الملوثة للأغذية

٣- منع الفساد الناتج عن الحشرات والحيوانات والتعبئة .

❖ طرق الحفظ :

- ← إزالة الميكروبات
- ← التبريد
- ← التجفيف
- ← التحفظ تحت الظروف اللاهوائية
- ← التعبئة تحت تفريغ (تفريغ الهواء) ، التعبئة في وجور
- ← نسبة من غاز CO_2
- ← استخدام درجات الحرارة العالية
- ← الغليان - البسترة - التعقيم التجاري (بالبخار تحت ضغط) - Ultra high temperature (UHT)
- ← استخدام درجات الحرارة المنخفضة
- ← التبريد - التجميد
- ← التجفيف الشمسي - باستخدام الحفقات الصناعية - بالتجميد
- ← التجفيف أثناء التدخين
- ← بالحفظ بالإشعاع
- ← بالأشعة الكهرومغناطيسية أو الفوق بنفسجية أو المؤينة
- ← بالمواد الحافظة
- ← المواد الحافظة الكيميائية
- ← bio - preservatives
- ← تكسير الخلايا الميكروبية ميكانيكياً
- ← الطحن - استخدام الضغط العالي
- ← استخدام طريقتين أو أكثر من الطرق السابقة

الحفظ بدرجات الحرارة العالية :-

الفكرة راجعة إلى تجلط بروتين الخلية الميكروبية - تلف الاحماض النووية -
تنشيط نشاط الانزيمات الخلوية اللازمة للتنشيط الغذائي للميكروب فبالتالي تعمل على قتل
الميكروبات .

* التعبير عن مقاومة الميكروب لدرجة الحرارة العالية من خلال :

① Thermal death point : أقل درجة حرارة تقتل جميع الخلايا الميكروبية في مدة لا
درجة الحرارة القاتلة أو الحمية تزيد عن ١٥ دقائق .

② Thermal death time : هو الوقت اللازم لقتل عدد ثابت من الخلايا الميكروبية
الوقت الحميت عند درجة حرارة معينة تحت ظروف معينة .

* العوامل المؤثرة على المقاومة :
← مهمة جدا

① العلاقة بين درجة الحرارة والوقت : كلما انخفضت درجة الحرارة ، كلما طال الوقت
اللازم لقتل عدد معين من الميكروبات (علاقة عكسية)

② العلاقة بين عدد الخلايا والوقت : كلما زاد عدد الخلايا الميكروبية ، كلما طال الوقت
لقتلها على درجة حرارة معينة (علاقة طردية) .

③ الظروف المحيطة بالخلية : كلما كانت مثلئ كلما زادت مقاومة الميكروب
لدرجات الحرارة المرتفعة .

④ مكونات المادة التي تسخدمها الخلايا : كلما زاد المحتوى الحائي للغذاء كلما
زاد تأثير الحرارة العالية لقتل الميكروب لأن ماء موهل جيد للحرارة
وتقاوم الخلايا الحرارة العالية عند درجات PH القريبة من التعادل والعكس
عند ارتفاع أو انخفاض درجات PH

البسترة : معاملة المادة الغذائية على درجة حرارة أقل من ١٥٠ درجة مئوية لقتل
أقوى الميكروبات المرضية المقاومة لدرجات الحرارة العالية *Coxiella burnetii*
← تستخدم في حالة الأغذية التي تتغير خواصها مع درجات حرارة أعلى من ١٥٠°م -

عندما يكون الهدف قتل الميكروبات المرضية - عندما تكون الميكروبات
غير مقاومة للحرارة - عند تصنيع الأغذية التي تستخدم فيها الميكروبات
كبإدوية .

* طرق البسترة :

① البسترة السريعة High temperature / short time method : تسخين الغذاء على

درجة حرارة 71.7°C / 15 ثانية .

② البسترة البطيئة Low temperature / long time method : تسخين الغذاء على

درجة حرارة 62.8°C / 30 دقيقة .

* البسترة غير كافية لقتل الجراثيم البكتيرية والميكروبات المقاومة للحرارة thermophilic microbes

فينهل شوية حاجات ثانية عشان زطول فترة الحفظ ومن الحاجات دي :

* التبريد

* جعل الظروف لاهوائية

* إضافة تركيز مناسب من المواد الحافظة

(نقدر نستغنى عن المرحلة دي)

✓ التعقيم التجاري : معاملة الغذاء على درجة حرارة أعلى من 100°C درجة مئوية لقتل

أقوى الجراثيم البكتيرية المقاومة للحرارة العادية Clostridium botulinum

تقاوم البسترة

المسببة للتسمم الغذائي ← التسمم البوتيوليني botulism

✓ التعليب Canning : حفظ الغذاء في علب مغلقة من الزجاج أو الصفيح

الصلب بعد معاملتها بالحرارة لمنع إعادة تلوث بعد التعقيم .

علل/ تفسر علب الصفيح من الداخل بحادة القصير؟ لمنع التفاعل بين معدن العلب

والحوضنة الموجودة في الغذاء .

✓ خطوات التعليب : ١) تجهيز المادة الغذائية : الفرز - الغسيل - السلق Blanching

في الخضر لتبسيط نشاط أنزيمات الغذاء لوقف التحلل الذاتي

للغذاء

٢) ملئ العلب : مع مراعاة Head space متوسطها = 0.25 بوصة لو كانت

أكبر من هذه القيمة فعند التسخين ثم التبريد تنكس العلب

أما لو كانت أقل والعلبة مغلقة لأخرها فعند تسخينها تنفجر وتتفجر

٣ - التسخين الأولي للتخلص من الأكسجين الذائب في الغذاء ٤ - الغلق

٥ - المعاملة بالحرارة ٦ - التبريد المفاجئ إلى 35°C درجة مئوية للحفاظ

على الغذاء من الفساد عن (الميكروبات الثرموفيلية)

Ultra high temperature : معاملة الحارة الغذائية على درجة حرارة عالية 138°C لمدة 2 ثانية

الفرق بين : thermophilic ميكروبات محبة للحرارة ، درجة حرارة العالية هي المحلى لنوعها .

thermoduric ميكروبات مقاومة للحرارة ، تقاوم درجات الحرارة العالية ولكن لا تنمو عليها وتنمو على الدرجات المعتدلة . تقاوم البسترة

الفرق بين : Mesophilic ميكروبات محبة للحرارة المتوسطة ، لا تنمو إلى في درجات الحرارة المتوسطة وتنمو في العالية .

thermoduric ميكروبات مقاومة للحرارة ، تقاوم الحرارة العالية ولكن لا تنمو عليها ولا تنمو وتنمو على الحرارة المعتدلة . تقاوم درجات حرارة البسترة

Food Spoilage فساد الأغذية : أي تغير يطرأ على الغذاء يجعله غير مقبول للاستهلاك .
خلي بالك ازاي اعرف مدى صلاحية الغذاء : ① أن يكون في مرحلة النضج المرغوبة للاستهلاك تختلف حسب العادات والتقاليد

② خلو الحارة الغذائية من الكوث عند مراحل النضج والتداول

③ خلو الحارة الغذائية من التغيرات الغير المرغوبة

* الأغذية حسب الفساد : ① أغذية سريعة الفساد ، تحتوي على نسبة مرتفعة من الرطوبة ، مثل : اللبن ، اللحوم - معظم الخضروات والفواكه

② أغذية قابلة للفساد بدرجة متوسطة ، تحتوي على نسبة أقل من الرطوبة ولها قشرة سميكة تحميها من تأثير الميكروبات مثل : البطاطس

③ أغذية غير قابلة للفساد إلا في حالة الإهمال ، تحتوي على رطوبة منخفضة جداً مثل : السكر والأغذية الجافة

- * أسباب الفساد : ١ - نمو ونشاط الميكروبات ٢ - فعل الحشرات ٣ - نشاط أنزيمات الغذاء ٤ - التغيرات الكيميائية ٥ - التغيرات الطبيعية

① النمو الميكروبي بالمشاركة :

* التضاد Antibiosis ← علاقة تنافسية بين ميكروبيين يجعل فيها أحدهما الظروف غير ملائمة لنمو الميكروب الآخر - بإنتاج مواد مثبطة للنمو وتغير pH

* تبادل المنفعة Symbiosis / Mutualism ← كل الميكروبيين يجعلوا الظروف مناسبة لنمو الميكروب الآخر

* منفعة من جهة واحدة Metabiosis / commensalism ← علاقة بين ميكروبيين أحدهما يستفيد والآخر لا يستفيد ولا يتضرر

② خصائص الغذاء : أ) خصائص الغذاء الطبيعية والبنائية (رطوبة الغذاء)

$$a_w = \frac{\text{vapor pressure of solution (Food)}}{\text{vapor pressure of solvent (water)}}$$

معدل النشاط المائي

علاقة طردية

الماء الحر ←

ماء حر ← ماء مرتبط

* معدله له تأثير على : ① الأنواع الميكروبية السائدة في الغذاء

② الأعداد الميكروبية في الغذاء

③ Generation time لميكروبات الغذاء

④ الطور التمهيدى للنمو الميكروبي

* ممكن خفض قيمة a_w للغذاء من خلال : التجفيف - إضافة تركيز عالى من السكر أو الملح

↓ خفضها إلى 0.6 يساعد على حفظ الأغذية

لأنها غير مناسبة لنمو معظم الميكروبات ← تقليل (الماء الحر)

(التركيب البيولوجي للغذاء)

* لا تحتوي الأنسجة الداخلية للأغذية النباتية والحيوانية السليمة على ميكروبات

* بعد الأغذية تكون محاطة بأغشية أو أغشية وقائية تمنع التلوث

الميكروبي مثل : قشرة البيض الكلسية

الغطاء الجري للمكسرات

قشور الأسماك

No:

Date:

(ب) خصائص الغذاء الكيمائية (التركيب الكيميائي للغذاء)

يحدد مدى ملائمة للميكروبات
حيث أن كل نوع ميكروبي له القدرة على تحليل مواد غذائية معينة مثل:-

① ميكروبات تستخدم البروتينات كمصدر للكربون والنيتروجين وتنمو في الأغذية الغنية بالبروتين وتحللها مع إنتاج أمونيا ومركبات كبريتية مما يسبب تعفن الغذاء Putrefaction

② ميكروبات تستخدم الدهون كمصدر للكربون والنيتروجين وتنمو في الغذاء الغني

بالدهون وتحللها منتجة أحماض دهنية حرة وجليسول مسببة ترنخ Rancidity

③ الميكروبات التي تستخدم تركيزات عالية من الكربوهيدرات كمصدر للكربون

والنيتروجين وتنمو في أغذية غنية بالكربوهيدرات وتحللها منتجة أحماض

عضوية وكحولات وغازات مسببة التخمر Fermentation

(وجود مواد مثبطة للنمو الميكروبي)

①

أما أن تكون موجودة بوفرة طبيعية في الغذاء مثل أنزيم lysozyme في البيض

تتسبب جدار الخلية الميكروبية مما يجعلها لا تنمو

مضافة للغذاء كما في حالة إضافة بنزوات الصوديوم للعصائر

②

منتجة نتيجة النمو الميكروبي في الغذاء مثل nisin الذي تنتجه بكتيريا

Lactococcus lactis

(درجة الـ pH)

Acidophiles ← ميكروبات محبة لـ pH المنخفض (تنمو في الحامضية)

Neutrophiles ← ميكروبات محبة لـ pH المعتدل

Alkalophiles ← ميكروبات محبة لـ pH المرتفع (تنمو في القلوية)

No: _____ Date: _____

٣) الظروف البيئية : (أ) الحرارة : حيث درجة حرارة تخزين الغذاء تؤثر على :

① معدل التحلل الذاتي للأغذية

② أنواع الميكروبات التي تنمو في الغذاء

بالتالي تؤثر على التغيرات الحادثة في الغذاء والتي تؤدي إلى

فساد.

Mezophilic - thermoduric -
thermophilic.

تقسيم الميكروبات حسب الحرارة :

(ب) الأكسجين : حيث يؤثر ضغط الأكسجين على ① البيئة المحيطة بالغذاء

② نوع الميكروبات التي تنمو في الغذاء

obligate aerobic هوائية صتماً

obligate anaerobic لاهوائية صتماً

Facultative اختياري

(ج) الرطوبة النسبية : أثناء تخزين الغذاء لابد أن تكون الرطوبة النسبية في الجو

المحيط $100 \times a_w = \text{Relative humidity of the environment}$

في هذه الحالة لن يفقد الغذاء رطوبته الطبيعية أو يكتسب رطوبة من الجو المحيط بالتالي لا يحدث فساد للغذاء

تفقد المادة الغذائية الرطوبة من سطحها الخارجي

إذا انخفضت الرطوبة النسبية في الجو المحيط عن معدل a_w في الغذاء

انتقال الرطوبة من الأجزاء الداخلية للمادة الغذائية إلى سطحها الخارجي

فساد الغذاء

تكتسب المادة الغذائية الرطوبة من الوسط المحيط

إذا زادت الرطوبة النسبية عن معدل a_w

زيادة معدل النشاط المائي في الغذاء

فساد الغذاء

YASSIN

متوقف الفساد الميكروبي للأغذية المحفوظة :

على ← مدى كفاءة عملية الحفظ
← المعاملات التي يتعرض لها الغذاء بعد عملية الحفظ
← حدوث تلوث بعد إجراء عملية الحفظ

أولاً : فساد الأغذية المحبسة :

متوقف على : مدى كفاءة عملية البسترة - حدوث تلوث بعد إجراء البسترة - درجة الحرارة المحفوظ عليها الأغذية المحبسة .

ملحوظة / الأنواع المحبة للبرودة *Psychrophiles* تقتل على درجة حرارة البسترة (لأن كلما انخفضت درجة الحرارة طالت فترة الحفظ)

ثانياً : فساد الأغذية المعلبة : يرجع إلى : طول مدة التخزين للمعلبات - التخزين الغير جيد للمعلبات - فساد ناتج عن التفاعلات الكيميائية بين الغذاء ومعدن العلبة - // // // نشاط الميكروبات وذلك لعدم التحام عملية تعقيم العلبة .

المرض الغذائي Food illness

أي مرض ينتج من استهلاك الأغذية الملوثة بالبكتيريا الممرضة أو الفيروسات أو الطفيليات أو السموم الكيميائية أو استهلاك أغذية سامة بطبيعتها مثل بعض الأنواع من الحشوم .

① الأمراض الغذائية الكيميائية ، تنتج من : ① استهلاك أغذية سامة طبيعياً

② استهلاك أغذية ملوثة بملوثات كيميائية مثل متبقيات المبيدات أو المعادن الثقيلة

③ الأمراض الغذائية الميكروبية : ← *Food infection* ← تناول أغذية ملوثة بالميكروبات الممرضة .
← *Food poisoning* ← التسمم الغذائي
← *Microbial food illness* ← تناول أغذية ملوثة بالسموم الميكروبية .

ملاحظات / في حالة الـ Food infection : يكون الغذاء بيئة مناسبة لنمو وتكاثر الميكروبات المسببة

أو
وسط فقط لنقل الميكروبات المسببة حيث يبدأ نموها في جسم الإنسان

(يعمل الغذاء كـ Carrier لنقل الميكروبات داخل جسم الإنسان)

(أنواع السموم الميكروبية)

١) السموم الخارجية Exotoxins : بروتينات سامة تفرز خارج الخلية الميكروبية

٢) السموم الداخلية Endotoxins : جزء من تركيب الخلية البكتيرية وهو عبارة عن Lipid A الموجود في الـ outer membrane للبكتيرية السالبة الجرام حيث الميكروب يتكاثر في الأمعاء وبعد موته وتحلل خلاياه تنطلق الـ Endotoxins.

ملحوظة / تركيب جدار الخلية في البكتيريا السالبة الجرام عبارة عن طبقتين (طبقة سكرية قليلة من الببتيدوجليكان + طبقة الـ outer membrane)

أما في الموجبة عبارة عن طبقة واحدة (طبقة سكرية من الببتيدوجليكان)

✓ التسمم العقنودي : يتسبب عن توكسين خارجي معوي تفرزه سلالات من بكتيريا Staphylococcus aureus وهي خلايا كروية موجبة الجرام موجودة في عناقيد مقاومة للحرارة - يتحمل الملوحة - لا يتحمل الحموضة.

* الأعراض تظهر بعد ١-٦ ساعات بمتوسط ٣ ساعات وهو عبارة عن اضطرابات معوية مصحوبة بقيء وإسهال ولا يحدث وفيات يتم الشفاء خلال ١-٣ أيام.

* التوكسين مقاوم شديد للحرارة ولا يتلف بالغليان لذلك يُعامل بالتبريد السريع ووضعها في الثلجة لإيقاف نمو الميكروب.

* ملحوظة / تركيب الـ outer membrane : بروتين + فوسفوليبيد + ليبوبروتين + ليبوبولي سكاريد

* يحتوي اللبن على البروتينات والكربوهيدرات والدهون والأملاح المعدنية والفيتامينات والحماة (مكونات القيمة الغذائية) لذلك يعد بيئة صالحة لنمو وتكاثر الميكروبات التي تلوثه.

البكتيريا المنتجة لحمض اللاكتيك - بكتيريا غير مرغوب فيها - ومنها بكتيريا ممرضة.

* مراحل نمو البكتيريا في اللبن عند تخزينه على درجة حرارة أعلى من 4°C لفترة من الوقت:

١- مرحلة خاصة اللبن المظهرية: ليست ذات أهمية في حفظ اللبن هي تساعد في بقاء العدد منخفض حتى يصل إلى مكان استهلاكه.

عبارة عن تناقص العدد الميكروبية في اللبن بعد حلاته ولفترة تبلغ 4-5 ساعات ثم تبدأ في الزيادة وذلك قد يكون بسبب:

- ١- بيئة اللبن رطاسب بعض الميكروبات
- ٢- وجود محرات دم يفضاء تلتهج الميكروبات
- ٣- وجود مواد ملبدة مثل Agglutinin تلصق الميكروبات ببعضها
- ٤- وجود مواد مثبته في اللبن تؤثر على نشاط الميكروبات

٢- مرحلة تكاثر البكتيريا: (خاصة بكتيريا حامض اللاكتيك مما يؤدي إلى زيادة حموضة اللبن)

٣- مرحلة تكاثر وسيارة بكتيريا حامض اللاكتيك

٤- مرحلة تكاثر الخماثر والفطريات: * تنمو معظم الميكروبات نتيجة زيادة حموضته

* نمو فطريات مثل Aspergillus - Penicillium التي تستهلك حامض اللاكتيك → تخفف الحموضة

* استهلاك سكر اللاكتوز المتبقى بواسطة البكتيريا المنتجة للحموضة المتبقية

* تنمو البكتيريا التعفنية → تهاجم الكازين فتحوله لسائل متعفن