

INEQUAÇÃO LOGARÍTMICA

Neste tipo de cenário teremos uma desigualdade em que o termo desconhecido estará relacionado a uma expressão contendo o cálculo de um logarítmico.

É muito importante lembrar que as bases destes logaritmos são números positivos e diferentes de 1. Desta forma, podemos pensar que existem inequações logarítmicas com bases maiores do que 1 e outras com bases com valor entre 0 e 1. Lembre-se de que a curva será crescente para as funções com base maior do que 1 e será decrescente quando estivermos em uma condição de base com valor entre 0 e 1. Assim, ao apontar o que ocorre com os logaritmandos, mantenha o sinal de desigualdade quando a base for maior do que 1 e faça a inversão do mesmo nas situações em que a base for um número entre 0 e 1. Além disso, é importante sempre se lembrar da condição de existência proveniente das expressões que estão nos logaritmandos, visto que os mesmos devem ser sempre números positivos. Observe os exemplos abaixo:

Exemplo:

Resolva, dentro do conjunto dos números reais, as inequações abaixo:

a) $\log_2 x > \log_2 5$

Devemos começar fazendo a condição de existência. Neste caso, temos: $x > 0$

Como a base é um número superior a 1, mantemos o sinal de desigualdade para a comparação entre os logaritmandos. Assim, teremos: $x > 5$

Fazendo a interseção entre a solução encontrada e a condição de existência, teremos:

$$S =]5, +\infty[$$

b) $\log(x - 3) < 2$

começaremos a resolução deste exemplo com a condição de existência do logaritmando:

$$x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$$

Como temos um logaritmo decimal, ou seja, na base 10, que é um número superior a 1, devemos fazer uso da definição do logaritmo para resolver a inequação:

$$x - 3 < 10^2$$

$$x - 3 < 100$$

$$x < 97$$

Fazendo a interseção entre a solução encontrada e a condição de existência, teremos:

$$S =]3, 97[$$

c) $\log_{0,1}(10 - x) > \log_{0,1}(3 + x)$

Começaremos pelas condições de existência:

$$10 - x > 0 \rightarrow -x > -10 \rightarrow x < 10$$

$$3 + x > 0 \rightarrow x > -3$$

Assim, temos que a condição de existência será: $-3 < x < 10$

Como temos uma mesma base com valor entre 0 e 1, devemos fazer a comparação dos logaritmando invertendo o sinal de desigualdade encontrado na inequação. Assim, teremos:

$$10 - x < 3 + x$$

$$-2x < -7$$

Multiplicando esta inequação por -1, teremos:

$$2x > 7 \rightarrow x > \frac{7}{2}$$

Fazendo a interseção entre a solução encontrada e a condição de existência, teremos:

$$S = \left] \frac{7}{2}, +\infty \right[$$

d) $\log_{0,5}(2x - 8) > \log_{0,5} 6$

Começaremos pela condição de existência:

$$2x - 8 > 0 \rightarrow 2x > 8 \rightarrow x > 4$$

Como temos uma mesma base com valor entre 0 e 1, devemos fazer a comparação dos logaritmando invertendo o sinal de desigualdade encontrado na inequação. Assim, teremos:

$$2x - 8 < 6 \rightarrow 2x < 14 \rightarrow x < 7$$

Fazendo a interseção entre a solução encontrada e a condição de existência, teremos:

$$S =]4, 7[$$

e) $\log_2(x^2 - 1) \geq \log_2 3$

Começaremos pela condição de existência:

$$x^2 - 1 > 0$$

As raízes deste polinômio de 2º grau serão -1 e 1. Como temos um coeficiente a positivo, a parábola que representa esta expressão terá sua concavidade voltada para cima e, por este motivo, a condição de existência será: $x < -1$ ou $x > 1$.

Como a base dos logaritmos da inequação são maiores do que 1, mantemos o sinal de desigualdade para comparar ao logaritmandos. Observe:

$$x^2 - 1 \geq 3$$

$$x^2 - 4 \geq 0$$

As raízes deste polinômio de 2º grau serão -2 e 2. Como temos um coeficiente a positivo, a parábola que representa esta expressão terá sua concavidade voltada para cima e, por este motivo, a solução será: $x \leq -2$ ou $x \geq 2$.

Fazendo a interseção entre a solução encontrada e a condição de existência, teremos:

$$S =]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$$

f) $\log_3(4x - 1) > -2$

Começaremos pela condição de existência:

$$4x - 1 > 0 \rightarrow 4x > 1 \rightarrow x > \frac{1}{4}$$

Como a base do logaritmo é um número maior do que 1, mantemos o sinal de desigualdade para aplicar a definição do logaritmo. Desta, forma, teremos:

$$4x - 1 > 3^{-2}$$

$$4x - 1 > \frac{1}{9}$$

Multiplicando esta inequação por 9, teremos:

$$36x - 9 > 1$$

$$36x > 10$$

$$x > \frac{5}{18}$$

Fazendo a interseção entre a solução encontrada e a condição de existência, teremos:

$$S =] \frac{5}{18}, +\infty[$$

$$\text{g) } \log_2 (x + 1) + \log_2 3 > \log_2 4$$

Começaremos pela condição de existência:

$$x + 1 > 0 \rightarrow x > -1$$

Voltando para a inequação, utilizaremos a propriedade de soma de logaritmos para que tenhamos no lado esquerdo da inequação um único logaritmo:

$$\log_2 [(x + 1) \cdot 3] > \log_2 4$$

$$\log_2 (3x + 3) > \log_2 4$$

Como a base do logaritmo é um número maior do que 1, mantemos o sinal de desigualdade para aplicar a definição do logaritmo. Desta, forma, teremos:

$$3x + 3 > 4$$

$$3x > -1$$

$$x > -\frac{1}{3}$$

Fazendo a interseção entre a solução encontrada e a condição de existência, teremos:

$$S =] -\frac{1}{3}, +\infty[$$

EXERCÍCIO RESOLVIDO

01. (FUVEST) O conjunto dos números reais x que satisfazem a inequação $\log_2 (2x + 5) - \log_2 (3x - 1) > 1$ é o intervalo:

- a) $] -\infty, -5/2[$
- b) $] 7/4, \infty[$
- c) $] -5/2, 0[$
- d) $] 1/3, 7/4[$
- e) $] 0, 1/3[$

Resolução: D

Temos a inequação:

$$\log_2 (2x + 5) - \log_2 (3x - 1) > 1$$

Começaremos pelas condições de existência:

$$2x + 5 > 0 \rightarrow 2x > -5 \rightarrow x > -\frac{5}{2}$$

$$3x - 1 > 0 \rightarrow 3x > 1 \rightarrow x > \frac{1}{3}$$

Assim, temos que a condição de existência será: $x > \frac{1}{3}$

Voltando à inequação, teremos:

$$\log_2 (2x + 5) - \log_2 (3x - 1) > 1$$

$$\log_2 \left(\frac{2x+5}{3x-1} \right) > 1$$

Aplicando a definição de logaritmo, manteremos o sinal de desigualdade, visto que a base do logaritmo é um número maior do que 1. Assim, teremos:

$$\frac{2x+5}{3x-1} > 2^1$$

$$\frac{2x+5}{3x-1} > 2$$

$$\frac{2x+5}{3x-1} - 2 > 0$$

$$\frac{2x+5-6x+2}{3x-1} > 0$$

$$\frac{-4x+7}{3x-1} > 0$$

A solução desta inequação quociente será: $\frac{1}{3} < x < \frac{7}{4}$

Fazendo a interseção entre a solução encontrada e a condição de existência, teremos:

$$S =] \frac{1}{3}, \frac{7}{4} [$$

02. (UFOP – MG) Resolva a inequação $\log_2 (x - 3) + \log_2 (x - 2) < 1$.

Resolução:

Temos a seguinte inequação logarítmica:

$$\log_2 (x - 3) + \log_2 (x - 2) < 1$$

Começaremos pelas condições de existência:

$$x - 3 > 0 \rightarrow x > 3$$

$$x - 2 > 0 \rightarrow x > 2$$

Assim, temos que a condição de existência será: $x > 3$

Voltando à inequação, teremos:

$$\log_2 (x - 3) + \log_2 (x - 2) < 1$$

$$\log_2 [(x - 3) \cdot (x - 2)] < 1$$

Aplicando a definição de logaritmo, manteremos o sinal de desigualdade, visto que a base do logaritmo é um número maior do que 1. Assim, teremos:

$$(x - 3) \cdot (x - 2) < 2^1$$

$$x^2 - 5x + 6 < 2$$

$$x^2 - 5x + 4 < 0$$

As raízes deste polinômio de 2º grau serão 1 e 4. Como temos um coeficiente a positivo, a parábola que representa esta expressão terá sua concavidade voltada para cima e, por este motivo, a solução será: $1 < x < 4$.

Fazendo a interseção entre a solução encontrada e a condição de existência, teremos:

$$S =] 3, 4 [$$

03. (ENEM) A água comercializada em garrações pode ser classificada como muito ácida, ácida, neutra, alcalina ou muito alcalina, dependendo de seu pH, dado pela expressão:

$$\text{pH} = \log_{10} \frac{1}{H}$$

em que H é a concentração de íons de hidrogênio, em mol por decímetro cúbico. A classificação da água de acordo com seu pH é mostrada no quadro.

pH	Classificação
$pH \geq 9$	Muito alcalina
$7,5 \leq pH < 9$	Alcalina
$6 \leq pH < 7,5$	Neutra
$3,5 \leq pH < 6$	Ácida
$pH < 3,5$	Muito ácida

Para o cálculo da concentração H, uma distribuidora mede dois parâmetros A e B, em cada fonte, e adota H como sendo o quociente de A por B. Em análise realizada em uma fonte, obteve $A = 10^{-7}$ a água dessa fonte foi classificada como neutra. O parâmetro B, então, encontrava-se no intervalo:

- $(-10^{14,5}, -10^{13})$
- $[10^{-6/7}, 10^{-1})$
- $[10^{-1}, 10^{1/2})$
- $[10^{13}, 10^{14,5})$
- $[10^{6 \times 10^7}, 10^{7,5 \times 10^7})$

Resolução: C

Temos que $H = \frac{A}{B}$. Assim: $\frac{1}{H} = \frac{B}{A}$

$$6 \leq \log_{10} \left(\frac{8}{10^{-7}} \right) < 7,5 \rightarrow 10^6 \leq 10^{\log \left(\frac{B}{10^{-7}} \right)} < 10^{7,5} \rightarrow 10^6 \leq \frac{B}{10^{-7}} < 10^{7,5}$$

Logo: $10^{-1} < B < 10^{0,5}$

04. (ENEM) A *Hydrangea macrophylla* é uma planta com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido (ou seja, com $pH < 7$) a flor é azul, enquanto que em solo alcalino (ou seja, com $pH > 7$) a flor é rosa. Considere que a *Hydrangea* cor-de-rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que $pH = -\log_{10} x$, em que x é a concentração de íon hidrogênio (H^+). Para produzir a *Hydrangea* cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma:

- qualquer valor acima de 10^{-8} .
- qualquer valor positivo inferior a 10^{-7} .
- valores maiores que 7 e menores que 8.
- valores maiores que 70 e menores que 80.
- valores maiores que 10^{-8} e menores que 10^{-7} .

Resolução: E

Como $pH = -\log_{10} x$, teremos:

$$7 < -\log_{10} x < 8 \rightarrow -7 > \log_{10} x > -8 \rightarrow 10^{-7} > x > 10^{-8}$$

ANOTAÇÕES