

FUNÇÃO EXPONENCIAL

Uma função $F : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+$ dada por $F(x) = a^x$, a constante positiva diferente de 1, denomina-se função exponencial.

$$F(x) = a^x \quad (a \in \mathbb{R}, a > 0 \text{ e } a \neq 1)$$

Esta definição provoca muitas questões:

- o que significa o símbolo a^x ?
- por que $a \in \mathbb{R}^+$ e $a \neq 1$?
- por que não se pode ter $a < 0$?
- que tipo de variação e gráfico tem a^x ?

Tais perguntas estarão respondidas quando tivermos construído a função F , a partir de sucessivas ampliações dos campos numéricos a partir de $\mathbb{N}$.

Atenção!!!! Lembre-se que:

(Potências da mesma base)

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$$

$$a^m : a^n = a^{m-n}$$

$$(a^m)^n = a^{m \cdot n}$$


$$(a \cdot b)^n = a^n \cdot b^n$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

Exemplos:

1) Seja a função $F = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y = 2^x\}$


Vamos construir uma tabela e em seguida, o gráfico.



X	Y
-2	$\frac{1}{4}$
-1	$\frac{1}{2}$
0	1
1	2
2	4
3	8

2) Seja a função $F = (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} / y = \left(\frac{1}{2}\right)^x$

Vamos construir uma tabela e, em seguida, o gráfico.



X	Y
-2	4
-1	2
0	1
1	1/2
2	1/4
3	1/8

Quando a base for 2 (o mesmo acontecerá se ela for 3, 4 ou qualquer número maior que 1), quanto maior o expoente, maior será o valor de $y = a^x$.


Por exemplo, $2^3 < 2^4 > 2^5 \dots$

Da mesma forma quando a base for $\frac{1}{2}$ (o mesmo acontecerá se ela for $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$

Ou qualquer número menor que 1), quanto maior o expoente, menor será o valor de $y = a^x$.


Por exemplo: $\left(\frac{1}{2}\right)^2 < \left(\frac{1}{3}\right)^3 < \left(\frac{1}{4}\right)^4 \dots\dots\dots$

A função exponencial será crescente, quando a base a for maior que 1 e, decrescente, se a for positiva e menor que 1. Seu gráfico terá sempre um dos dois aspectos.



$a > 1$

f é crescente



$0 < a < 1$

f é decrescente

↔

Observe que, nos dois casos, o gráfico de $F(x) = a^x$ não intercepta o eixo Ox , pois, para $a \in \mathbb{R}^+ +$, $a \neq 0$ para qualquer $x \in \mathbb{R}$.

↔

Todo gráfico de uma função $F(x) = a^x$ ($a \in \mathbb{R}^+ +$, $a \neq 1$) intercepta o eixo Ox no ponto $(0, 1)$.

Como não há nenhuma restrição, x pode variar de $-\infty$ a $+\infty$, ou seja, o seu domínio é $\mathbb{R}$.

Observe, também, como $a > 0$ e $a \neq 1$, as imagens de a^x serão sempre positivas. Assim, teremos:

$$D = \mathbb{R}$$

$$Im = \mathbb{R}^+ +$$

Mais uma vez, observe que, se $a = 1$, teremos $y = 1^x$ e que para qualquer valor de x , teríamos $y = 1$.

E se a fosse negativo, os valores de $y = ax$ (por exemplo $y = (-2)^x$) iriam oscilar entre positivos e negativos (por exemplo, $y = (-2)^2 = 4$ e $y = (-2)^3 = -8$).

Então, estes são alguns dos motivos que determinam que a deve ser positivo e diferente de 1.

Resumindo:

Conceito: $F = \{ (x, y) / y = a^{F(x)}, a > 0 \}$

Exemplos:

$$F_1 = \{ (x, y) / y = 2^x \}$$

$$F_2 = \{ (x, y) / y = 2^{x+1} \}$$

Domínio: depende da função $F(x)$.

Se for $y = a^x, x \in]-\infty, +\infty[$

Imagem: $y \in]0, +\infty[$

Se $a > 1$, y é crescente

Se $a < 1$, y é decrescente

Zeros: não possui

Variação: Se $a > 1$, y é crescente


Se $a < 1$, y é decrescente

X	$-\infty \dots -3 \ -2 \ -1 \ 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ \dots \dots \dots +\infty$
Y	$0 \dots \dots \frac{1}{a^3} \ \frac{1}{a^2} \ \frac{1}{a} \ 1 \ a \ a^2 \ a^3 \ \dots \dots \dots +\infty$


Gráfico:

$a > 1$

$y = a^x$




$a < 1$



EXERCÍCIO RESOLVIDO:

Resolva graficamente a equação $2^x = 4$



Para $y = 4$ temos $x \cong 2$. Portanto $S = \{ 2 \}$

EXERCÍCIOS:

1) Esboce o gráfico das funções $F = \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}^+ :$

a) $y = 3$

b) $y = \left(\frac{1}{3}\right)^x$

c) $F(x) = 2^{-x}$

d) $y = 2^{x+1}$

e) $F(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x+3}$

2) Sendo $x < 0$ e sabendo-se que $a^x > 1$, o que se pode afirmar sobre o valor de a ? justifique graficamente.

3) Se para $x > 1$ tem-se $a^x > 5$, o que se pode afirmar sobre o valor de a ? justifique.

1) Se para $x > 1$ tem-se $a^x < 3$, o que se pode afirmar sobre o valor de a ?

2) Se para $x < -1$ tem-se $a^x > 3$, o que se pode afirmar sobre o valor de a ?



3) Se para $x < -1$ tem-se $a^x < \frac{1}{5}$, o que se pode afirmar sobre o valor de a ?

INEQUAÇÕES EXPONENCIAIS

$F(x) = a^x$.

Podemos resolver inequações exponenciais pela análise gráfica da função exponencial

Considere os dois casos a seguir:



Observe nos gráficos que:

- Para $a > 1$ e $x_2 > x_1$, temos $a^{x_2} > a^{x_1}$
- Para $a < 1$ e $x_2 > x_1$, temos $a^{x_2} < a^{x_1}$

Vamos então estabelecer um processo de resolução de inequações exponenciais:

- reduzem-se os dois membros da inequação a uma mesma base;
- monta-se uma nova inequação com os expoentes. Se $a > 1$, mantém-se o sinal da desigualdade original; se $0 < a < 1$, inverte-se o sinal da desigualdade.

Exemplos:

1) Resolva a inequação $2^{x+1} > 8$,

Então, temos: $2^{x+1} > 2^3$

Como a base (2) é maior que 1, F é crescente, ou seja, quanto maior o expoente, maior a potência, então:

$$x + 1 > 3 \text{ ou } x > 2$$

Solução: $S = \{ x \in \mathbb{R} / x > 2 \}$

2) Resolver a inequação: $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} < \frac{1}{8}$.

Então, temos: $\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} < \left(\frac{1}{2}\right)^3$

Como a base $\left(\frac{1}{2}\right)$ é menor que 1, F é decrescente, ou seja, quanto maior o expoente, menor a potência, então:

$$x - 1 > 3 \text{ ou } x > 4$$

Solução: $S = \{ x \in \mathbb{R} / x > 4 \}$

EXERCÍCIOS

4) Resolva as inequações:


a) $3^x < 27$

b) $\left(\frac{1}{5}\right)^{x+1} > \left(\frac{1}{5}\right)^{10}$


c) $\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} = \left(\frac{1}{3}\right)^{x+4}$

GABARITO


1.a)




1.b)




1.c)




1.d)



1.e)



2)



$$y = a^x > 1.$$

Resposta: a é uma fração menor que 1 ($0 < a < 1$) porque quando x é negativo ($x < 0$) temos

$$\text{Por exemplo: } \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 2^2 = 4 > 1$$

EQUAÇÕES EXPONENCIAIS

Equação exponencial é toda equação que possui a incógnita no expoente de uma potência.

Exemplos:

$$3^x = 9$$

$$2^x - 1 = 16$$

$$2^{3x} = 512$$

$$5^{x-3} + 5^{x-4} + 5^{x-5} = 943$$

A resolução de uma equação exponencial baseia-se, de uma maneira geral, na comparação de duas potências.

Para maior facilidade, vamos classificá-las em alguns tipos e subtipos.

1º tipo

$a^x = b$

1º caso – a e b são potências de mesma base.

Neste caso teremos a comparação de duas potências de mesma base. E se duas potências são iguais e têm a mesma base, então os seus expoentes deverão ser iguais entre si.

Exemplos:

1) Considere a equação $2^x = 32$. Podemos resolvê-las reduzindo 32 para base 2:

$$2^x = 32 \implies 2^x = 2^5 \implies x = 5$$

Logo, $S = \{5\}$

2) Resolver a equação: $2^{x-1} = 16$

$$2^{x-1} = 2^4$$

$$x - 1 = 4$$

$x = 5$

Logo, $S = \{5\}$

EXERCÍCIO RESOLVIDO:

Para a equação $9^{x+1} = 27^{x-3}$, teremos:

$$9^{x+1} = 27^{x-3}$$

$$(3^2)^{x+1} = (3^3)^{(x-3)}$$

$$3^{2x+2} = 3^{3x-9}$$

$$2x + 2 = 3x - 9$$

$$x = 11$$

$$\text{Logo, } S = \{ 11 \}$$

EXERCÍCIOS

1) Resolva as equações:

a) $2^x = 8$

b) $3^{x^2 + 2x + 1} = 1$

c) $4^{2x+3} = 8^{x-1}$

d) $^{x+1}\sqrt{2} = 4^{2x-1}$

2º caso – a e b são quaisquer.

Para se resolver esse tipo de equação, necessitamos do emprego de logaritmos.

Exemplos:

1) $3^x = 5$

$$\log 3^x = \log 5$$

$$x = \frac{\log 5}{\log 3}$$

2) $2^x = 3$ Sabe-se que $\begin{cases} \log 2 = 0,30103 \\ \log 3 = 0,47712 \end{cases}$

$$\log 2^x = \log 3$$

$$x \log 2 = \log 3$$

$$x = \frac{\log 3}{\log 2} \implies \frac{0,30103}{0,47712} \implies x = 0,63109$$

EXERCÍCIOS

2) Resolver as equações;

a) $3^{x+1} = 5$

b) $2^{x+1} \cdot 3^{x-1} = 5^{x-2} \cdot 7^{x+3}$

2º tipo

$$a^x = b^c$$

Equação do tipo $a^x = N$

$$a^x = b^c$$

Neste caso, costuma-se usar o seguinte artifício: $b = y$ e, assim, sucessivamente.

Exemplos:

$$3^x = 512$$

1) $2 = 512$

artifício $3^x = y$

Então, $2y = 512 \implies 2y = 2^9 \implies y = 9$

Substituindo, temos:

$$3^x = 9$$

$$3^x = 3^2$$

$$x = 2$$

Este exercício poderia também ser resolvido da seguinte maneira:

$$\begin{array}{c}
 x \\
 3 \\
 2^{\quad} = 512
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \textcircled{x} \\
 \textcircled{3} \\
 2^{\quad} = 2^{\quad} \textcircled{9}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \textcircled{x} \\
 3^{\quad} = 9 \\
 \textcircled{x} \\
 3^{\quad} = 3^{\quad} \textcircled{2}
 \end{array}$$

$$x = 2$$

2)

$$\begin{array}{c}
 x \\
 2 \\
 2^{\quad} \\
 3^{\quad} = 81
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 \textcircled{x} \\
 \textcircled{2} \\
 \textcircled{2} \\
 3^{\quad} = 3^{\quad} \textcircled{4}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \textcircled{x} \\
 2^{\quad} = 4
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \textcircled{x} \\
 2^{\quad} = 2^{\quad} \textcircled{2}
 \end{array}$$

$$2^x = 2$$

$$x = 1$$

EXERCÍCIOS

3) Resolva as equações:

a) $3^{\frac{x}{2}} = 81$

b) $2^{\frac{x}{3}} = 8$

$$\text{c) } 5^{\frac{x}{3}} = 125$$

$$\text{d) } 2^{\frac{x}{2}} = 16$$

3º tipo

Equações do tipo:

$2x$	y
$a \cdot \infty$	$b \cdot \infty$

$$+ c = 0$$

Neste caso, costuma-se usar o seguinte artifício:

X
$\infty = y$

Assim, teremos a equação:

$$A \cdot y^2 + B \cdot y + c = 0 \longrightarrow \text{equação do 2º grau}$$

Exemplos:

$$1) \quad 7^{2x} - 8 \cdot 7^x + 7 = 0$$

$$\text{Fazendo } 7^x = y$$

$$\text{Temos: } 7^{2x} = y^2$$

$$\text{Substituindo, temos; } y^2 - 8y + 7 = 0 \quad \text{e} \quad \begin{cases} y = 7 \\ y = 1 \end{cases}$$

$$\text{Mas } 7^x = y, \text{ temos}$$

$$\begin{cases} 7^x = 7 \\ 7^x = 1 \end{cases} \quad \begin{matrix} \boxed{x = 1} \\ \boxed{x = 0} \end{matrix}$$

$$2) \quad 2^{2x} - 5 \cdot 2^x + 4 = 0$$

$$y^2 - 5y + 4 = 0$$

$$\Delta = 25 - 4 \cdot 1 \cdot 4$$

$$\Delta = 25 - 16$$

$$\Delta = 9$$

$$\text{a) } 1$$

$$\text{b) } -5$$

$$\text{c) } 4$$

$$y = \frac{5+3}{2} = \begin{cases} 2/2 = 1 \\ 8/2 = 4 \end{cases}$$

Então:

$$\begin{array}{l|l} 2^x = 1 & \text{ou} & 2^x = 4 \\ 2^x = 2^0 & & 2^x = 2^2 \\ x = 0 & & x = 2 \end{array}$$

EXERCÍCIOS

4) Resolva as equações:

a) $3^{2x} - 5 \cdot 3^x + 6 = 0$

b) $5^{2x} + 2 \cdot 5^x - 3 \cdot 5 = 0$

4º tipo

Equações onde aparecem soma de exponenciais de mesma base.

Costuma-se desmembrar as potências.

Exemplos:

1) $2^{x+2} + 2^{x+1} - 2^{x-1} = 44$

$$2^x \cdot 2^2 + 2^x \cdot 2^1 - \frac{2^x}{2^1} = 44$$

$$\frac{4y}{1} + \frac{2y}{1} - \frac{y}{2} = \frac{44}{1}$$

$$8y + 4y - y = 88$$

$$11y = 88$$

$$y = \frac{88}{11} \quad y = 8 \quad \text{Então: } 2^x = 8$$

$$2^x = 2^3$$

$$x = 3$$

2) $3^{x+1} + 3^{x-1} - 3^{x-2} = 87$

$$3^x \cdot 3^1 + \frac{3^x}{3^1} - \frac{3^x}{3^2} = 87$$

$$3^x = y$$

$$\frac{3y}{1} + \frac{y}{9} - \frac{y}{9} = \frac{87}{1}$$

$$27y + 3y - y = 783$$

$$29y = 783$$

$$y = \frac{783}{29}$$

$$y = 27 \quad \text{Então:} \quad 3^x = 27$$

$$3^x = 3^3$$

$$x = 3$$

EXERCÍCIOS

5) Resolva as equações:

a) $5^{x-1} + 5^{x-2} + 5^{x-3} + 5^{x-4} = 780$

b) $3^{x+2} + 3^{x+1} - 3^{x-2} = 321$

GABARITO

1)

a) $x = 3$

b) $x = -1$

c) $x = -9$

d) $x = \frac{-2 \pm \sqrt{25}}{8}$

2)

a) $x = \frac{0,69897 - 0,47712}{0,47712}$

b) $x = \frac{-2\log 5 + 3\log 7 - \log 2 + \log 3}{\log 2 + \log 3 - \log 5 - \log 7}$

3)

a) $x = 2$

b) $x = 1$

c) $x = 1$

d) $x = 1$

4)

a) $x = 1$ e $x = \frac{\log 2}{\log 3}$

b) $x = 1$

5)

a) $x = 5$

b) $x = 3$

AUTO – AVALIAÇÃO

1- Considere um recipiente contendo, no instante $t = 0$, um número N^0 de bactérias, se reproduzindo normalmente. Suponhamos que, a cada instante, os nascimentos de novas bactérias sejam proporcionais ao número de bactérias existentes no recipiente naquele instante.

A partir desta suposição, pode-se demonstrar que o número de bactérias num certo instante $t > 0$ é dado por:

$$N(t) = N^0 \cdot k^t$$

Onde: $N(t)$ é o número de bactérias no instante t ;

N_0 é o número de bactérias no instante $t = 0$

K é uma constante que depende do tipo de bactérias e que pode ser determinada experimentalmente.

Suponhamos, então, que, um determinado instante observou-se que havia 200 bactérias no recipiente, reproduzindo-se normalmente. Passadas 12 horas, já havia 600. Passadas mais 36 horas, quantas bactérias haverá?

- a) 5400
- b) 16200
- c) 7200
- d) 21600
- e) 28800

2) Resolva a equação:

$$\log_3(2x - 1) - \log_3(5x + 3) = -1$$

- a) 6
- b) $7/4$
- c) $-3/7$
- d) $4/7$
- e) 2

3) Dado o $\log 3 = 0,477$, calcule $\log 9000$.

- a) 2,954
- b) 3,954
- c) 1,431
- d) 3,431
- e) 0,954

4) Resolva a equação: $\frac{3^{2x}}{4} - 3^x = -\frac{3}{4}$

- a) $x = 0$ ou $x = 1$

b) $x = 1$ ou $x = 3$

c) $x = 0$ ou $x = 3$

d) $x = 1$ ou $x = 4$

e) $x = 2$

5) Simplificando a expressão:

 $E = \log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7 \cdot \log_9 8 \cdot \log_{10} 9$, obtemos:

a) 1

b) $\log_9 10$

c) $\log_3 2$

d) $\log_{10} 2$

e) $\log_2 10$

GABARITO DA AUTO – AVALIAÇÃO

1) b

2) a

3) b

4) a

5) d

FUNÇÃO LOGARÍTMICA

O CONCEITO DE LOGARITMO

Considere a potenciação $2^3 = 8$ e suponha agora dois problemas:

- Qual é o número que, elevado ao cubo dá 8?

$$x^3 = 8$$

$$\text{cuja solução é } x = \sqrt[3]{8} = 2$$

- Qual é o expoente a que devo elevar o número 2, para obter 8?

$$2^x = 8$$

Esta é uma equação exponencial (a incógnita está no expoente), cuja solução é $x = \log_2 8$, que se lê **x é o logaritmo de 8 na base 2**.

Assim, achar o logaritmo significa achar o expoente, ou seja:

O **logaritmo** de um número **N** numa base **a** (deve ser positiva e diferente de 1) é o expoente a que se deve elevar a base **a**, para se obter o número **N**.

Observação:

$$\text{Log.}_a N = x \quad \Rightarrow \quad a^x = N$$

$$\text{Log}_2 8 = 3 \quad \rightarrow \quad \text{logaritmo}$$

base número ou antilogaritmo

Exemplos:

$$\text{Log}_2 16 = 4 \text{ porque } 2^4 = 16$$

$$\text{Log}_5 25 = 2 \text{ porque } 5^2 = 25$$

$$\text{Log}_3 27 = 3 \text{ porque } 3^3 = 27$$

$$\text{Log}_7 49 = 2 \text{ porque } 7^2 = 49$$

$$\text{Log}_3 \left(\frac{1}{9} \right) = -2 \text{ porque } 3^{-2} = \frac{1}{9}$$

$$\text{Log}_5 \left(\frac{1}{25} \right) = -2 \text{ porque } 5^{-2} = \frac{1}{25}$$

$$\text{Log}_2 \left(\frac{1}{16} \right) = -4 \text{ porque } 2^{-4} = \frac{1}{16}$$

$$\text{Log}_{\frac{1}{2}} \left(\frac{1}{4} \right) = 2 \text{ porque } \left(\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\text{Log}_5 5 = 1 \text{ porque } 5^1 = 5$$

$$\text{Log}_2 \sqrt[5]{2^3} = \frac{3}{5} \text{ porque } 2^{\frac{3}{5}} = \sqrt[5]{2^3}$$

$$\text{Log}_3 \sqrt[3]{3} = \frac{1}{3} \text{ porque } 3^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{3}$$

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

2) Calcule o logaritmo:

a) $\text{Log}_2 4 = x$

$$2^x = 4 \implies 2^x = 2^2 \quad \boxed{x = 2}$$

b) $\text{Log}_{\frac{1}{8}} 32 = x$

$$\left(\frac{1}{8} \right)^x = 32 \implies \left(\frac{1}{2^3} \right)^x = 2^5 \implies (2^{-3})^x = 2^5$$

$$-3x = 5 \implies \boxed{x = -\frac{5}{3}}$$

c) $\text{Log}_{\frac{1}{9}} \frac{1}{27} = x$

$$\left(\frac{1}{3^2} \right)^x = \left(\frac{1}{3^3} \right) \implies 3^{-2x} = 3^{-3} \implies -2x = 3$$

$$+3x = +2 \implies \boxed{x = \frac{3}{2}}$$

d) $\text{Log}_{\sqrt{2}} \frac{1}{16} = x \implies (\sqrt{2})^x = \frac{1}{2^4} \implies \left(2^{\frac{1}{2}} \right)^x = 2^{-4} \implies \frac{1}{2} x = -4$

$$x = \frac{-4}{1/2} \implies x = 4 \cdot \frac{2}{1} = 8$$

EXERCÍCIOS

1) calcule o logaritmo:

a) $\text{Log}_{\frac{1}{4}} 16 =$

b) $\text{Log}_7 49 =$

c) $\text{Log}_8 32 =$

d) $\text{Log}_{\frac{1}{9}} 81 =$

Atenção!!

Observe que:

- $\text{Log}_a a = 1$ porque $a^1 = a \implies$ “o logaritmo de própria base é sempre 1”.
- $\text{Log}_a 1 = 0$ porque $a^0 = 1 \implies$ “o logaritmo de 1 em qualquer base é zero”.
- Se $a > 0, a \neq 1 \implies N > 0 \implies$ “só existe logaritmo de número positivo”.
- Só as potências da base têm logaritmo inteiro.

$$\text{Log}_a a = 1 \quad \text{Log}_a a^2 = 2 \quad \text{Log}_a a^3 = 3 \quad \text{Log}_a a^4 = 4$$

$$\dots \log_{\frac{1}{a}} = -1 \quad \log_{\frac{1}{a^2}} = -2 \dots$$

Chamamos de sistema de logaritmo o conjunto dos números positivos e seus respectivos logaritmos numa determinada base.

Assim, teremos os sistemas de logaritmos na base 2, na base 3, na base 10, na base $\frac{1}{10}$ etc.

As bases mais usadas, são:


Base 10 $\implies$ sistema decimal;

Base e $\implies$ (e $\cong 2,7128 \dots$) $\implies$ sistema neperiano.

Exemplo: Sistema de logaritmos na base 2

Vamos construir o gráfico $F : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$, definida por $y = \log_2 x$:

número	0	...	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	16 $+\infty$
logaritmo	$-\infty$	...	-3	-2	-1	0	1	2	3	4.... $+\infty$



FUNÇÃO LOGARÍTMICA

Uma função $F : \mathbb{R}^+ \longrightarrow \mathbb{R}$ dada por $F(x) = \log_a x$, a constante e positiva e diferente de 1, denomina-se *função logarítmica*.

$$F(x) = \log_a x \quad (0 < a \neq 1)$$

Observe que a definição da função nos impõe:

$$D = \mathbb{R}^+ +$$

$D = \mathbb{R}^+ +$ $\text{Im: } \mathbb{R}$


Você viu no exemplo anterior a representação gráfica da função:

$$F = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} / y = \log_2 x \}$$

Vamos agora construir o gráfico da função:

$$F = \{ (x, y) \in \mathbb{R}^+ \times \mathbb{R} / y = \log_{\frac{1}{2}} x \}$$


X	0		$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	1	2	4	8	 $+\infty$
y	$-\infty$	$+\infty$	3	2	1	0	-1	-2	-3	 $-\infty$



Repare, então, que o gráfico da função $F_x = \log_a x$ depende do valor de a

$$Y = F(x)$$

$$Y = F(x)$$



↔

Todo o gráfico da função $F(x) = \log_a x$ ($0 < a \neq 1$) intercepta o eixo Ox no ponto $(1, 0)$ e não intercepta o eixo Oy .

Observe que em ambos os casos a imagem da função é: $\text{Im} = \mathbb{R}$

Resumindo:

a) Forma: $y = \log_a x$, $a < 0$, $a \neq 1$

Estudo de $y = \log_a x$

Domínio: $x > 0$

$\text{Dom}(F) = x \in]0, +\infty[$

Imagem:

$\text{Im}(F) = y \in]-\infty, +\infty[$

Zeros:

$Y = 0$ quando $x = 1$


Varição:

Se $a > 1$, y é crescente

Se $0 < a < 1$, y é decrescente


Quadro de variação: $a < 1$

x	0	a^{-3}	a^{-2}	a^{-1}	1	a	a^2	a^3	$+\infty$
$Y = \log_a x$	$-\infty$	-3	-2	-1	0	1	2	3	$+\infty$



$a < 1$

x	0	a^3	a^2	a^1	1	a^{-1}	a^{-2}	a^{-3}	$+\infty$
$Y = \log_a x$	$+\infty$	3	2	1	0	-1	-2	-3	$-\infty$



LOGARÍTMOS

O CONCEITO DE LOGARITMO

A primeira operação que se aprende em matemática é a operação de adição: $3 + 2 = 5$.

3 e 2 são parcelas e 5 é o resultado; a soma.

Agora, dados o resultado 5 e uma das parcelas 3 ou 2, chega-se à outra parcela através da operação de subtração, assim temos:

$$5 - 2 = 3 \text{ porque } 3 + 2 = 5$$

$$5 - 3 = 2 \text{ porque } 2 + 3 = 5$$

Lembre-se que a adição é comutativa.

Considerando, então, a operação de multiplicação $3 \times 2 = 6$.

Temos: 3 e 2 são fatores e 6 é o produto (resultado).

Novamente dados o resultado e um dos fatores, como chegar a outro?

A resposta é a divisão.

Então:

$$6 : 2 = 3 \text{ porque } 3 \times 2 = 6$$

$$6 : 3 = 2 \text{ porque } 2 \times 3 = 6$$

Lembre-se que a multiplicação é comutativa.

Vejamos agora a potenciação: $2^3 = 8$

2 é base

3 é o expoente

8 é a potência

Agora vejam: Dados 8 (potência) e 3 (expoente), como chegaremos ao 2(base)?

- através de radiciação: $\sqrt[3]{8} = 2$ porque $2^3 = 8$

- mas se forem dados 8 (potência) e 2 (base), qual é o expoente? Ou seja, a que expoente devemos elevar 2 (base) para obter 8 (potência)? Bem, a resposta virá através da operação de logaritmação.

Então: se $2^3 = 8$

Diremos que 3 é o logaritmo de 8 na base 2 e escrevemos:

$$\text{Log}_2 8 = 3 \text{ onde } \begin{cases} 8 \text{ é o número ou antilogaritmo.} \\ 3 \text{ é a base} \\ 2 \text{ é o logaritmo} \end{cases}$$

- quer dizer que calcular o logaritmo, é calcular o expoente?

- Isso! Dizemos que o **logaritmo de um número N, numa base a**, positiva e diferente de um, é **o expoente a que deve elevar a base a, para se obter o número N.**

Ou seja:

$$\boxed{\text{Se } \log_a N = x}$$

então

$$\boxed{a^x = N}$$

Exemplos:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Log}_2 & 8 & = & 3 & \longrightarrow \text{logaritmo} \\ \downarrow & \searrow & & & \\ & \text{base} & & \text{n}^\circ \text{ ou antilogaritmo} & \end{array}$$

$$\log_3 81 = 4, \text{ porque } 3^4 = 81$$

$$\log_4 64 = 3, \text{ porque } 4^3 = 64$$

$$\log_2 16 = 4, \text{ porque } 2^4 = 16$$

$$\log_3 ({}^5\sqrt{3^2}) = \frac{2}{3}, \text{ porque } 3^{\frac{2}{3}} = {}^5\sqrt{3^2}$$

$$\log_2 \left(\frac{1}{8} \right) = -3, \text{ porque } 2^{-3} = \frac{1}{8}$$

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1) Calcular $\log_2 16$.

$$\text{Ora, } \log_2 16 = x$$

Então:

$$2^x = 16$$

$$\text{ou } 2^x = 2^4$$

$$\text{logo: } x = 4$$

$$2) \text{ Calcule } \log_3 \left(\frac{1}{27} \right) =$$

$$\log_3 \left(\frac{1}{27} \right) = x$$

$$3^x = \frac{1}{27}$$

$$3^x = \frac{1}{3^3}$$

$$3^x = 3^{-3}$$

$$x = -3$$

Lembrete:

Todo número elevado a expoente negativo é igual a uma fração, cujo numerador é 1 e o denominador é este número elevado ao oposto de seu expoente.

$$a^{-m} = \frac{1}{a^m}$$

3) Calcule $\log_8 16$

$$8^x = 16$$

ou

$$(2^3)^x = 2^4$$

$$2^{3x} = 2^4$$

$$3x = 4 \therefore x = 4/3$$

4) Qual é o $\log_{1/4} (\sqrt[5]{8})$?

$$\log_{1/4} (\sqrt[5]{8}) = x$$

$$(1/4)^x = (\sqrt[5]{8})$$

$$(2^{-2})^x = \sqrt[5]{2^3}$$

Assim:

$$2^{-2x} = 2^{3/5}$$

$$\text{ou } -2x = 3/5$$

$$x = -3/10 \text{ ou } x = -0,3$$

5) Agora responda:

Em que base o logaritmo de 27 é 3?

Sabemos então que:

$$\text{Log}_a^{27} = 3$$

Logo:

$$a^3 = 27$$

ou

$$a = \sqrt[3]{27} \implies \sqrt[3]{3^3} \quad \boxed{a = 3}$$

6) Qual é o número, cujo logaritmo na base 3 é 4?

Temos então:

$$\text{Log}_a^N = 4$$

Ou seja,

$$3^4 = N$$

ou

$$81 = N$$

EXERCÍCIOS

- Calcule o logaritmo:

1) $\log_8^{32} =$

2) $\log_7^{49} =$

3) $\log_{1/4}^{16} =$

4) $\log_{1/9}^{(1/27)} =$

5) $\log_4^{5\sqrt{8}} =$

6) $\log_{1/9}^{81} =$

- Calcule a base:

7) $\log_a^{32} = 5$

8) $\log_a^4 = -2$

9) $\log_a^{1/9} = -2$

10) $\log_a^8 = 3/2$

11) $\log_a^{\sqrt{2}} = -2$

- calcule o número ou antilogaritmo:

$$12) \log_2 N = 4$$

$$13) \log_{1/2} N = 1/2$$

$$14) \log_{1/4} N = 1/2$$

$$15) \log_3 N = 3$$

CONSEQÜÊNCIAS:

Você viu que

$$\boxed{\log_a N = x \implies a^x = N} \quad \text{e } a > 0, a \neq 1$$

Agora observe:

1) Se a base é positiva, o número também deverá ser positivo, pois número positivo elevado a qualquer expoente dará resultado também positivo.

- Quer dizer que **só existe logaritmo de número positivo.**

Se $a > 0, a \neq 1 \implies N > 0 \implies (+)^x = +$ Lembre-se que o domínio da função $y = \log x$ é $\mathbb{R}^+$.

$$2) \log_a a = 1 \text{ porque } a^1 = a \implies \text{"O logaritmo da própria base é sempre 1."}$$

Exemplo:

$$\log_2 2 = 1$$

$$\log_5 5 = 1$$

$$\log_{10} 10 = 1$$

$$3) \text{ Se } \log_a 1 = 0 \text{ porque } a^0 = 1 \implies \text{"O logaritmo de 1 em qualquer base é zero"}.$$

Exemplo:

$$\log_2 1 = 0$$

$$\log_5 1 = 0$$

$$\log_{10} 1 = 0$$

4) Só as potências da base têm logaritmo inteiro

$$\log_a a = 1$$

$$\log_a a^2 = 2 \dots\dots$$

$$\log_a a^4 = 4$$

$$\log_a 1/a = -1$$

$$\log_a a^3 = 3$$

$$\log_a 1/a^2 = 2 \dots\dots$$

Observação:

Chamamos de **sistema de logaritmo** ao conjunto dos números positivos e seus respectivos logaritmos numa determinada base.

Exemplo:

Sistema de logaritmos na base 2

Número	0	—	1 — 8	1 — 4	1 2	1	2	4	8	16.....+∞
logaritmo	∃	-∞	-3	-2	-1	0	1	2	3	4.....+∞

Assim teremos os sistemas de logaritmos na base 2, na base 3, na base $\frac{1}{10}$ etc.

As bases mais usadas são:

Base 10 → sistema decimal;

Base e → ($e \cong 2,7128\dots$) → sistema Neperiano

INEQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

Você já viu, quando a variação da função logarítmica que quando a *base é maior que 1*, os *logaritmos variam no mesmo sentido do número*, ou seja, se a base é maior que 1, quanto maior o número, maior o logaritmo.

Assim:

$$\text{Se } \boxed{a > 1} \text{ e } \begin{cases} \log_a A > \log_a B \\ \text{Log}_a A < \log_a B \end{cases} \begin{matrix} \Rightarrow \\ \Rightarrow \end{matrix} \begin{matrix} A > B \\ A < B \end{matrix}$$

Exemplo:

Seja a base 2

Se $\log_2 A > \log_2 B$, então $A > B$

Da mesma forma, quando a *base é menor que 1* os *logaritmos variam no sentido contrário dos números*, ou seja, se a base é menor que 1, quanto maior o número, menor será o logaritmo.

Assim:

$$\text{Se } \boxed{a < 1} \text{ e } \begin{matrix} \log_a A > \log_a B \\ \text{Log}_a A < \log_a B \end{matrix} \begin{matrix} \Rightarrow \\ \Rightarrow \end{matrix} \begin{matrix} A < B \\ A > B \end{matrix}$$

Exemplo:

Seja a base $\frac{1}{2}$

Se $\log_{\frac{1}{2}} A > \log_{\frac{1}{2}} B$, então $A < B$

EQUAÇÕES LOGARÍMICAS

Utilizando as propriedades operatórias, você pode resolver as equações que envolvam logaritmos. A resolução de equações logarítmicas se dá em três etapas básicas:

- Estabeleça as condições de existência dos logaritmos;
- Resolva a equação utilizando as propriedades operatórias;
- Faça a intersecção entre a solução encontrada e as condições de existência.

Exemplos:

1) $\log_{10} (2x + 1) = \log_{10} 2$

Condição de existência (lembre-se que só existe logaritmo de número positivo)

$$2x + 1 > 0$$

$$2x > -1$$

$x > -1/2$

Resolvendo a equação:

Temos: $\log_{10} (2x + 1) = \log_{10} 2$

Ora, sabemos que se $\log_{10} A = \log_{10} B$, então, $A = B$

Ou seja, $2x + 1 = 2$

E $2x = 2 - 1$

Ou $x = 1/2 \implies$ como esta solução não interfere na condição de existência, temos

$$S = \{ 1/2 \}$$

2) $\log_{10} (2x + 1) = 2$

Condição de existência

$$2x + 1 > 0$$

$$2x > -1$$

$x > -1/2$

Resolvendo A Equação:

Temos, $\log_{10} (2x + 1) = 2$

Ou $\log_{10} (2x + 1) = \log_{10} 10^2$

$$E \quad \log_{10} (2x + 1) = \log_{10} 100$$

$$\text{Logo, } 2x + 1 = 100$$

$$2x = 100 - 1$$

$$x = \frac{99}{2} \implies \text{como esta solução não interfere na condição de existência, temos}$$

$$S = \left\{ \frac{99}{2} \right\}$$


$$3) \log_5 (x + 1) - \log_5 x = \log_5 2$$

Condição de existência

$$A) x + 1 > 0$$

$$B) x > 0$$

$$x > -1$$



Resolvendo A Equação

Temos, $\log_5 (x + 1) - \log_5 x = \log_5 2 \implies$ lembre-se:

$$\log_a \left(\frac{A}{B} \right) = \log_a A - \log_a B$$

$$\text{Ou } \log \left(\frac{x+1}{x} \right) = \log 2$$

$$\frac{x+1}{x} = 2 \implies x+1 = 2x$$

$$x - 2x = -1$$

$$-x = -1$$


$$x = 1 \implies \text{como esta solução não interfere na condição de existência, temos}$$

$$S = \{ 1 \}$$

$$4) \log_3 (x + 3) + \log_3 (x - 3) = \log_3 16$$

Condição de existência:

$$\left. \begin{array}{l} x + 3 > 0 \implies x > -3 \\ x - 3 > 0 \implies x > 3 \end{array} \right\} \implies x > 3$$



Ou seja: $x > 1$

Resolvendo a equação:

$$\log_2 \left(\frac{x^2 - 1}{x} \right) = \log_2 2$$

$$\frac{x^2 - 1}{x} = 2$$

$$x^2 - 1 = 2x$$

$$x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$e \quad \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -1 \end{cases}$$

$$\Delta = 4 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 4 + 4 = 8$$

$$x = \frac{2 \pm \sqrt{8}}{2} = \frac{2 \pm 2\sqrt{2}}{2} = \boxed{1 \pm \sqrt{2}}$$

Comparando com as condições de existência, verificamos que apenas o valor $1 \pm \sqrt{2}$ satisfaz.


Assim: $S = \{ 1 \pm \sqrt{2} \}$

$$7) \log_3 (2x - 3) - \log_3 x = 2$$

Condições de existência:

$$2x - 3 > 0 \implies x > \frac{3}{2}$$

$$x > 0 \implies$$



Resolvendo a equação:

$$\log_3 \left(\frac{2x - 3}{x} \right) \log_3 3^2$$

$$2x - 3 = 9x$$

$$2x - 9x = 3$$

$$-7x = 3 \implies x = -\frac{3}{7} \text{ Este valor } \underline{\text{não}} \text{ satisfaz as condições de existência, logo } S = \left\{ -\frac{3}{7} \right\}$$

1) Resolva a inequação:

$$\log_2 (x + 3) > \log_2 (2x + 2)$$

Como a base (2) é maior que um, temos:

$$x + 3 > 2x + 2$$

$$\text{ou } -x > -1$$


ou $x < +1$

Mas como só existe logaritmo de número positivo, temos:

$$x + 3 > 0 \text{ ou } x > -3$$

e $2x + 2 > 0 \text{ ou } x > -1$

logo, os valores que satisfazem a inequação e dão condição de existência aos logaritmos são:



Resposta: $-1 < x < 1$

2) Resolva a inequação:

$$\text{Log}_{1/2}(x + 4) > \text{log}_{1/2}(2x + 2)$$

Como a base $(1/2)$ é menor que um, temos:

$$x + 4 < 2x + 2 \text{ (inverte o sentido)}$$


e $-x < -2$ ou

$$x > 2$$

as condições de existência os logaritmos são:

$$\text{e } \begin{cases} x > -4 \\ x > -1 \end{cases}$$

Então temos:



Resposta:

$$x > 2$$

3) Resolva a inequação:

$$\text{Log}_{1/3}(3x + 2) > 2$$


Como $2 = \text{log}_{1/3}(1/9)$ porque $(1/3)^2 = 1/9$

Temos: $\text{Log}_{1/3}(3x + 2) > \text{log}_{1/3}(1/9)$

e $3x + 2 < 1/9$ (base menor que um)

ou $27x + 18 < 1$

$$27x < -17$$



$$x < \frac{-17}{27}$$

Mas, para que exista o logaritmo, é necessário que $3x + 2 > 0$


ou

$$x > \frac{-2}{3}$$

então temos:

$$x < -\frac{17}{27}$$

$$x > -\frac{2}{3} \quad \text{ou} \quad x > -\frac{18}{3}$$



$$-\frac{18}{27} \quad -\frac{17}{27}$$

logo, a resposta é

$$-\frac{18}{27} > x > -\frac{17}{27}$$

4) Resolva a inequação:

$$\text{Log}_{1/2}^{(2x-x)} > 3$$

Temos que $3 = \log_{1/2} (1/8)$

Daí $\log_{1/2} (2 - x) > \log_{1/2} (1/8)$

E $2 - x < 1/8$ (base menor que um)

$$16 - 8x < 1$$

$$-8 < -15$$


$$x > \frac{15}{8}$$

A condição de existência do logaritmo é $2 - x > 0$

$$\text{ou } -x > -2$$

$$x < 2$$

O que nos dá:



$$\text{Resposta: } \frac{15}{8} < x < 2$$

EXERCÍCIOS

16) Determine o valor de x nas expressões abaixo:

- a) $\log_2 (x + 1) = 3$
- b) $\log_{10} (x + 1) = 0$
- c) $\log_{10} (x + 1) = 1$
- d) $\log_3 (x - 1) = 4$
- e) $\log_3 (x - 1) = 0$
- f) $\log_5 (2x + 3) = 1$
- g) $\log_2 (x + 1) = 4$
- h) $\log_{1/2} (x + 1) = 0$
- i) $\log_{1/2} (x + 1) = 1$

17) Resolva as inequações:

- a) $\log_2 (2x + 2) > \log_2 (x + 4) =$
- b) $\log_{1/2} (2x + 2) > \log_{1/2} (x + 4) =$
- c) $\log_{10} (2x - 6) < \log_{10} (3x - 12) =$
- d) $\log_{1/10} (2x - 6) < \log_{1/10} (3x - 12) =$
- e) $\log_{1/2} (x - 4) > 2$
- f) $\log_3 (x_2 - 1) < 2$

GABARITO

- 1) $x = 5/3$
- 2) $x = 2$
- 3) $x = -2$
- 4) $x = 3/2$
- 5) $x = \frac{-3}{2} = \frac{-3}{10}$
- 6) $x = -2$
- 7) $a = 2$
- 8) $a = 1/2$
- 9) $a = 3$
- 10) $a = \sqrt{512}$

11) $a = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$

12) $N = 16$

13) $N = 4$

14) $N = 1/2$

15) $N = 27$

16)

a) $x = 7$

b) $x = 0$

c) $x = 9$

d) $x = 83$

e) $x = 2$

f) $x = 1$

g) $x = 15$

h) $x = 0$

i) $x = -1/2$

17)

a) $x > 2$

b) $-1 < x < 2$

c) $x > 6$

d) $4 < x < 6$

e) $4 < x < 17/4$

f) $-\sqrt{10} < x < -1$ ou $1 < x < \sqrt{10}$

PROPRIEDADES OPERATÓRIAS DOS LOGARÍTMOS

Vamos lembrar algumas propriedades das potências.

1- Para multiplicar duas propriedades de mesma base, conserva-se a base, somam-se os expoentes.

$$A^m \cdot A^n = A^{m+n}$$

2- Para se dividir duas potências de mesma base, conserva-se a base e subtrai-se os expoentes:

$$A^m : A^n = A^{m-n}$$

3- Para se elevar uma potência a um expoente, conserva-se a base e multiplicam-se os expoentes.

$$(A^m)^n = A^{m \cdot n}$$

4- A potência de expoente fracionário é equivalente ao radical, cujo radicando é a base da potência, o índice é o denominador da fração e o expoente do radicando corresponde ao numerador da fração expoente.

$$\sqrt[m]{A^n} = A^{\frac{n}{m}}$$

Exemplos:

$$1) 2^5 : 2^3 = 2^2$$

$$2) 2_5 : 2^3 = 2^2$$

$$3) (2_3)^2 = 2^6$$

$$4) \sqrt[5]{2^3} = 2^{\frac{3}{5}}$$

Suponhamos agora, que soubéssemos:

$$\begin{cases} \text{Log}_a A = x \\ \text{Log}_a B = y \end{cases}$$

E quiséssemos calcular:

$$\text{Log}_a (A \cdot B) ; \text{Log}_a (A/B) ; \text{Log}_a A^m ; \text{Log}_a \sqrt[m]{A}$$

$$\text{Como } \begin{cases} \log_a A = x \\ \log_a B = y \end{cases} \quad \text{temos } \begin{cases} a^x = A \\ a^y = B \end{cases}$$

Então:

$$A \cdot B = a^x \cdot a^y = a^{x+y}$$

$$\frac{A}{B} = \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$$

$$A^m = (a^x)^m = a^{m \cdot x}$$

$$\sqrt[m]{A} = \sqrt[m]{a^x} = a^{\frac{x}{m}}$$

$$\text{Assim, } \log_a (A \cdot B) = \log_a (a^{x+y}) = x + y$$

$$\log_a (A/B) = \log_a (a^{x-y}) = x - y$$

$$\log_a (A^m) = \log_a (a^{m \cdot x}) = m \cdot x$$

$$\log_a \sqrt[m]{A} = \log_a (a^{\frac{x}{m}}) = \frac{x}{m}$$

Logo:

$$1- \log_a (A \cdot B) = \log_a A + \log_a B$$

O logaritmo do produto é igual à soma dos logaritmos dos fatores.

$$2- \log_a (A/B) = \log_a A - \log_a B$$

O logaritmo do quociente é igual à diferença entre o logaritmo do dividendo e o logaritmo do divisor.

$$3- \log_a (A^m) = m \cdot \log_a A$$

O logaritmo de uma potência é igual ao produto do expoente pelo logaritmo da base .

$$4- \log_a \sqrt[m]{A} = \frac{\log_a A}{m}$$

O logaritmo de uma raiz é igual ao logaritmo do radicando dividido pelo índice do radical.

Exemplos:

$$\text{Dados: } \begin{cases} \log_{10} 2 = 0,30103 \\ \log_{10} 3 = 0,47712 \end{cases}$$

Temos

$$\log 6 = \log (2 \times 3) = \log 2 + \log 3 = 0,30103 + 0,47712 = 0,77815$$

$$\log (3/2) = \log 3 - \log 2 = 0,47712 - 0,30103 = 0,17609$$

$$\log 8 = \log 2^3 = 3 \log 2 = 3 + 0,30103 = 0,90309$$

$$\log \sqrt[3]{3} = \frac{\log 3}{3} = \frac{0,47712}{3} = 0,15904$$

$$\log 16,2 = \log \frac{162}{10} = \log 162 - \log 10 = \log (2 \times 3^4) - \log 10$$

como $\log 10 = 1$ ($\log_a a = 1$); temos

$$\log 16,2 = \log 2 + 4 \log 3 - \log 10 = 0,30103 + 4 \times 0,4771 - 1 =$$

$$0,30103 + 1,90848 - 1 = 1,20951$$

EXERCÍCIOS

1) Desenvolva as expressões usando as propriedades operatórias dos logaritmos:

a) (Resolvido) $\log \left(\frac{A \cdot B}{C} \right)$

$$\log A + \log B - \log C$$

b) (Resolvido) $\log A^2 = 2 \log A$

c) (Resolvido) $\log \left(\frac{A^2 \cdot B^3}{C^4} \right) = 2 \log A + 3 \log B - 4 \log C$

d) $\log B^3 =$

e) $\log \sqrt[3]{A} =$

f) $\log \frac{\sqrt{A \cdot B}}{C} =$

g) $\log \frac{\sqrt[5]{A^2} \cdot B^3}{C^4} =$

h) $\log \left(\frac{\sqrt{A \cdot B}}{C} \times \frac{\sqrt[4]{A^3 \cdot B}}{C} \right) =$

2) Dados $\begin{cases} \log_{10} 2 = 0,3010 \\ \log_{10} 3 = 0,4771 \end{cases}$

Determine:

a) (resolvido) $\log_{10} 21 = \log_{10} (2^3 \times 3) = 3 \log 2 + \log 3 = 3 \times 0,3010 + 0,4771 = 1,3801$

b) $\log_{10} 72 =$

c) $10 \sqrt{72} =$

d) $\log_{10} (0,72) =$

e) $\log_{10} 36 =$

f) $\log 3,6 =$

g) $\log \sqrt{0,36} =$

MUDANÇA DE BASE:

Consideremos o problema que consiste em determinar os logaritmos dos números na base $\underline{b}$, sendo conhecidos e tabelados os logaritmos dos mesmos números no sistema de base $\underline{a}$.

Seja N um número qualquer, cujo logaritmo na base $\underline{b}$ queremos achar. Representemos por x , o logaritmo procurado.

Teremos:

$$\text{Log}_b N = x \longleftrightarrow b^x = N$$

Mas se $b^x = N$

Vem $\log_a (b^x) = \log_a N$ (o sistema de base a é conhecido)

$$\text{Ou } x \log_a b = \log_a N$$

E

$$x = \frac{\log_a N}{\log_a b}$$

ou ainda:

$$\log_b N = \log_a N \cdot \frac{1}{\log_a b}$$

$\log_a b$ A constante $\frac{1}{\log_a b}$ denomina-se módulo relativo do sistema de base b em relação ao de base a .

- quer dizer que, para se calcular $\log_2 3$, basta fazer:

$$\log_2 3 = \frac{\log 3}{\log 2} = \frac{0,47712}{0,30103} \cong 1,5$$

Exemplos:

a) $\log_{16} 4 = \frac{\log_2 4}{\log_2 16} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

b) $\log_9 x = \frac{\log_3 x}{\log_3 9} = \frac{\log_3 x}{2} \quad (x > 0)$

c) $\log_{1/2} 5 = \frac{\log_2 5}{\log_2 1/2} = -\log_2 5$

d) $\log_3 5 = \frac{\log_5 5}{\log_5 3} = \frac{1}{\log_5 3}$

EXERCÍCIOS

3) Mudar $x = \log_2 10$ para a base 10.

4) Calcular $y = \log_5 2$ em função de $x = \log_{10} 2$.

5) (Resolvido) Simplifique a expressão:

$$E = \log_2 3 \cdot \log_9 2 + \log_9 8 \cdot \log_2 9$$

Transformando para base 2

$$E = \frac{\log_2 3}{\log_2 9} + \frac{\log_2 8}{\log_2 9} \cdot \log_2 9$$

Ou seja,

$$E = \log_2 3 \cdot \frac{1}{\log_2 3^2} + \log_2 2^3$$

$$\log_2 3 \cdot \frac{1}{2 \log_2 3} + 3 \log_2 2 =$$

$$1/2 + 3 \cdot 1 \implies 1/2 + 1/3 + 6/2 = 7/2$$

6) Simplifique a expressão:

$\log_3 9 \cdot \log_9 3$ passando a base para 3.

7) Calcule o valor de:

$\log_3 2 \cdot \log_4 3 \cdot \log_5 4 \cdot \log_6 5 \cdot \log_7 6 \cdot \log_8 7 \cdot \log_9 8 \cdot \log_{10} 9$

8) Calcule o produto:

$\log_3 2 \cdot \log_2 5 \cdot \log_5 3 =$

9) Calcule o valor de:

$N = \log_3 5 \cdot \log_2 3 \cdot \log_5 2$

GABARITO

3)

d) $3 \log B$

e) $\frac{\log A}{3}$

f) $\frac{\log A + \log B - \log C}{2}$

g) $\frac{2 \log A + 3 \log B - \log C}{5}$

h) $\frac{\log A + \log B - \log C}{2} + \frac{3 \log A + \log B}{4} - 2 \log C$

4)

a) 1,3801

e) 1,5562

b) 1,8572

f) 0,5562

c) 0,9286

g) -0,2219

d) -0,1428

3) $x = \frac{1}{\log_{10} 2}$

5) $y = \frac{\log_{10} 2}{1 - \log_{10} 2}$

6) 1

7) $\log_{10} 2$

8) 1

9) 1

LOGARITMOS DECIMAIS

O sistema de logaritmos decimais é o sistema de base 10, também chamado sistema de logaritmos comuns, ou vulgares, ou de Briggs (Henry Briggs, matemático inglês: 1561 – 1630, foi quem primeiro destacou a vantagem do emprego dos logaritmos de base 10 para os cálculos).

CARACTERÍSTICA E MANTISSA:

Nós já vimos que num sistema de base qualquer a , vemos que só as potências inteiras da base têm logaritmos inteiros:

$$\text{Log}_a a^n = n$$

Qualquer número que não seja potência inteira da base, terá seu logaritmo constatando de uma parte inteira denominada CARACTERÍSTICA do logaritmo, mais uma parte fracionária ou decimal (menor que a unidade) chamada MANTISSA do logaritmo.

Assim, temos;

$$\text{Log}20 = 1,30103 = 1 + 0,30103$$

Onde 1 é a característica e

0,30103 é a mantissa.

No sistema de logaritmos de base 2 teremos;

$$\text{Log}_2 32 = \log_2 5^2 = 5$$

$$\text{Log}_2 64 = 6$$

Os números compreendidos entre 32 e 64 terão os logaritmos compreendidos entre 5 e 6. Para o número 48, por exemplo, teremos:

$$\text{Log}_2 32 < \log_2 48 < \log_2 64$$

$$\text{e } 5 < \log_2 48 < 6$$

Assim, $\log_2 48 = 5 + \text{fração}$

Onde 5 é a característica, e a parte fracionária decimal é a mantissa.

Vamos falar também de COLOGARITMO (não confunda com antilogaritmo). Ao logaritmo do inverso do número, dá-se o nome de cologaritmo do número.

Assim,

$$\text{Colog}_a N = \log_a \left(\frac{1}{N} \right)$$

$$\text{Mas } \log_a \left(\frac{1}{N} \right) = \log_a 1 - \log_a N = 0 - \log_a N = - \log_a N$$

$$\text{Então } \text{colog}_n N = -\log_a N$$

O cologaritmo corresponde, portanto, ao simétrico do logaritmo.

Usa-se o cologaritmo para substituir as subtrações de logaritmos por adição, como, por exemplo, no cálculo:

$$\text{e } \log \frac{3}{2} = \log 3 - \log 2 = \log 3 + \text{colog } 2$$

PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS DECIMAIS

Nós já vimos que para se calcular a característica do logaritmo de um número numa base qualquer, a, basta encontrar a potência de a imediatamente inferior ao número, por exemplo, a característica de $\log_2 153$ é 7.

$$\text{Porque } 2^7 = 128 < 153 < 2^8 = 256$$

$$\text{E } \log_2 153 = 7 + \text{fração}$$

Ora, na base 10 temos:

$$\text{a) } 10^{-3} = 0,001$$

$$\text{b) } 10^{-2} = 0,01$$

$$\text{c) } 10^{-1} = 0,1$$

$$\text{d) } 10^0 = 1$$

$$\text{e) } 10^1 = 10$$

$$\text{f) } 10^2 = 100$$

$$\text{g) } 10^3 = 1000, \text{ etc}$$

O que nos permite concluir:

- O logaritmo decimal de qualquer potência de 10 é o seu próprio expoente.
- A característica do logaritmo decimal de um número maior que um é uma unidade menor que o número de algarismo de sua parte interna.
- A característica do logaritmo decimal de um número positivo menor que um é negativa, e tem tantas unidades quantos zeros precedem seu primeiro algarismo significativo.

Então, vemos que:

- A característica do $\log 123$ é 2
- A característica do $\log 8457$ é 3
- A característica do $\log 27,345$ é 1
- A característica do $\log 7$ é 0
- A característica do $\log 0,0003$ é -3

- A característica do $\log 0,2$ é -1
- A característica do $\log 0,0005$ é -4
- A característica do $\log 0,0203$ é -2
- A característica do $\log 0,0080054$ é -3

Suponhamos agora que **C** é a característica de **M**, a mantissa do logaritmo decimal de um número A;

Então $\log A = C, M$ calculemos:

$\log (A \cdot 10^P)$ onde P é um número inteiro

Ora,

$\log (A \cdot 10^P) = \log A + P \cdot \log 10 = C, M + P = (C + P),$ o que nos permite concluir que

4) Quando se multiplica ou divide um número por uma potência de 10, a mantissa de seu logaritmo decimal não se altera

- Quer dizer que 2; 20; 200 e 2000 tem a mesma mantissa?
- Exato! Se $\log 2 = 0,30103$, então:

$$\log 20 = 1,30103$$

$$\log 200 = 2,30103$$

$$\log 2000 = 3,30103$$

Mas, suponhamos que quiséssemos calcular $\log 0,002$ a característica é (-3) e a mantissa é a mesma que a de 2,20 ou 2000 e é positiva; nesse caso escrevemos $\log 0,002 = 3,30103$.

Como a mantissa é positiva e a característica é negativa, a notação acima representa uma convenção. O logaritmo assim escrito é denominado LOGARITMO PREPARADO (característica negativa e mantissa positiva).

O logaritmo todo negativo (ex.: $\text{colog } 20 = -1,30103$) possui característica e mantissa negativas.

- E como é que se transforma o logaritmo preparado em logaritmo negativo, e vice-versa?

Veja:

$$\text{Seja } \log 0,002 = 3,30103$$

$$\text{Mas } 3,30103 = -3 + 0,30103 = -2,69897$$

$$\text{Então } -3,30103 = -2,69897$$

Agora, de negativo para preparado:

$$\text{Seja o logaritmo negativo: } -3,98673$$

$$\text{Podemos escrever: } -3,98673 = -3 - 0,98673$$

Somando e subtraindo uma unidade, tem-se:

$$-3,98673 = -3 - 1 + 1 - 0,98673$$

ou ainda

$$-3,98673 = (-3 - 1) + (1 - 0,98673) = -4 + 0,01327$$

então:

$$-3,98673 = 4,01327$$

- E para que transformar?

- Suponhamos que, no desenvolvimento de um monômio, você encontrasse adições, subtrações, multiplicações e divisões com logaritmos preparados.

Neste caso, transforma-se o logaritmo preparado em logaritmo negativo e opera-se com números relativos.

Isso! Mas o resultado deverá vir sempre com a mantissa positiva.

Por exemplo, calcule:

$$\begin{aligned} & \log \left[\sqrt[5]{\frac{(0,002)^3}{0,3}} \right] \text{ sabendo } \begin{cases} \log^2 = 0,30103 \\ \text{Log}_3 = 0,47712 \end{cases} \\ \text{Bem, } \log \left[\sqrt[5]{\frac{(0,002)^3}{0,3}} \right] &= \frac{3 \cdot \log 0,002 - \log 0,3}{5} = \\ &= \frac{3 \times 3,30103 - 1,47712}{5} = \frac{3 \times (-2,69897) - (0,52288)}{5} = \\ &= \frac{-8,09691 + 0,52288}{5} = \frac{-7,57403}{5} = -1,514806 = 2,485194 \end{aligned}$$

Agora, repare neste exercício:

$$\begin{aligned} & \text{Calcule } \sqrt[3]{\frac{0,0345}{(2789)^2}} \\ \text{Sabendo } & \begin{cases} \log 3,45 = 0,53782 \\ \log 27,89 = 1,44545 \\ \log 1,643 = 0,21564 \end{cases} \\ \text{Seja } E &= \sqrt[3]{\frac{0,0345}{(2789)^2}} \\ \text{Então } \log E &= \frac{\log 0,0345 - 2 \log 2789}{3} = \\ &= \frac{2,53782 - 2 \times 3,44545}{3} = \\ &= \frac{-1,46218 - 6,89090}{3} = \\ &= \frac{-8,35308}{3} = -2,78436 = 3,21564 \end{aligned}$$

E, pelo enunciado, sabemos que $\log 1,643 = 0,21564$ e a mantissa é a mesma! Ou seja, o número cuja mantissa é 21564, é 1643.

$$\text{Se } \log E = 3,21564$$

$$\text{Temos } E = 0,001643$$

$$\text{Ou } \sqrt[3]{\frac{0,0345}{(2789)^2}} = 0,001643$$

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

1) Calcular $\log 4391$ sabendo-se que $\log 0,04391 = 2,64256$.

- Neste caso, temos que a característica de $\log 43,91$ é 1.

Pelo logaritmo dado, vemos que a todo número que possua (somente) os algarismos 4391, nesta ordem, corresponde à mantissa 64256.

$$\text{Então podemos concluir que } \log 43,91 = 1,64256$$

2) Calcular o $\log 47285$

$$\text{Sabe-se que } \begin{cases} \log 4,728 = 0,67468 \\ \log 4729 = 3,67477 \end{cases}$$

Como a mantissa independe da vírgula, temos:

Mantissa de 4728..... 6768

Mantissa de 4729..... 67477

Vamos procurar a mantissa de 4728,5 que deverá estar entre 67468 e 67477

Como a diferença entre 4728 e 4729 é 1

4728 e 4728,5 é 0,5

formamos a seguinte regra de três:

se o número aumenta 1, a mantissa aumenta 9

se o número aumenta 0,5, a mantissa aumentará x

$$\text{e } x = 0,5 \times 9 = 4,5 \cong 5$$

logo, a mantissa será $67468 + 5 = 67473$ e $\log 47285 = 4,67473$

Observação:

Para se calcular $\text{colog } 47485$ devemos lembrar que $\text{colog } 47285 = -\log 47285 = -4,67573$
 $= 5,32527$

3) calcular o antilogaritmo de 2,84046 (achar o número cujo log é 2,8404).

$$\text{Sabendo-se } \begin{cases} \log 6925 = 3,84042 \\ \log 6926 = 3,84048 \end{cases}$$

A mantissa 84046 está entre 84042 e 84048, temos então:

A mantissa 84047, corresponde o número 6925

A mantissa 84048, corresponde o número 6926

diferença = 6 diferença = 1
e a regra de três:

Na mantissa, quando aumenta 6, no número aumenta 1.

Na mantissa, quando aumenta 4, no número aumenta x .

$$E\ x = \frac{4}{6} = 0,66...$$

logo, o número será 6925,66 = 6925,67

Assim, se $\log N = 2,84046$

$$N = 0,0692567$$

Observação:

Para se achar o número cujo colog é 1 15954, devemos lembrar que:

$$\log N = -\text{colog } N$$

Então, $\log N = (-T, 15954) = -(-0,84046) = 0,84046$

E se $\log N = 0,84046$, temos $N = 6,92567$

EXERCÍCIOS

1) Dada a expressão:

$$N = \frac{1,25^3 \sqrt{\frac{62,5}{5}}}{(0,04)}$$

Calcular o logaritmo decimal de N, sabendo-se que $\log 0,5 = 0,69897$

2) Dados $a = 2,5$; $b = 0,025$; $e = 4,86$;

$$\log 2 = 0,30103 \quad \text{e} \quad \log 7 = 0,84510.$$

calcular $\text{colog } x$, sendo:

$$x = \frac{a^2 \sqrt[3]{b}}{e+2}$$

GABARITO

1) 7,68524

2) 1,52397

BIBLIOGRAFIA

_____. Youssef, A.N, Fernandes, V.P. e Soares, E. – Matemática para o 2º grau – Curso completo, São Paulo, Scipione, 1998

_____. Trotta, f, Jakubovic, J. e Imenes, L.M.P.; Matemática aplicada: 1ª. 2ª e 3ª séries, 2º Grau, São Paulo, Ed. Moderna, 1979

_____. Aref Antas Neto (et alli), Noções de Matemática – 6 volumes – São Paulo, Ed. Moderna, 1980

Vol 1 – Conjuntos e funções

Vol 2 – Progressões e logaritmos

Vol 3 – Trigonometria

Vol 4 – Combinatória, Matrizes e Determinantes

Vol 5 – Geometria

Vol 6 – Geometria Analítica

Vol 7 – Números complexos, Polinômios e Equações Algébricas

Vol 8 – Introdução à análise matemática

_____. Lima, Elen L. – A matemática do Ensino Médio – Rio de Janeiro, SOLGRF Publicações, 1998 – obra em 3 volumes.