Araliaceae

Família cosmopolita com cerca de 55 gêneros e aproximadamente 1500 espécies cosmopolitas, ocorrendo em regiões temperadas e tropicais. Na Reserva ocorre o gênero *Schefflera*, com 2 espécies, e uma espécie de *Dendropanax*.

As espécies de Schefflera na Reserva são arvoretas até árvores; outras espécies podem ser epífitas ou hemiepífitas. As folhas são digitadas, espiraladas, com estípulas grandes e persistentes. As duas espécies têm pubescência dourada na face abaxial da folha. Podem ser confundidas com Araceae (*Anthurium*), Bombacaceae e Cecropiaceae (nas quais faltam as estípulas). *Dendropanax* tem folhas simples, inteiras, e pode ser confundida com Euphorbiaceae.

As flores são pequenas, pouco vistosas, actinomorfas, pentâmeras, bissexuais, dispostas em panículas. O fruto é uma drupa, lateralmente comprimida e pilosa, enegrescendo-se quando maduro, dispersado por aves.

Schefflera morototoni produz uma madeira leve útil. Muitas espécies são utilizadas como ornamentais no Brasil, mas principalmente representantes do Velho Mundo, como várias espécies de *Schefflera*.



Schefflera morototoni



Schefflera umbrosa




Dendropanax cf. macropoda. Árvore pequena de até 10 m. Folhas simples e inteiras com folhas espiraladas. Pecíolo comprido, parecendo Euphorbiaceae, mas sem glândulas. Rara. Baixio. *D. macropoda* é encontrada em Humaitá e Peru.



310



Schefflera umbrosa. Arvoreta até 6 m de altura. Sempre com alguns folíolos trilobados, indumento ocráceo na face abaxial. Freqüente. Vertente, baixio e platô. Arredores de Manaus.



375

470



Schefflera morototoni. (Morototó). Árvore de até 15 m. Copa com muitas ramificações e folhas agrupadas no fim dos ramos. Folíolos com margem ondulada e face abaxial ferrugíneo-tomentosa. Ocasional. Capoeira, especialmente em clareiras. Amazônia.



850



