

Ericaceae

A família tem 103 gêneros e mais que 3000 espécies incluindo 40 gêneros e 900 espécies neotropicais; é mal representada em florestas de baixa altitude, ocorrendo nesses locais geralmente em ambientes úmidos como matas de baixio ou campinaranas e próximo a cursos d'água. Na Reserva é representada por uma espécie.



Representantes da família são arbustivos ou às vezes arbóreos, lianas ou hemiepífitas. As folhas são alternas, raramente opostas ou verticiladas, geralmente carnosas e com a venação freqüentemente palmada. A inflorescência é racemosa, paniculada, ou as flores são solitárias. As flores têm 4-5(-7) sépalas, unidas basalmente e persistentes; 4-5(-7) pétalas, unidas em forma de tubo; 8-10(-14) estames, muitas vezes com apêndices, e com anteras poricidas. O ovário é geralmente ínfero com um estilete e estigma. O fruto é uma cápsula ou baya.



Na Reserva, a única espécie é hemiepífita, com folhas de venação palmada e nervuras de ordem superior inconspícuas e seiva vermelha ao corte, o que a diferencia de todas as outras famílias de mesmo hábito.



Psammisia guianensis.

Hemiepífita. Corte do caule exsudando seiva vermelha. Com duas glândulas na base da lâmina. Freqüente. Baixio e campinarana. Norte e Ocidente da Amazônia.



93

