
Eriocaulaceae

A família tem cerca de 10 gêneros e 1200 espécies, distribuídos nos Trópicos e Subtrópicos. No Brasil encontram-se cerca de 800 espécies em 8 gêneros. Na Reserva ocorrem os gêneros Paepalanthus, *Syngonanthus* e *Tonina*, todos com uma espécie somente. São característicos de solos brejosos, embora algumas espécies sejam comumente encontradas em solo arenoso de capoeira, lugares geralmente secos e expostos ao sol.

São ervas, perenes ou anuais, geralmente com folhas dispostas em rosetas basais, parecendo tufos de gramínea. As inflorescências são densos capítulos, geralmente esbranquiçados, no ápice de longos escapos, isolados ou em umbelas, panículas verticiladas, ou ainda sem escapo (*Tonina*). As flores são pequenas, geralmente esbranquiçadas. Os frutos são cápsulas.







8

Tonina fluviatilis. Erva subaquática, ereta a decumbente. Folhas crescendo ao longo de todo ramo. Cresce tipicamente em margens de igarapés ou próximo a eles. Freqüente. Baixio. Neotrópicos.



Paepalanthus fasciculattus

As espécies desta família são conhecidas como sempre-vivas e têm importância econômica principalmente em Minas Gerais e Bahia, os maiores centros de diversidade da família. Algumas espécies de *Syngonanthus* chegam a ser exportadas até 40000 kg/ano de capítulos e escapos, para serem utilizados em arranjos de flores.



Giulietti, A.M. & N. Haroldo. 1990. Distribuição geográfica de Eriocaulaceae. Acta Bot. 4.



3,5

Syngonanthus umbellatus. Erva ereta. Folhas formando uma roseta próxima ao chão, não distribuídas ao longo dos ramos. Freqüente. Solo brejoso. Norte da América do Sul.





8

Paepalanthus fasciculattus. Erva ereta. Folhas distribuídas ao longo dos ramos. Freqüente. Solo brejoso.

