



PROPRIEDADES DOS LOGARITMOS

Considere um número real n , e três números reais a , b e c , tais que $0 < a \neq 1, b > 0$ e $c > 0$.

Dessa forma, temos:

LOGARITMO DO PRODUTO

$$\log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

Demonstração:

Considere três números reais w , j e k , tais que $\log_a(b \cdot c) = w$, $\log_a b = j$ e $\log_a c = k$.

Pela definição de logaritmo temos:

$$\text{I. } \log_a b = j \Leftrightarrow a^j = b$$

$$\text{II. } \log_a c = k \Leftrightarrow a^k = c$$

$$\text{III. } \log_a(b \cdot c) = w \Leftrightarrow a^w = b \cdot c$$

Substituindo (II) e (III) em (I), temos

$$a^w = b \cdot c = a^j \cdot a^k = a^{j+k} \Rightarrow a^w = a^{j+k} \Rightarrow w = j+k$$

$$\text{Logo, } \log_a(b \cdot c) = \log_a b + \log_a c$$

Exemplo:

$$\log_5 6 = \log_5 2 \cdot 3 = \log_5 2 + \log_5 3$$

LOGARITMO DO QUOCIENTE

$$\log_a\left(\frac{b}{c}\right) = \log_a b - \log_a c$$

Demonstração:

A demonstração da 2ª propriedade é inteiramente análoga à feita na 1ª propriedade. Tente fazer!

Exemplo:

$$\log_5 6 = \log_5\left(\frac{12}{2}\right) = \log_5 12 - \log_5 2$$

LOGARITMO DA POTÊNCIA

$$\log_a b^n = n \cdot \log_a b$$

Demonstração:

Considere dois números reais w e j , tais que $\log_a b^n = w$ e $\log_a b = j$.

Pela definição de logaritmo temos:

$$\text{I. } \log_a b^n = w \Leftrightarrow a^w = b^n$$

$$\text{II. } \log_a b = j \Leftrightarrow a^j = b$$

Elevando os membros da equação (II) a n , temos:

$$a^j = b \Rightarrow (a^j)^n = (b)^n \Rightarrow a^{jn} = b^n$$

Mas, na equação (I), temos que $b^n = a^w$, substituindo temos:

$$a^{jn} = a^w \Rightarrow jn = w$$

$$\text{Logo, } \log_a b^n = n \cdot \log_a b$$

Exemplo:

$$\log_2 3^5 = 5 \cdot \log_2 3$$

PROEXPLICA

- Se $0 < a \neq 1, b > 0$ e $n \in \mathbb{N}^*$, então

$$\log_a \sqrt[n]{b} = \log_a b^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$$

A demonstração dessa observação é análoga à feita na 3ª propriedade.

Tente fazer!

- Para relembrar, como já visto no módulo anterior, também temos que:

Se $0 < a \neq 1, b > 0$ e $n \in \mathbb{R}^*$, então:

$$\log_a b = \frac{1}{n} \cdot \log_a b$$

- Se $b, c \in \mathbb{R}^*, 0 < c \neq 1, b > 0$, então:

$$c^{\log_c b} = b$$

A demonstração dessa observação é análoga à feita na 3ª propriedade.

Tente fazer!

Exemplo:

$$5^{\log_5 7} = 7$$

APLICAÇÕES DAS PROPRIEDADES

Sabendo que $\log 2 = 0,3$ e $\log 3 = 0,47$, determine os logaritmos abaixo:

Exemplo 1:

$$\log 6 = \log 2 \cdot 3 = \log 2 + \log 3 = 0,3 + 0,47 = 0,77$$

Exemplo2:

$$\log 1,5 = \log \frac{15}{10} = \log \frac{3}{2} = \log 3 - \log 2 = 0,47 - 0,3 = 0,17$$

Exemplo3:

$$\log_2 1024 = \log_2 2^{10} = 10 \cdot \log_2 2 = 10 \cdot 1 = 10$$

Exemplo4:

$$\log_{25} 5 = \log_{5^2} 5 = \frac{1}{2} \cdot \log_5 5 = \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Exemplo5:

$$3^{\log_3 7} = 3^{\log_3 7} = 7$$

Exemplo6:

$$\log 108 =$$

Fatorando o 108, achamos que $108 = 2^2 \cdot 3^3$

$$\log 108 = \log 2^2 \cdot \log 3^3 = \log 2^2 + \log 3^3 = 2 \cdot \log 2 + 3 \cdot \log 3 = 2 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,47 = 2,01$$

Exemplo7:

$$8^{\log_2 5} = 8^{\log_2 5} = (2^3)^{\log_2 5} = 2^{3 \cdot \log_2 5} = 2^{\log_2 5^3} = 5^3 = 125$$

EXERCÍCIO RESOLVIDO

01. Se $\log x + \log x^2 + \log x^3 + \log x^4 = -20$ o valor de x é:

- a) 10 b) 0,1 c) 100 d) 0,01 e) 1

Resolução:

$$\log x + 2 \cdot \log x + 3 \cdot \log x + 4 \cdot \log x = -20$$

$$10 \log x = -20 \rightarrow \log x = -2$$

$$10^{-2} = x \rightarrow x = 0,01$$

02. Para quaisquer reais positivos A e B, o resultado da expressão $\log_A B^3 \cdot \log_B A^2$ é

- a) 10 b) 6 c) 8 d) a.b e) 12

Resolução:

$$\log_A B^3 \cdot \log_B A^2 = 3 \cdot \log_A B \cdot 2 \cdot \log_B A = 3 \cdot \frac{1}{\log_B A} \cdot 2 \cdot \log_B A = 3 \cdot 2 = 6$$

PROEXPLICA

O logaritmo decimal de 5 pode ser escrito de outra maneira:

$$\log 5 = \log \frac{10}{2} = \log 10 - \log 2 = 1 - \log 2$$

Assim, como o valor de $\log 2$ é um número irracional, é necessária uma aproximação e virá no enunciado para você.

PROEXPLICA

Apesar de utilizado em grande escala na Física, a terceira Lei de Kepler, assim como outras leis matemáticas, envolvem, sobretudo, proporcionalidades entre grandezas. No entanto, em alguns casos, transformá-las utilizando logaritmos pode ser útil para facilitar a extração de informações importantes. Portanto, deve-se estar atento à aplicação do logaritmo e suas propriedades em equações como a apresentada na questão a seguir.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

01. Um dos grandes legados de Kepler para ciência foi a sua terceira lei: "o quadrado do período de revolução de cada planeta é proporcional ao cubo do raio médio da respectiva órbita". Isto é, sendo **T** o período de revolução do planeta e **r** a medida do raio médio de sua órbita, esta lei nos permite escrever que: $T^2 = K \cdot r^3$, onde a constante de proporcionalidade **K** é positiva.

Considerando $x = \log(T)$ e $y = \log(r)$, pode-se afirmar que:

a) $y = \frac{2x - K}{2x}$

b) $y = \frac{2x}{3 \log K}$

c) $y = \sqrt[3]{\frac{x^2}{K}}$

d) $y = \frac{2x}{3K}$

e) $y = \frac{2x - \log k}{3}$

Resolução: E

No enunciado, foi dada a seguinte informação: $T^2 = K \cdot r^3$

Agora, aplicando em ambos os lados da igualdade teremos:

$$\log T^2 = \log(K \cdot r^3)$$

Pela propriedade do produto teremos:

$$\log T^2 = \log k + \log r^3$$

Pela propriedade da potência:

$$2 \log T = \log K + 3 \log r$$

Substituindo os dados do enunciado:

$$2x = \log k + 3y$$

$$\text{Portanto } y = \frac{2x - \log k}{3}$$



EXERCÍCIOS PROTREINO

- 01.** Calcule o valor de $\log 500$.
- 02.** Determine o valor de $\log_2 8^5$.
- 03.** Aplicando as propriedades estudadas, simplifique ao máximo os itens abaixo:
- a) $\log_{\sqrt{5}}(2 \cdot 5)$ c) $\log\left(\frac{1}{10}\right)^{19}$
- b) $\log_{\frac{1}{4}}\left(\frac{1}{16}\right)^9$
- 04.** Determine os valores de A abaixo em cada item:
- a) $A = \log 30 + \log 7 - \log 21$
- b) $A = \log_2 100 - \log_2 25$
- 05.** Dado $\log 2 \approx 0,3$, obter o valor aproximado de:
- a) $\log 5$
- b) $\log 20$
- c) $\log \sqrt{5}$



EXERCÍCIOS PROPOSTOS



01. (ENEM PPL) Nas informações veiculadas nos órgão de comunicação quando da ocorrência de um terremoto, faz-se referência à magnitude (M), que se refere a quantos graus o fenômeno atingiu na escala Richter. Essa medida quantifica a energia liberada no epicentro do terremoto, e em seu cálculo utilizam-se como parâmetros as medidas da amplitude sísmica (A), em micrômetro, e da frequência (f), em hertz. Esses parâmetros são medidos por aparelhos especiais chamados sismógrafos, e relacionam-se segundo a função $M = \log(A \cdot f) + 3,3$. Pela magnitude do terremoto na escala Richter, pode-se estimar seus efeitos de acordo com o quadro, onde não estão considerados terremotos de magnitudes superiores a 7,9

Magnitude (grau)	Efeitos do terremoto segundo a escala Richter
$M \leq 3,5$	Registrado (pelos aparelhos), mas não perceptível pelas pessoas.
$3,5 < M \leq 5,4$	Percebido, com pequenos tremores notados pelas pessoas.
$5,4 < M \leq 6,0$	Destrutivo, com consequências significativas em edificações pouco estruturadas.
$6,0 < M \leq 6,9$	Destrutivo, com consequências significativas para todo tipo de edificação.
$6,9 < M \leq 7,9$	Destrutivo, retiraram os edifícios de suas fundações, causam fendas no solo e danificam as tubulações contidas no subsolo.

Um terremoto teve sua amplitude e frequências medidas e obteve-se $A = 1.000$ micrômetros e $f = 0,2$ hertz.

Use $-0,7$ como aproximação para $\log(0,2)$.

Disponível em: www.mundoeducacao.com.br. Acesso em: 11 jul. 2012 (adaptado).

Considerando o quadro apresentado, e analisando o resultado da expressão que fornece a magnitude desse terremoto, conclui-se que ele foi

- a) registrado, mas não percebido pelas pessoas.
- b) percebido, com pequenos tremores notados pelas pessoas.
- c) destrutivo, com consequências significativas em edificações pouco estruturadas.
- d) destrutivo, com consequências significativas para todo tipo de edificação.
- e) destrutivo, com consequências nas fundações dos edifícios, fendas no solo e tubulações no subsolo.

02. (MACKENZIE) Para quaisquer reais positivos A e B (SABENDO QUE $A \neq 1$, $B \neq 1$), o resultado da expressão $\log_A B^3 \cdot \log_B A^2$ é:

- a) 10
- b) 6
- c) 8
- d) $A \cdot B$
- e) 12

03. (ENEM) Para realizar a viagem dos sonhos, uma pessoa precisava fazer um empréstimo no valor de R\$ 5.000,00. Para pagar as prestações, dispõe de, no máximo, R\$400,00 mensais. Para esse valor de empréstimo, o valor da prestação (P) é calculado em função do número de prestações (n) segundo a fórmula

$$P = \frac{5.000 \times 1,013^n \times 0,013}{(1,013^n - 1)}$$

Se necessário, utilize 0,005 como aproximação para $\log 1,013$; 2,602 como aproximação para $\log 400$; 2,525 como aproximação para $\log 335$.

De acordo com a fórmula dada, o menor número de parcelas cujos valores não comprometem o limite definido pela pessoa é

- a) 12. b) 14. c) 15. d) 16. e) 17.

04. (Fuvest) Use as propriedades do logaritmo para simplificar a expressão

$$S = \frac{1}{2 \cdot \log_2 2016} + \frac{1}{5 \cdot \log_3 2016} + \frac{1}{10 \cdot \log_7 2016}$$

O valor de S é

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{5}$
- d) $\frac{1}{7}$
- e) $\frac{1}{10}$

05. (Fuvest) Seja $x > 0$ tal que a sequência $a_1 = \log_2 x$, $a_2 = \log_3(4x)$, $a_3 = \log_8(8x)$ forme, nessa ordem, uma progressão aritmética. Então, $a_1 + a_2 + a_3$ é igual a

- a) $\frac{13}{2}$
 b) $\frac{15}{2}$
 c) $\frac{17}{2}$
 d) $\frac{19}{2}$
 e) $\frac{21}{2}$

06. (FUVEST) Tendo em vista as aproximações $\log_{10} 2 \approx 0,30$, $\log_{10} 3 \approx 0,48$, então o maior número inteiro n , satisfazendo $10^n \leq 12^{418}$, é igual a

- a) 424
 b) 437
 c) 443
 d) 451
 e) 460

07. (FUVEST) A magnitude de um terremoto na escala Richter é proporcional ao logaritmo, na base 10, da energia liberada pelo abalo sísmico. Analogamente, o pH de uma solução aquosa é dado pelo logaritmo, na base 10, do inverso da concentração de íons H^+ .

Considere as seguintes afirmações:

- I. O uso do logaritmo nas escalas mencionadas justifica-se pelas variações exponenciais das grandezas envolvidas.
 II. A concentração de íons H^+ de uma solução ácida com pH 4 é 10 mil vezes maior que a de uma solução alcalina com pH 8.
 III. Um abalo sísmico de magnitude 6 na escala Richter libera duas vezes mais energia que outro, de magnitude 3.

Está correto o que se afirma somente em

- a) I. b) II. c) III. d) I e II. e) I e III.

08. (FUVEST) Se x é um número real, $x > 2$ e $\log_2(x - 2) - \log_2 x = 1$, então o valor de x é:

- a) $4 - 2\sqrt{3}$
 b) $4 - \sqrt{3}$
 c) $2 + 2\sqrt{3}$
 d) $4 + 2\sqrt{3}$
 e) $2 + 4\sqrt{3}$

09. (MACKENZIE) Se a e b , $a < b$, são soluções da equação

$$x^{\log_5 x} = \frac{x^4}{125}, \text{ então o valor de } \frac{1}{2}(b-a) \text{ é}$$

- a) 125 b) 120 c) 60 d) 3 e) 1

10. (MACKENZIE) A equação do 2º grau $x^2 + x \cdot \log t + 0,5 \cdot \log t = 0$ tem duas raízes reais distintas, se

- a) $t > 0$
 b) $t > 1$
 c) $t = 0$ ou $t = 2$
 d) $0 < t < 2$
 e) $0 < t < 1$ ou $t > 100$

11. (ENEM) Charles Richter e Beno Gutenberg desenvolveram a escala Richter, que mede a magnitude de um terremoto. Essa escala pode variar de 0 a 10, com possibilidades de valores maiores. O quadro mostra a escala de magnitude local (M_s) de um terremoto que é utilizada para descrevê-lo.

Descrição	Magnitude local (M_s) ($\mu m \cdot Hz$)
Pequeno	$0 \leq M_s \leq 3,9$
Ligeiro	$4,0 \leq M_s \leq 4,9$
Moderado	$5,0 \leq M_s \leq 5,9$
Grande	$6,0 \leq M_s \leq 9,9$
Extremo	$M_s \geq 10,0$

Para se calcular a magnitude local, usa-se a fórmula $M_s = 3,30 + \log(A \cdot f)$, em que A representa a amplitude máxima da onda registrada por um sismógrafo em micrômetro (μm) e f representa a frequência da onda, em hertz (Hz). Ocorreu um terremoto com amplitude máxima de $2.000 \mu m$ e frequência de $0,2 Hz$.


Disponível em: <http://cejarj.cecierj.edu.br>. Acesso em: 1 fev. 2015 (adaptado).

Utilize 0,3 como aproximação para $\log 2$.

De acordo com os dados fornecidos, o terremoto ocorrido pode ser descrito como

- a) Pequeno. d) Grande.
 b) Ligeiro. e) Extremo.
 c) Moderado.

12. (PUCMG) O quadrilátero de vértices A, B, C e D é um retângulo; também são retângulos os triângulos ADE e ECF. Além disso, as medidas $CE = \log_2 k$, $AD = \log_2 8k$ e $AB = \log_2 512 K$ formam, nessa ordem, uma progressão geométrica.



Com base nessas informações, é correto afirmar que a medida da área do triângulo CEF é igual a:

- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

13. (PUCPR) Suponha que a vazão de água de um caminhão de bombeiros se dá pela expressão $V(t) = V_0 \cdot 2^{-t}$, em que V_0 é o volume inicial de água contido no caminhão e t é o tempo de escoamento em horas. Qual é, aproximadamente, utilizando uma casa decimal, o tempo de escoamento necessário para que o volume de água escoado seja 10% do volume inicial contido no caminhão? (utilize: $\log 2 \approx 0,3$.)

- a) 3h e 30 min. d) 2h e 15 min.
 b) 3h e 12 min. e) 2h e 12 min.
 c) 3h e 18 min.

14. (PUCPR) Sabendo que $\log 20 = 1,3$ e $\log 5 = 0,7$, é correto afirmar que $\log_5 20$ corresponde a:

- a) Exatamente 2.
- b) Exatamente 0,6.
- c) Maior ou igual a 0,5 e menor que 0,6.
- d) Um valor entre 1,8 e 1,9.
- e) Nenhuma das alternativas anteriores.

15. (PUCSP) Um número N é obtido triplicando-se a base e o expoente de 2^y , em que $y \in \mathbb{R}$. Se N é igual ao produto de 2^y por x^y , qual é o valor de $\log x$? (Use: $\log 2 = 0,30$ e $\log 3 = 0,48$)

- a) 2,04
- b) 2,08
- c) 2,12
- d) 2,26
- e) 2,28

16. (UERJ) Uma calculadora tem duas teclas especiais, A e B. Quando a tecla A é digitada, o número que está no visor é substituído pelo logaritmo decimal desse número. Quando a tecla B é digitada, o número do visor é multiplicado por 5.

Considere que uma pessoa digitou as teclas BAB, nesta ordem, e obteve no visor o número 10.

Nesse caso, o visor da calculadora mostrava inicialmente o seguinte número:

- a) 20
- b) 30
- c) 40
- d) 50

17. (UERJ) Admita que a ordem de grandeza de uma medida x é uma potência de base 10, com expoente n inteiro, para $10^{n-\frac{1}{2}} \leq x < 10^{n+\frac{1}{2}}$. Considere que um terremoto tenha liberado uma energia E , em joules, cujo valor numérico é tal que $\log_{10} E = 15,3$.

A ordem de grandeza de E , em joules, equivale a:

- a) 10^{14}
- b) 10^{15}
- c) 10^{16}
- d) 10^{17}

18. (Uerj) Para melhor estudar o Sol, os astrônomos utilizam filtros de luz em seus instrumentos de observação.

Admita um filtro que deixe passar $\frac{4}{5}$ da intensidade da luz que nele

incide. Para reduzir essa intensidade a menos de 10% da original, foi necessário utilizar n filtros.

Considerando $\log 2 = 0,301$, o menor valor de n é igual a:

- a) 9
- b) 10
- c) 11
- d) 12

19. (UECE) Se x é o logaritmo de 16 na base 2, então, o logaritmo (na base 2) de $x^2 - 5x + 5$ é igual a

- a) 2.
- b) 1.
- c) -1.
- d) 0.

20. (UERJ) Admita que, em um determinado lago, a cada 40 cm de profundidade, a intensidade de luz é reduzida em 20%, de acordo com a equação $I = I_0 \cdot 0,8^{\frac{h}{40}}$ na qual I é a intensidade da luz em uma profundidade h , em centímetros, e I_0 é a intensidade na superfície.

Um nadador verificou, ao mergulhar nesse lago, que a intensidade da luz, em um ponto P , é de 32% daquela observada na superfície. A profundidade do ponto P , em metros, considerando $\log 2 = 0,3$, equivale a:

- a) 0,64
- b) 1,8
- c) 2,0
- d) 3,2



EXERCÍCIOS DE APROFUNDAMENTO

01. (UNIFESP) Em um jogo disputado em várias rodadas consecutivas, um jogador ganhou metade do dinheiro que tinha a cada rodada ímpar e perdeu metade do dinheiro que tinha a cada rodada par.

- a) Sabendo que o jogador saiu do jogo ao término da 4ª rodada com R\$ 202,50, calcule com quanto dinheiro ele entrou na 1ª rodada do jogo.
- b) Suponha que o jogador tenha entrado na 1ª rodada do jogo com R\$1.000,00, terminando, portanto, essa rodada com R\$ 1.500,00, e que tenha saído do jogo ao término da 20ª rodada. Utilizando $\log 2 \approx 0,301$, $\log 3 \approx 0,477$ e os dados da tabela, calcule com quanto dinheiro, aproximadamente, ele saiu do jogo.

x	Valor aproximado de 10^x
1,5	32
1,55	35
1,6	40
1,65	45
1,7	50
1,75	56
1,8	63
1,85	71

02. (FGVRJ) Em uma experiência de Física, para cada valor da variável contínua X , obteve-se, no laboratório, um resultado y . A tabela a seguir mostra os resultados de cinco medidas realizadas para valores inteiros de x :

x	Y
1	2,97
2	9,05
3	26,8
4	81,6
5	241

Os resultados sugeriram que, para os valores de x do intervalo $[1,5]$, uma função adequada para modelar essa experiência é exponencial, ou seja, da forma $y = a^x$. De fato, para certo valor inteiro de a , os valores encontrados na experiência e os valores dados por essa função diferem muito pouco.

Usando essa função, determine, aproximadamente, para que valor de x encontra-se $y = 100$.

Utilize o que for necessário:

$\log 2 = 0,301$

$\log 3 = 0,477$

$\log 5 = 0,699$

03. (UNESP) O cálculo aproximado da área da superfície externa de uma pessoa pode ser necessário para a determinação da dosagem de algumas medicações. A área A (em cm^2) da superfície externa de uma criança pode ser estimada por meio do seu "peso" P (em kg) e da sua altura H (em cm) com a seguinte fórmula, que envolve logaritmos na base 10:

$$\log A = 0,425 \log P + 0,725 \log H + 1,84$$


(Delafield Du Bois e Eugene Du Bois. *A formula to estimate the approximate surface area if height and weight be known*, 1916. Adaptado.)

Rafael, uma criança com 1m de altura e 16 kg de "peso", precisa tomar uma medicação cuja dose adequada é de 1 mg para cada 100 cm^2 de área externa corporal. Determine a dose adequada dessa medicação para Rafael.

Adote nos seus cálculos $\log 2 = 0,30$ e a tabela a seguir.


X	10 ^x
3,3	1995
3,4	2512
3,5	3162
3,6	3981
3,7	5012
3,8	6310
3,9	7943

04. (UNICAMP) A superfície de um reservatório de água para abastecimento público tem 320.000 m^2 de área, formato retangular e um dos seus lados mede o dobro do outro. Essa superfície é representada pela região hachurada na ilustração abaixo. De acordo com o Código Florestal, é necessário manter ao redor do reservatório uma faixa de terra livre, denominada Área de Proteção Permanente (APP), como ilustra a figura abaixo. Essa faixa deve ter largura constante e igual a 100 m, medidos a partir da borda do reservatório.



- Calcule a área da faixa de terra denominada APP nesse caso.
- Suponha que a água do reservatório diminui de acordo com a expressão $V(t) = V_0 \cdot 2^{-t}$, em que V_0 é o volume inicial e t é o tempo decorrido em meses. Qual é o tempo necessário para que o volume se reduza a 10% do volume inicial? Utilize, se necessário, $\log_{10} 2 \approx 0,30$.

05. (FUVEST) O número N de átomos de um isótopo radioativo existente em uma amostra diminui com o tempo t , de acordo com a expressão $N(t) = N_0 e^{-\lambda t}$, sendo N_0 o número de átomos deste isótopo em $t = 0$ e λ a constante de decaimento. Abaixo, está apresentado o gráfico do $\log_{10} N$ em função de t , obtido em um estudo experimental do radiofármaco Tecnécio 99 metaestável ($^{99\text{m}}\text{Tc}$), muito utilizado em diagnósticos do coração.



A partir do gráfico, determine

- o valor de $\log_{10} N_0$;
- o número N_0 de átomos radioativos de $^{99\text{m}}\text{Tc}$;
- a meia-vida ($T_{1/2}$) do $^{99\text{m}}\text{Tc}$.

Note e adote: A meia-vida ($T_{1/2}$) de um isótopo radioativo é o intervalo de tempo em que o número de átomos desse isótopo existente em uma amostra cai para a metade; $\log_{10} 2 = 0,3$; $\log_{10} 5 = 0,7$.

GABARITO

▶ EXERCÍCIOS PROPOSTOS

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 01. C | 05. B | 09. C | 13. C | 17. B |
| 02. B | 06. D | 10. E | 14. D | 18. C |
| 03. D | 07. D | 11. C | 15. A | 19. D |
| 04. E | 08. D | 12. C | 16. A | 20. C |

★ EXERCÍCIOS DE APROFUNDAMENTO

- $V_0 = \text{R\$ } 360,00$.
 - $V_{20} \approx \text{R\$ } 56,00$.
- $x \approx 4,2$
- 63,1 mg.
 - $A = 10.000(24 + \pi) \text{ m}^2$
 - $t \approx 3\frac{1}{3}$ meses $\rightarrow$ aproximadamente 3 meses e 10 dias.
- No gráfico, $\log_{10} N_0 = 6$.
 - $N_0 = 10^6 = 1.000.000$.
 - $\log N(t) = 5,7 \Rightarrow t = 6$ horas