


SISTEMA DIGESTIVO


É responsável pela quebra de macromoléculas em micromoléculas, através de catalisadores biológicos chamados de enzima, que aceleram a reação diminuindo a energia de ativação, sendo formado pelo tubo digestivo e suas glândulas anexas. Apresenta as seguintes regiões: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus.



<https://amigopai.wordpress.com/2016/03/29/caracteristicas-comuns-aos-seres-vivos/>

BOCA

Local onde ocorre a mastigação e deglutição do alimento, e as glândulas salivares, parótidas, sublingual e submaxilar, que secretam a ptialina ou amilase salivar que atua na quebra do amido.




<https://www.bemminas.com.br/noticias/minas-gerais/universidade-de-montes-claros-desenvolve-pesquisa-sobre-cancer-salivar/7045>

A amilase salivar atua em pH neutro (7,0), porém, quando o pH é alterado essa enzima desnatura diminuindo sua velocidade.

FARINGE

É um canal comum à via respiratória e digestória, por onde

passam o ar e o alimento, ao final do tubo encontra-se a epiglote que é responsável por regular a passagem do ar para a laringe e do alimento para o esôfago.




<https://www.grupoescolar.com/pesquisa/faringe.html>

ESÔFAGO

É um tubo formado por músculo liso, que impulsiona o alimento para o estômago através de movimentos peristálticos.

ESTÔMAGO

É o órgão responsável pela quebra de proteínas, sendo a pepsina a exima responsável por esse processo, atuando em pH ácido (2,0-2,5), quando estamos de estômago vazio esta enzima se encontra inativa sob a forma de pepsinogênio, que só é convertido pepsina após a liberação de ácido clorídrico no estômago.



<http://mundodabioquimica.blogspot.com/2017/06/pepsina.html>

INTESTINO DELGADO

É o local onde ocorre a etapa final do processo digestivo e absorção dos nutrientes, suas enzimas atuam em pH básico ou alcalino.

O pâncreas é uma glândula mista fundamental no processo digestivo do intestino, secreta o suco pancreático que contém diversas enzimas digestivas, e bicarbonato de sódio para correção do pH, além da função endócrina na produção de hormônios.

SUCO PANCREÁTICO

- **Amilase pancreática** – quebra do amido em maltose.
- **Tripsina e quimiotripsina** – quebra da proteína em aminoácidos.
- **Lipase** – quebra do lipídio em glicerol e ácidos graxos.
- **Nucleases** – degradação dos ácidos nucleicos em

nucleotídeos.

O fígado é um órgão que auxilia o processo digestivo da lipase, pois secreta a bile, armazenada na vesícula biliar, que é uma solução não enzimática capaz de emulsificar gordura, ou seja, quebrando a gordura em pedaços menores para que a lipase atue de forma mais eficaz.


O intestino delgado, também, secreta o suco entérico, que possui a maltase, sacarase e a lactase.

- **Maltase** – quebra a maltose em duas moléculas de glicose.
- **Sacarase** – quebra a sacarose em uma molécula de glicose e outra de frutose.
- **Lactase** – degrada a lactose em uma molécula de glicose e outra de galactose.

Algumas pessoas não produzem a lactase com eficiência ou simplesmente não a produzem, o que as torna intolerantes ou alérgicos a lactose.

INTESTINO GROSSO

É o local responsável pela absorção de água e formação das fezes.



<http://omamifero.blogspot.com/2013/04/o-intestino-grosso.html#.XvpSzyhKhPY>

ÂNUS

É o local por onde as fezes são eliminadas.


REGULAÇÃO HORMONAL

Quando estamos de estômago vazio ocorre a liberação do hormônio grelina pelo estômago, fazendo com que o hipotálamo estimule a sensação de fome, com isso nos alimentamos. Quando estamos de estômago cheio a gastrina é liberada por um grupo de células estomacais, que estimula a liberação de ácido clorídrico (HCl), levando a conversão do pepsinogênio em sua forma ativa a pepsina.

Após o término do processo digestivo no estômago todo conteúdo contido no estômago é passado para o intestino delgado, inclusive todo o suco gástrico. Quando o intestino delgado percebe a mudança de pH no meio, ocorre a liberação do hormônio secretina que estimula o pâncreas a liberar bicarbonato, para normalizar o pH intestinal, e o fígado a produzir a bile que fica armazenada na vesícula biliar.

Após a normalização do pH intestinal o hormônio colecistocinina é liberado, agindo sobre o pâncreas para que este libere o suco pancreático, ao mesmo tempo estimula a vesícula biliar a secretar a bile.


Controle nervoso e hormonal da digestão



Anastasi, José Mariano, 2004; Marinho, Gilberto Rodrigues, 2004; Ed. Moderna

<https://pt.slideshare.net/fernandomorimiyazawa/aula-sistema-digestorio>

Depois que o suco pancreático libera suas enzimas, o intestino de delgado secreta o hormônio **enteroquinase** que estimula a conversão do tripsinogênio em tripsina, sua forma ativa, esta por sua vez age estimulando a conversão do **quimiotripsinogênio** em **quimiotripsina**.



<https://www.anatomiaemfoco.com.br/sistema-digestivo-anatomia/pancreas-suco-pancreatico/>

Enterogastrona é qualquer hormônio secretado pela mucosa do duodeno que inibe a motilidade gástrica, além de impedir a liberação da bile e do suco pancreático e a liberação do íon bicarbonato. Exemplos mais comuns: secretina e colecistocinina.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

01. (UNESP) No processo digestivo, as moléculas orgânicas devem ser quebradas em moléculas mais simples para que possam ser absorvidas. Dentre elas, o amido é um carboidrato:

- cuja digestão inicia na boca por ação da ptialina.
- digerido pela lipase no duodeno.
- que forma um complexo vitamínico que é absorvido, sem digestão, na região do intestino delgado.
- extremamente simples e, por isso absorvido, sem alterações, na região do intestino delgado.
- digerido no estômago por ação do ácido clorídrico.

Resolução: A

