

Aula 3

Dermatoses Parasitárias da Infância

Jandrei Markus

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste conteúdo poderá ser reproduzida, por qualquer processo, sem a permissão expressa dos editores.
Direitos adquiridos pela: Editora Manole Ltda..

Dermatoses parasitárias da infância

Diagnóstico clínico:

- difícil aceitação por familiares.

Doenças frequentes:

- escabiose;
- pediculose;
- larva migrans cutânea;
- miíase;
- tunguíase.

Escabiose

- Difícil aceitação por familiares.
- Diagnóstico:¹
 - aspecto e distribuição das lesões;
 - **prurido**;
 - epidemiologia (outros infectados).
- Contagiosa.

1. European guideline for the management of scabies, 2010.

Escabiose distribuição das lesões

Lactentes:

- axilas, palmas e plantas;
- tronco.

Escolares e adolescentes:

- Interdigitais, axilas, punhos e região perineal.

1. European guideline for the management of scabies, 2010.

Escabiose



Escabiose



Escabiose – tratamento

- Tratamento de todos os contatos, conforme a idade.
- Até 2 meses de vida:
 - enxofre precipitado, 10% em creme;
 - 3 noites seguidas, repetir após 7 dias.
- Acima de 2 meses de vida:
 - Permetrina loção 1 a 5% – aplicar à noite e lavar pela manhã; repetir após 7 dias;
 - Ivermectina, 200 mcg/kg e repetir após 7 dias (maiores de 15 kg).
- Usar anti-histamínicos.

1. European guideline for the management of scabies, 2010.

2. Paller AS, Mancini AJ. Hurwitz. 2011.

3. Sharquie KE et al., 2012.

Escabiose

Orientações gerais:


- Lavar as roupas de todos os contatos.
- Prurido permanece alguns dias.
- Não confundir com escabiose canina.

1. European guideline for the management of scabies, 2010.

2. Paller AS, Mancini AJ. Hurwitz. 2011.

3. Sharquie KE et al., 2012.

Pediculose



Pediculose – tratamento

Permetrina:

- Loção 5%: aplicar por 10 minutos no couro cabeludo e lavar depois – repetir em 7 dias.

Ivermectina (acima de 15 kg):

- 200 mcg/kg e repetir em 7 dias.

Retirada das lêndeas:

- Vinagre.

2. Paller AS, Mancini AJ, Hurwitz. 2011.
4. Tebruegge M, Pantazidou A, Curtis N, 2011.
5. Schmidt E, Levitt, 2012.
6. Keller EC, Tomecki KJ, 2011.

Larva migrans cutânea



Larva migrans cutânea tratamento

Albendazol (acima de 2 anos de idade):

- 400 mg/dia por 3 dias.

Tiabendazol:

- creme, 10 a 15%, 2 vezes/dia, por 2 semanas;
- oral 25 a 50 mg/kg/dia – 2 a 5 dias.

Ivermectina:

- 200 mcg/kg, repetir após 7 dias.

2. Paller AS, Mancini AJ, Hurwitz. 2011.
7. Purdy KS et al., 2011.

Miíase

Primária



Secundária



Miíase – tratamento

Primária:

- oclusão com esparadrapo ou vaselina sólida.

Secundária:

- remoção cirúrgica.

2. Paller AS, Mancini AJ, Hurwitz. 2011.
8. Robbins K, Khachemoune A, 2010.

Tunguíase



Tratamento: remoção cirúrgica

2. Paller AS, Mancini AJ, Hurwitz. 2011.
9. Damazio OR, Silva MV, 2009.

Encerramento

Obrigado!