Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

درمان با ذهن اشتراکی

از طریق پزشکی

(راهنمای کاربردی و نحوه اعلام حلقه توسط کادر درمان)

نسخه مقدماتی - خرداد 1395

***** نکته بسیار مهم *****

برای موارد اورژانسی که زمان کافی نداریم همزمان با اعلام حلقه؛ سریعا اقدامات پزشکی لازم را فراهم نمایید و پس از بهتر شدن شرایط و یا مرخصی بیمار نیز همچنان و بصورت کمکی، ذهن اشتراکی رو تا بهبودی کامل ادامه دهیم.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

فهرست بیماریها و نحوه اعلام در ذهن اشتراکی

انواع مشکلات اسکلتی و ستون فقرات 21

دیسک کمر - دیسک گردن - سیاتیک 21

تنگی کانال نخاعی 21

ترتیکولی (انحراف گردن به یک سمت که باعث میشه بعد از یه مدتی اعضای صورت هم به اون سمت کشیده بشن) 21

گودی کمر 22

بیرون زدگی دیسک، مهره 22

گرفتگی عضلات کمر و پاها 22

خم شدن استخوان دنبالچه 22

التهاب نخاع 23

دژنرسانس مخچه و نخاع 23

قطع نخاع 23

لهیدگی نخاع 23

انحراف ستون فقرات 23

بیماری مننگسل 23

بیماری اسکیلوز 24

بیماری میوپاتی 24

بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان AS 24

تحلیل رفتگی غضروف کتف 24

بالا بودن یک کتف 25

گرفتگی عضلات کتف 25

هالوس والگوس 25

بیرون زدن استخوان کنار انگشت شصت پا 25

سیاه شدن استخوان 25

انواع مشکلات و بیماریهای زانو 26

پارگی رباط و درد زانو 26

زانوی آب آورده 26

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

مینیسک زانو 26
بیمای پاژه و از بین رفتن زانو 26
ژنووالگوم (پای X شکل یا ضربدری) 26
بیماری راشیتیسم یا نرمی استخوان 26
عقب زدگی زانو 27
آرتروز زانو 27
پارگی تاندون زانو 27
(پارگی کامل درجه 3 زانو و لخته شدن خون در کاسه زانو) 27
دررفتگی کشکک زانو 27
کوتاهی و کجی پای چپ 27
خشکی رباط زانوی پا 27
ساییدگی زانو و درد مفاصل 27
پوکی استخوان 28
ماسل اتروفی 28
ازگود-اشلاتر osgood-schlater 28
زواید استخوانی 28
پیوند استخوان 28
شکستگی جمجه 29
چسبندگی تاندون انگشت کوچک 29
شکستگی ران پای چپ و دفورمه شدن 29
شکستگی مکرر ، کج شدن و به لرزش افتادن انگشتان دست 29
انواع مشکلات و بیماری های مو 29
موی چرب 29
موخوره 30
اتوایمیون پمفیگوئید (ریزش منطقه یی مو و عدم رویش مجدد) 30
ریزش مو از جلوی سر 30
برای رشد مجدد مو در ناحیه آسیب دیده؛ 30
ریزش موهای کل بدن ناشی از بالا بودن هورمون فوق کلیوی 30

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ریزش مو ناشی از شیمی درمانی 31
ریزش مو ناشی از استرس 31
لیکن پلان یا ریزش موی سکه ای 31
سفید شدن ناگهان مو 31
ریزش موی ارثی 31
رفع موهای زائد 32
آلوپسی آره آتا 32
تشنج 32
تشنج های دوران نوزادی: 32
تشنج در کودکی و فلج مغزی 32
صرع 33
دیابت 33
دیابت نوع 1 و 2 33
کاهش کراتین و اوره بدن بیمار دیابتی 33
بیمار دیالیزی 33
دیابت کودکان 34
دیابت حاملگی 34
فشارخون بالا 34
انواع مشکلات و بیماریهای چشمی 35
تخریب مویرگهای شبکیه به دنبال دیابت 35
چشم آستیگمات 35
خشکی چشم 35
ناخنک چشم 35
آبریزش چشم 36
التهاب چشم 36
روماتیسم چشم 36
توده چربی روی پلک 36
خونریزی و عفونت چشم سگ 36

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ضعف شدید بینایی 37
انحراف چشم 37
پتوز یا افتادگی پلک 37
عیوب انکساری چشم 37
تنبلی چشم 37
گشادی مردمک 38
تیرگی دور چشم 38
تجمع اشک در چشم 38
نابینایی 38
مگس پرانی در چشم 38
پیرچشمی 38
تاری چشم 39
ترشحات چشم 39
میگرن چشمی 39
آب مروارید (کاتاراکت) 39
آب سیاه (گلوکوم) 39
قوز قرنیه (کراتوکونوس) 40
تیک چشم 40
نارسایی عصب بینایی 40
پف زیر چشم 40
عفونت ویروسی چشم 40
نابینایی از نوع ارپی 41
نابینایی در اثر مصرف الکل 41
خشکیدن عصب چشم 41
پارگی شبکیه بر اثر ضربه 41
آب آوردن شبکیه چشم 41
خشکیدن شبکیه چشم 41
خشکی چشم 41

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

دور بینی 42
نزدیک بینی چشم 42
پیوند قرنیه 42
ماکولار دجنریشن 42
ذهن اشتراکی برای p.v.d شدن زجاجیه چشم 43
انواع مشکلات و بیماریهای گوش 43
بیماری وگنر 43
عفونت قارچی گوش 43
تنیتوس یا وزوز گوش 43
سرگیجه و عدم تعادل 43
گوش درد شدید نوزاد پنج ماهه 43
سندرم مینیر 44
پارگی پرده گوش 44
ناشنوایی و کم شنوایی 44
ناشنوایی بعد از سرماخوردگی، که هیچ دلیل قطعی براش تشخیص ندادن 44
انواع مشکلات و بیماریهای قلبی 44
تپش قلب 44
ضعف عضله قلب باز 44
گرفتگی رگ قلب 45
آریتمی قلبی 45
گرفتگی عروق کرونر 45
سوراخ بین دهلیزی 45
سوراخ ثانویه بین دو دهلیز قلب در کودک 45
سوراخ بین دوبطن در جنین 46
ضخیم شدن دیواره قلب و آئورت 46
نارسایی قلبی 46
صدای اضافه در قلب 46
تنگی دریچه میترال 46

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

لقی دریچه میترال 47
شل شدن سرخرگ آئورت قلب 47
انواع مشکلات دهان و دندان 47
عفونت دندان 47
درد دندان 47
پوسیدگی و عصب کشی دندان 47
سیاهی دندان ناشی از قطره آهن 48
جرم دندان 48
برفک دهان نوزاد 48
آسیب عصب کام کودک 48
عفونت لثه ها 48
خونریزی لثه 48
آفت دهان 49
جای بخیه روی لب 49
از دست دادن حس چشایی 49
برای التیام سریع جراحی فک بخاطر ایمپلنت و جلوگیری از عفونت و درد 49
آسیب تارهای صوتی و حنجره 49
برای تارهای صوتی خانمی که صداش مثل مردا شده در اثر سیگار کشیدن 49
شکاف زبان در اثر آلرژی غذایی 50
کجی مادرزادی لب پایین سمت راست که به سمت پایین میکشه 50
انواع مشکلات حلق و بینی 50
کاهش یا عدم حس بویایی 50
خروپف 50
بیماری بینی رینیت اتروفیک 51
انحراف سپتوم بینی 51
شکستگی بینی 51
گرفتگی و پلیپ بینی 51
گرفتگی بینی و کر بویی 51

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ترشحات پشت حلق (به صورت خلط در گلو یا پر شدن بینی) 51
زخم حفره بینی 52
مشکلات دسته روانشناسی و روانپزشکی 52
اسکیزوفرنیا 52
وسواس 53
سادومازوخیسم 53
پارانویید 53
بیماری دو قطبی 53
فوبیا اجتماعی 54
ترس 54
اختلال شخصیت مرزی 54
بیش فعالی 54
ناخن جویدن 55
شب ادراری کودکان 55
اختلال یادگیری 55
اوتیسم 55
احساس حقارت و درجاتی از اسکیزوفرن به علت آزار جنسی در کودکی 56
تیک عصبی 56
انواع کیست ها، توده ها، تومورها 56
سرطان 56
سرطان فیبو سارکوما (منی جمع شده و بیضه ها بزرگتر از حد معمول) 56
سرطان مغز و استخوان 57
سرطان پستان 57
توده پستانی در دوران شیردهی 57
سرطان متاستاتیک معده به ستون فقرات و لگن 57
سرطان بدخیم پانکراس 57
انواع لوکمی ها یا سرطان های خون 58
سرطان لنفوم 58

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

بیماری cml 58
سرطان متاستاتیک کلیه به مغز 58
سرطان حنجره 58
غده های سینه 58
لنفوم هوچکین 58
فیبروم 59
کیست هموروییید که خیلی دردناک و بزرگ شده 59
کیست تخمدان 59
سرطان تخمدان 59
سرطان ریه 59
متاستاز ریه 59
توده 59
توده ریوی 60
لیپوم چربی 60
گواتر سمی 60
میاستنی گراو 60
توده کبدی 61
پلیپ رحم 61
پولیپ معده 61
کیست 61
پلیپ بدخیم روده بزرگ 61
کیست روی پانکراس 61
خال گوشتی 61
هماتوم سینه 62
آلرژی 62
بیماریها و مشکلات جنسی 62
زودانزالی در آقایان 62
پیرونی 62

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

سندرم کالمن (کم کاری غدد جنسی در مردان) 62
افزایش میل جنسی در آقایان و خانمها 62
انحنای آلت تناسلی توام با هایپوسپادیاس 63
پاره گی فتق 63
تنوع طلبی جنسی 63
خود ارضایی (استمنا) 63
حرکت و افزایش اسپرم 63
هرپس تناسلی 64
واریکوسل (واریس وریدهای بیضه) 64
واریکوسل و کریپتوکیدیسم 64
بی اختیاری ادرار 64
تکرر ادرار 64
آزواسپرمی (فقدان اسپرم) 65
کوچک و مخفی بودن آلت تناسلی در پسربچه 9 ساله 65
انواع بیماریهای پوستی 65
پسوریازیس 65
ویتیلیگو یا بَرَص (لک و پیس) 66
رفع لکه های پوستی و جای بخیه ها 66
درمان جای سوختگی 66
لکه های قارچی 67
زخم های بعد از لیزر 67
بیماری پوستی روزاسه 67
درمان پوست مرغی 67
سوختگی و التهاب پوست 67
خارش پوست نواحی تناسلی 67
اگزما (درماتیک تماسی آلرژیک) 68
پوست پرتقالی 68
انواع لکه های صورت 68

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

خشکی پوست 68
شُل شدن پوست بدنبال لاغری 68
برطرف شدن جای زخم 69
برای کلاژن سازی کلیه 69
چروکها و خطوط عمیق صورت و گودی چشم 69
لک های پوستی رایج در پشت دست 69
آلرژی پوستی به سرما که تبدیل به کهیر میشه 69
ترکهای پوستی بعد از زایمان 69
بروز عارضه پوستی پس از فرادرمانی و دفاعی 69
نظر دکتر در مورد روزه و نخوردن آب و غذا در ماه رمضان 70
دژنرسانس - مشکل تعادل 70
چاقی 70
چربی های بدفرم یا سلولیت 71
نکته جالب و اساسی برای چاقی در ماه رمضان 71
مسائل زنان، زایمان 72
لکه های قهوه ای در اثر بارداری 72
پست پارتوم(افسردگی پس از زایمان) 72
آمنوره یا عدم قاعدگی 72
حاملگی خارج از رحم 73
مسمومیت بارداری یا پرگلامپسی 73
درد رحم 73
گُرگرفتگی خانم ۴۸ ساله 74
آبسه و عفونت سینه در طی بارداری که ماندگار شده 74
بینظمی سیکل قاعدگی 74
تاخیر در قاعدگی 74
درد قاعدگی 74
یائسگی زودرس 75
هم اندازه نبودن سایز پستانها به دلیل شیردهی از یک پستان 75

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ترشح نابجای شیر از پستانها یا گالاکتوره 75
برای بارداری و تشکیل بی عیب جنین 75
توده در حفره اندومتر رحم 75
چسبندگی در لوله‌های رحمی (لوله های فالوپ) 76
چسبندگی لوله های رحم و تخمدانها 76
چسبندگی لوله های رحم و تخمدانها 76
زایمان زودرس 76
پرولاپس رحم 76
درد لگن، پشت ران و زیر شکم 77
قوس کمر بعد از بارداری توام با درد 77
سقط مکرر 77
خانوم باردار ۴ ماهه که جفت در قسمت پایین رحم قرار دارد، برای تغییر محل جفت 77
کسی که سقط جنین داشته و الان دهانه رحم باز نیست و دفع هم نداشته 78
ویار بارداری، تهوع و استفراغ 78
نازایی ناشی از تخمدان ضعیف 78
ضخامت دیواره رحم 78
نازایی 78
کیست بارتلون در واژن 79
سرویسیت (التهاب دهانه رحم) 79
تکرر ادرار خانم مسن 79
عدم رشد پستان دختر **20** ساله 79
عدم رشد پستان دختر **16** ساله 79
تنگی عروق 80
تالاسمی 80
تالاسمی ها و کم خونی 80
رماتیسم مفصلی 80
آسم 80
کبد چرب 81

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

اعتیاد به انواع مواد مخدر 81
ترشح اسید معده 82
هلیکو باکتری یا میکروب معده 82
هلیکوباکتری و التهاب معده و اثنی عشر 82
حساسیت معده 82
زخم معده 83
اختلال عملکرد کلیه ها 83
هیدرونفروز کلیه 83
آنژیومیولیپوم کلیه 83
فیبرز کلیه 83
کیست کلیه 84
کم کاری کلیه 84
ندول اکوژن در کلیه در پارنشیم ثلث میانی کلیه 84
نوروفیبروماتوز 84
آنتی Tpo 85
تورم پروستات 85
سرماخوردگی 85
واریس 85
لرزش دست (ترمور) 85
میگرن شکمی 85
سردردهای شبه میگرنی 86
رقیق شدن خون 86
کیسه صفرا 86
کم کاری تیرویید 86
کم کاری تیرویید بعد از خوردن یُد رادیواکتیو 87
پرکاری تیروئید 87
کم خونی 87
تنظیم هورمونها 87

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

سرمایی و گرمایی 87
پارکینسون 88
برای لرزش و بی حسی دست 88
رشد تاخیری، عدم تکلم و تمرکز دختر چهار ساله پس از تشنج در 4 ماهگی 88
عدم توانایی تکلم بدلیل پارگی رگ گفتار در بدو تولد 88
عدم قدرت تکلم کودک چهار ساله 88
تکلم رباتیک 88
عدم تکلم و راه رفتن 89
تعیین جنسیت 89
بی حسی انگشتان دست و پا 89
پیودرما گانگرنوزوم یا زخم اولسراتیو 89
هموروئید یا بواسیر 90
شقاق 90
یبوست 90
یبوست مزمن و خشکی روده بزرگ منتهی به مقعد 90
فیشر 90
سرماخوردگی های طولانی با بزرگی غدد لنفاوی 91
نقص سیستم ایمنی 91
پلاکت خون پایین (آنمی) 91
پلی سیتمی ورا 92
ایجاد وقفه در رشد مثلا در سن 15 سالگی برای خانم 92
برای افزایش قد پسر 13 ساله 92
تبخال 92
پای فیلی 92
بیماری ALS 93
ترشح هورمون رشد 93
کشیدگی و تورم رباط مچ پا و پشت پا 93
کشیدگی تاندون کشاله ران 93

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

کشیدگی تاندون قوزک خارجی پا 93
آب آوردن ریه 94
نارسایی قلبی و مغزی 94
منتژیومای داخل سینوس کاورنو 94
تیروییید 94
تخریب سلول های پانکراس 94
ضربه مغزی 94
فلج هیستریک 95
سندروم داون در کودکان 95
تومور شوانوما 95
تومور مغزی 96
تضعیف حافظه در اثر آلاینده های هوایی 96
عفونت ریوی 97
عفونت ریوی کودکان 97
پارگی شدید روده 97
عفونت روده یی نوزدان 97
انواع هپاتیت ها 97
هپاتیت اتوایمیون 97
عدم تمرکز در یادگیری و داشتن حافظه ضعیف در کودکان 98
غده هیپوفیز 98
تب مالت 98
ایجاد لخته خون ناشی از سکته قلبی 98
اسکلرودرمی 98
تحلیل بافت ریه 99
باکتری کلبسیلا در واژن 99
هیدروسفالی 99
فشار مغزی بالا 99
فشار مغزی بالا و ایجاد نابینایی 100

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ضخامت پشت گردن جنین 100
چربی خون ارثی و غیر ارثی 100
بیماری sma 100
سالک 101
سارکوییدوز 101
کولیت مقعد 101
درد صورت ناشی از عصب سه قلو 101
عفونت شدید هر دو پا و خشکی و انسداد عروق آن 101
آنفولانزای جدید 102
اورمی یا افزایش اسید اوره خون 102
اوره 102
فلج بلز یا فلج عصب صورت 102
عدم تعادل و حالت فلج داشتن عصب هفت و هشت سمت چپ صورت 103
ناخن فرو رفته در گوشت 103
جوش آکنه 103
کنترل سطح کلسیم پلاسما بدنبال برداشتن غده پارتیرویید 103
آرتریت روماتویید 104
درد دنبالچه 104
هیدرادنیت چرکی 104
تومور GBM بدخیم 104
بیماری پِرتس 104
تورم مغز 104
نقرس 105
کاهش سطح گلبول های سفید خون (برای بیماری که تا 16000 واحد افزایش داره) 105
متاکروماتیک لوکودیسترفی مخففش mld 105
افتادگی مثانه 105
بیماری ریه تراکئو برانکو پاتیا استوکندری پلاستیک 105
سردی بیش از حد ناحیه انتهایی اندامها 105

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

آتروفی بطن مغز 105
کیست ایوزینوفیلیک گرانولوما 106
عفونت شدید ریه 106
بیماری ریتینید پیگمانتر 106
برای بالا رفتن گلبول سفید شخصی که داره شیمی درمانی میشه 106
ایکتیوز 106
تنگی نای به خاطر تراکستومی 106
تعریق کف دست و پا 107
بیماری نیمان پیک سی 107
گل مژه 107
سرفه های شدید و طولانی مدت ناشی از مصرف اسید برای باز کردن لوله ها 107
التهاب تیروییید 107
آلرژی فصلی 107
لوپوس 107
التهاب گره های لنفاوی بدنبال عفونت 107
بیماری هایپرموبیلیتی 108
بیماران کمایی 108
کما در اثر مننژیت 108
کما در اثر ضربه مغزی 108
خلط پشت حلق بخاطر حساسیت 108
از بین رفتن مایع دور جنین 108
بیماری میاستنی گراویس 109
عدم تخلیه مدفوع 109
سکته روده باریک 109
بیماری سیستیک فیبروزیس 109
ام اس 109
نوریت اُپتیک در MS 110
بیماری ای ال اس 110

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ام آر آی گردن 111
بیماری مولتیپل میلوما 111
بیماری توکسوپلاسموز 111
سرفه های شدید بعد از سرما خوردگی 111
بالا آمدن ضریب هوشیاری 111
فلج شبکه بازوی دست راست و ماهیچه ساعد 112
عقب ماندگی ذهنی 112
بافت کلوئید 112
سندرم بهجت 112
پُر شدن صورت و بدن 112
کلانژیت اسکلروزان ، بیماری مزمن کبدی 113
بیماری پلی میوزیت یا تحلیل عضلات 113
بهبود عملکرد طحال 113
بزرگ شدن طحال در اثر سیروز و مشکلpt 113
کیست روی طحال و پشت دیافرگم ناحیه اصلی لگن و شکم، با سابقه ۲ بار شیمی درمانی 113
اختلال در ذخیره گلیکوژن 113
سودومونـاس 114
پلاکت پایین خون 114
هیپر هیدروز 114
فیبرومایلوژی 114
فِروزن شُلدِر 114
خطوط شکننده عمودی ناخن 114
تورم مزمن پا 115
شکستگی و قطع عصب انگشت حلقه بر اثر ضربه 115
بیماری کره هانگتینتون 115
بیماری سلیاک 115
سردرد کِلاستر 115
سندرم روده تحریک پذیر 115

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

نوروپاتی محیطی 115
گره تیروییید 116
گرفتگی عروق پا 116
تخریب بافت ناخن 116
اختلال گفتاری - بیحسی دست چپ 116
دررفتگی های مکرر شانه 116
بیماری استئوسارکوما 117
فیبروز ریه 117
مشکل عدم تمرکز دختر ۱۱ ساله 117
برای بسته شدن رگهای سرکومفلکس چپ شریان کرونر، راست شریان قدامی چپ 117
آرتریید روماتوییید کودکان 118
زونا یا ویروس آبله مرغان 120
سینوزیت مزمن 120
رگهای ریز سطح پوست 121
برگشت حس عصب انگشت 121
کم خونی داسی شکل 121
تاول و خارش ناشی از نیش حشره 122
زگیل 122
میخچه 122
پینه بستن محل میخچه یی که بهبود یافته است 123
کوچک شدن مخچه 123
افزایش سروتونین 123
سکته مغزی 123
سکته مغزی ناشی از افزایش فشار خون دیاستولی 123
آلزایمر 124
آلزایمر و سکته مغزی 124
دیستروفی یا ضعف عضلانی 125
زردی نوزاد 125

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

بیماری کرنیکتروس 125
عفونت ادراری 126
فرو رفتگی مادرزادی دنده و ایجاد عارضه قلبی 126
دفع پروتئین در ادرار 126
رفلاکس ادراری در کودک چهار ساله 126
خونمردگی و تورم بعد از عمل رینو 127
بیماری کرون 127
پیوند مغز استخوان و پایین آمدن پلاکت تا ۲۰ هزار 127
درد معده و آروغ 128
آتاکسی فردریش **ataxi feredrish** 128
مسمومیت غذایی، همراه با تب و استفراغ 128
مسمومیت با دارو (آمپول استامینوفن) 129
سندرم تونل کارپ مچ دست 129
بیماری **E.T** و **pt** 129
مرگ سلول های مغز در کودک ۶ ساله 129
از کار افتادن مغز و هوشیاری صفر 129
کارکرد نامناسب طحال و کلیه و ریه و دستگاه گوارش و معده 129
ایدز 130
استومیلیت و نکروز بافتی 130

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

انواع مشکلات اسکلتی و ستون فقرات

دیسک کمر - دیسک گردن - سیاتیک

سوال: آیا وجود درد در کنار ستون فقرات، قسمت فیله ها و ریختن درد در قسمت باسن تا ساق پا بصورت ماهی یک یا دو بار، به علت دیسک کمر است؟

نحوه تشخیص دیسک کمر

برای تشخیص دیسک کمر، پزشک ابتدا سابقه بیماری شما را بررسی کرده و چندین تست فیزیکی از جمله تست های زیر را انجام می دهد:

تست بالا بردن عمودی پا در تشخیص دیسک کمر: شما دراز می کشید و پزشک پایی را که درد دارد بالا می برد.

تست بالا بردن پای مخالف در تشخیص دیسک کمر: شما دراز کشیده و پزشک پایی را که درد ندارد بلند می کند.

آزمایش عصبی در تشخیص دیسک کمر: اگر تست های بالا با درد پا یا کمر همراه باشد، این آزمایش انجام می گیرد که نتیجه مثبت آن نشانه وجود دیسک کمر است. آزمایش کامل شامل تست رفلکس، قدرت عضله، توانایی راه رفتن و وجود بی حسی است. همچنین ممکن است پزشک وجود بی حسی در ناحیه مقعد را نیز بررسی کند زیرا که این قسمت هم ممکن است تحت تاثیر فتق دیسک کمر قرار گیرد.

اعلام میکنیم برای؛ تخریب و در امتداد قرار گرفتن ناحیه هرنی شده دیسک به داخل کانال نخاعی

آزاد سازی فاکتورهای ضدالتهابی در جهت رفع التهاب کانال نخاعی

رفع فشار از روی عصب سیاتیک کمری و شاخه های لگنی

اصلاح وضعیت قرارگیری دیسک های بین مهره ای در یک امتداد

رفع فشار از بافت نخاعی و ریشه های عصبی خارج شده از فورامن ها

افزایش قدرت عضلات نگهدارنده ستون فقرات

تنگی کانال نخاعی

(تنگی کانال مهره های گردن و ستون فقرات)

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم جابجایی مهره و بهبود بافت ارتجاعی مهره

تسهیل ساختار پیام رسانی عصب،

قرارگیری صحیح مهرها در راستای خود،

کاهش اسپاسم عضلات اطراف مهرها

ترتیکولی (انحراف گردن به یک سمت که باعث میشه بعد از یه مدتی اعضای صورت هم به اون سمت کشیده بشن)

اعلام می کنیم برای؛ ترمیم عضلات و اعصاب در نخاع گردنی و رفع التهاب عضلات و مهره های گردنی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

گودی کمر

اعلام میکنیم برای؛ جلوگیری از تحدب کم، رفع اسپاسم عضلات کُنری، قرار گرفتن مهرهای کمری در وضعیت نرمال

بیرون زدگی دیسک، مهره

(خانمی 52 ساله با بیرون زدگی دیسک 3 مهره کمر و 1 مهره دنبالچه که پزشک گفته اگه رعایت نشه احتیاج به عمل پیدا میکنه اعصاب مربوط به پنجه ها و کف هر دو پا اکثر اوقات تحریک میشه)

ربطی به حس کف پا نداره و اعلام می کینم برای؛ جا انداختن مهرهای آسیب دیده، کاهش التهاب اطراف و کاهش اسپاسم

گرفتگی عضلات کمر و پاها

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد عضلات و سیستم عصب دهی به اون عضله

بهبود عملکرد پمپ های سدیم، پتاسیم و کلسیم (که در انقباض و انبساط عضلات نقش مهمی دارند)

هشدار پزشکی: در مورد گرفتگی و اسپاسم شدید عضلات کمر و پاها در بسیاری از مواقع مشکل ناشی از سیستم رگها و عروق بدن، سیاهرگها و سرخرگها یا شریانهاست که ایجاد لخته می شود و بالا می رود و آمبولی می دهد. لذا هر گونه گرفتگی و اسپاسم شدید توام با سردی و گرمی بیش از حد یا لنگش متناوب خطرناک می باشد و سریعا باید به جراح مراجعه نمود.

خم شدن استخوان دنبالچه

اعلام میکنیم برای؛ کاهش التهاب رباط های بین استخوان خاجی و استخوان و ساکروم

شوک نخاعی

اعلام میکنیم برای؛ کاهش ادم و التهاب بافت نخاعی آسیب دیده

افزایش خونرسانی به ناحیه آسیب دیده و تنظیم فعالیت سیستم سمپاتیک و پاراسمپاتیک

ترمیم آسیب دیدگی نخاع

اعلام میکنیم برای؛ افزایش ترشح فاکتورهای رشد عصبیNGF و BDNF از میکروگلیاها و ماکروفاژها و آستروسیتها

افزایش بیان ژنهای مرتبط با فعال سازی پروجنیتور سل های الیگودندروسیتی و فراخونی به ناحیه آسیب دیده نخاع

حذف عاملهای مهارگر بازسازی آکسونی شامل مهارگرهای پروتوگلیکانی.میلینی و اکستراسلولار ماتریکس

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

التهاب نخاع

اعلام میکنیم برای؛ رفع فشار از روی بافت نخاع و ریشه های عصبی

متوقف شدن پروسه فاکتورهای التهاب زا و افزایش ترشح گلوکوکورتیکییدها

دژنرسانس مخچه و نخاع

واژه دژنرسانس به معنای تخریب و تحلیل بافتی بوده که در بسیاری از بافتها و به علتهای متفاوتی مانند بیماریهاس سیستم ایمنی، سرطانها و حتی کهولت سن ایجاد میشود. نوع بیماری و علت برای اعلام ذهن اشتراکی لازم است.

قطع نخاع

(قطع نخاع در اثر شلیک گلوله)

اعلام میکنیم برای؛ افزایش ترشح فاکتورهای رشد عصبیNGF و BDNF از میکروگلیاها و ماکروفاژها و آستروسیتها

افزایش بیان ژنهای مرتبط با فعال سازی پروجنیتور سل های الیگودندروسیتی و فراخونی به ناحیه آسیب دیده نخاع

حذف عاملهای مهارگر بازسازی آکسونی شامل مهارگرهای پروتوگلیکانی، میلینی و اکستراسلولار ماتریکس

لهیدگی نخاع

(حدود سه هفته س که برای یک جوان ۳۶ ساله ی ویلچرنشین که ۱۲سال پیش دچار لهیدگی نخاع شده است اتصال اعلام می شه ولی از شدت درد دست و پا نمیتونه زیاد در اتصال بمونه! ایشون میگن فقط اتصال شب اول خیلی خوب بوده و به خواب خوبی فرو رفته. لطفا در مورد ایشون با دکتر مشورت کنید یا هر پیشنهادی دارید ممنونم میشم)

وجود درد در دست و پا بعد از اتصال می تواند نشانه برگشت و ترمیم سیستم عصبی است زیرا احتمال دارد که تا حالا دردی وجود نداشته و در این سه هفته که برای فرد اتصال اعلام می شود اعصاب مجددا شروع به ترمیم کرده است پس سعی کنید فرد را با کمک تشویق به راه رفتن نمایید.

انحراف ستون فقرات

انحراف ستون فقرات معمولا ایدیوپاتیک یا بدون علت واضحی هست و ممکن است ژنتیک در بروز آن نقش داشته باشد...

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن معیوب مرتبط با شروع روند اسکلیوز ستون فقرات

بیماری مننگسل

بیماری مننگسل یک ضایعه ی نخاعی مادرزادی است ....

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح قرارگیری ساک نخاعی فتق شده و ریشه های عصبی در موقعیت صحیح آناتومیک

و ترمیم لایه های تشکیل دهنده نخاع

بیماری اسکیلوز

(باعث کوتاه شدن پای راست و چرخش لگن و خارج کردن ستون فقرات از شکل طبیعی و چرخش ستون فقرات در بیمار شده است)

بیماری اسکلیوز علل مختلفی دارد و با توجه به نوع علت برای آن ذهن اشتراکی اعلام میکنیم. برای مثال علل مادرزادی، اختلال عصبی، عضلانی و یا نقایص ساختارهای استخوانی، عفونت و شکستگی...

بیماری میوپاتی

(بیمار دچار انحراف ستون فقرات و کشیدگی تاندول آشیل و پیچ خوردن شانه ها به داخل و کوتاهی عضلات شده است)

میوپاتی ها Myopathy دسته ای از بیماریهای عضلانی می باشند که معمولا با ضعف در عضلات تظاهر پیدا می کنند. علایم بیماران ممکن است در ارتباط با موارد زیر باشد: خستگی سریع‌تر نسبت به افراد طبیعی، ضعف و کاهیدگی (آتروفی) عضلانی، یا دگرشکلی (دفورمیتی) در اندام و ستون فقرات، احتمال وجود درد و گرفتگی‌های عضلانی... میوپاتی انواع مختلفی دارد که به صورت ارثی و یا در اثر اختلال متابولیک، اختلال در غدد درون ریز، عفونتها، بیماریهای بافت همبند، مواد سمی یا ثانویه به عوامل دیگر ایجاد می شود.

لذا؛ با توجه به نوع آن ذهن اشتراکی اعلام می شود

بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان AS

بیماری اسپوندیلیت انکیلوزان Ankylosing Spondilitis یک نوع بیماری روماتیسمی مزمن است که موجب جوش خوردن مهره ها در ستون فقرات می شود.

اعلام میکنیم برای، اصلاح فعالیت شناختی سیستم ایمنی (حذف فعالیت های اتوایمیون)

اصلاح وضعیت ژن معیوب (ژن HLA27)

اصلاح سطح و عملکرد IL1 TNFa cd4

بازسازی و اصلاح وضعیت سلولهای ستون فقرات

تحلیل رفتگی غضروف کتف

اعلام میکنیم برای؛ افزایش تولید گلوکوزامین و کندروتین سولفات جهت ترمیم غضروف آسیب دیده

بهبود و افزایش ترشح مایع سینوویال در ناحیه کپسولی

کتابخانه عرفان حلقه Telegram.me/EHbooks

بالا بودن یک کتف

(بالا بودن یک کتف به دلیل عدم رعایت اصول صحیح در دوران مدرسه)

اعلام میکنیم برای؛ افزایش کشش عضلات کوتاه شده بالابرنده کتف و فیبرهای فوقانی عضله ذوزنقه ای

و همچنین تقویت عضلات پایین برنده کتف

درد گردن و کتف

معمولا عضلات گردن دچار ضعف و اسپاسم هستند که گردن درد ایجاد می شود،

اعلام میکنیم برای؛ کاهش اسپاسم عضلات نواحی گردن و کتف

گرفتگی عضلات کتف

(برای گرفتگی عضلات و عصب عضله کتف که در اثر خستگی و شوک عصبی سالهاست درد و درگیری ایجاد میکنه)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد عضلات و سیستم عصب دهی به عضلات

بهبود عملکرد عضلات اون ناحیه و بهبود عملکرد اعصابی که به اون ناحیه عصب دهی دارند

توصیه دارویی: اگر با مصرف دارو مشکل ندارید پیشنهاد می شود کپسول گاباپنتین 300 میلی را بصورت هر شب یک عدد تا سه شب مصرف کنید، اگر جواب داد اونوقت یک شب در میان یک عدد مصرف کنید و سپس کم کم مصرف دارو رو قطع کنید.

هالوس والگوس

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن معیوب مرتبط با انحراف مفصلMTP

بیرون زدن استخوان کنار انگشت شصت پا

اعلام می کنیم برای؛ فعال شدن استیوکلاستها در تخریب و حذف استخوان معیوب و بازسازی صحیح توسط سلولهای استخوان ساز

سیاه شدن استخوان

(بر اثر تصادف و بازی بدمینتون استخوان سیاه شده و از بین رفته غضروف و مفاصل رو هم داره از بین می بره)

اعلام می کنیم برای؛ وقفه مسیر نکروزی در استخوان و غضروف مذکور و فعال شدن سلولهای استخوان ساز برای ترمیم ناحیه

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

انواع مشکلات و بیماریهای زانو

پارگی رباط و درد زانو

برای ترمیم رباط زانو، ایجاد داربست سلولی، ترمیم و القای رشد سلولهای بافت همبند آسیب دیده ناحیه تاندون زانو

کاهش ترشح فاکتورهای ضد التهابی پروستاگلاندین ها و برادی کینین در جهت کاهش روند التهاب بافتی موضع آسیب دیده

زانوی آب آورده

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم و اصلاح غضروف آسیب دیده مفصل زانو بوسیله فعال سازی فاکتورهای ضدالتهابی

تنظیم ترشح و حذف مایع سینوویال اضافی توسط مکانیسم های سیگنالینگ سلولی

مینیسک زانو

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سلولهای زانو، غضروفهای مفصلی زانو، رباط ها و مینیسک های مسؤول حفظ تعادل در زانو

بیمای پاژه و از بین رفتن زانو

همون چیزی که برای تومور اعلام میکنید + ترمیم سلولها و غضروف مفصلی

ژنووالگوم (پای X شکل یا ضربدری)

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح و ایجاد هماهنگی در فرایند تغییرات رشد مرتبط با صفحه رشد استخوانی در زیر سن بلوغ و افزایش جذب کلسیم و فسفر از سیستم گوارشی

اعلام میکنیم برای؛ تولید سلولهای استیوکلاست جدید در جهت بازسازی بافت جدید استخوانی با امتداد و جهت صحیح ناحیه ساق ها و تنظیم سطح کلسیم و فسفر در سلولهای استیو کلاست یا سلولهای سازنده استخوان

بیماری راشیتیسم یا نرمی استخوان

علت اصلی بیماری ژنووالگوم یا پای X شکل، بیماری راشیتیسم یا نرمی استخوان می باشد. برای راشیتیسم اعلام میکنیم برای؛

افزایش ساخت ویتامین D یا کلسیفرول در کلیه ها

افزایش جذب کلسیم و فسفر از بافت روده ها

افزایش جذب کلسیم از سیستم گوارشی و کاهش برداشت آن از بافت استخوانی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

عقب زدگی زانو

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ترشح کپسول مفصلی زانو

تقویت رباطهای مفصل زانو و تقویت قدرت انقباضی عضله چهار سر ران و عضلات اکستانسور و دوقلوی ران

آرتروز زانو

(آرتروز شدید زانوی چپ - چسبندگی مفصل هیپ چپ - انقباض ماهیچه پای چپ)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود بستر عروقی و خونرسانی ناحیه غضروف و اصلاح ترشح مایع سینوویال در جهت نرمی حرکات مفصلی

پارگی تاندون زانو

(پارگی کامل درجه 3 زانو و لخته شدن خون در کاسه زانو)

برای ترمیم رباط زانو؛ ایجاد داربست سلولی، ترمیم و القای رشد سلولهای بافت همبند آسیب دیده ناحیه تاندون زانو

کاهش ترشح فاکتورهای ضد التهابی پروستاگلاندین ها و برادی کینین در جهت کاهش روند التهاب بافتی موضع آسیب دیده

و برای لخته اعلام میکنیم برای؛ حذف لخته توسط آنزیم پلاسمین و فعال شدن مکانیسم های مرتبط با آزادسازی آن

دررفتگی کشکک زانو

اعلام میکنیم برای؛ قرارگیری استخوان کشکک در شیار تروکلای استخوان ران و ترمیم سطح مفصلی و رباط و بافت نرم آسیب دیده

کوتاهی و کجی پای چپ

(کوتاهی پای چپ بر اثر عمل - چسبندگی شدید در ران - خشک شدن کشکک زانو - کجی پا)

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح وضعیت حفره استابولوم و غضروف سر استخوان ران و کپسول مفصلی و افزایش قدرت عضلات لگنی

خشکی رباط زانوی پا

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم و تقویت سطوح مفصلی و استخوان

ترمیم غضروف های سطح مفصلی، ربات ها و عضلات حمایت کننده مفصل زانو

ساییدگی زانو و درد مفاصل

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم و تقویت سطوح مفصلی و استخوان

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ترمیم غضروف های سطح مفصلی، ربات ها و عضلات حمایت کننده مفصل زانو

پوکی استخوان

افزایش جذب کلسیم

افزایش فعالیت سلولهای سازنده ی استخوان

کاهش فعالیت سلولهای خورنده ی استخوان

بهبود خونرسانی به استخوانهای سراسر بدن

کاهش فعالیت سیستم ایمنی در برخورد با استخوان

افزایش ترشح اپیوییدهای درون زا در جهت کاهش دردهای استخوانی

ماسل اتروفی

(برای ماسل اتروفی و از دست رفتن انعطاف زردپی و پوکی استخوان افراد سالمند)

اعلام میکنیم برای هر سه ناحیه....

افزایش ساخت کلاژن برای ترمیم تاندونها

افزایش فعالیت استیو بلاستها برای تشدید روند استخوان سازی و کاهش فعالیت استوکلاستها

افزایش فعالیت میو بلاستها برای ساخت و ترمیم عضلات تحلیل رفته

ازگود-اشلاتر osgood-schlater

اعلام میکنیم برای اصلاح استخوان سازی توسط سلولهای استیوبلاست در ناحیه ساق

زواید استخوانی

اعلام میکنیم برای؛ تحلیل و خورده شدن زوائد توسط سلولهای استیوکلاست

و محدودیت تغذیه اونها (چون ممکنه خوش خیم نباشند) و محصور شدنشون توسط بدن

پیوند استخوان

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سلولهای مغز قرمز استخوان

بهترین عملکرد برای سلولهای پیوند شده

کتابخانه عرفان حلقه Telegram.me/EHbooks

شکستگی جمجه

(برای آقای کارگر ۲۲ ساله که جمجه ی سرش کمی شکسته و چند لکه ی خون روی مغزشه! قسمت اصلی مغزش هم ضربه شدید خورده، و ضریب هوشیاریش ۴ هست اما امروز دکترها گفتند علایم با عکسها نمیخونه - همه ارتباطات دفاعی تا ۸ دکترها قطع امید کردند)

اعلام میکنیم برای؛ کنترل خونریزی از عروق با ترشح فیبرینوژن...

رفع اِدِم و التهاب بافت و قطع ترشح گلوتامات و خونرسانی به سلولهای آسیب دیده و ترمیم سلولی

چسبندگی تاندون انگشت کوچک

(برای چسبندگی تاندون انگشت کوچک پای چپ که به علت شکستگی انگشت و بودن در گچ به مدت طولانی برای جوش خوردن استخوان، بوجود آمده و پزشک هم گفته که درمانی نداره. چی باید اعلام کنم؟)

سوال واضح نیست اما بطور کلی اگر در زمینه بی حرکتی عضو بوده باشد اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد تاندون انگشت کوچک

توصیه های پزشکی و مکمل: مصرف ویتامین B6 یا کپسول گاماپنتین + ماساژ در آب گرم + فیزیوتراپی

شکستگی ران پای چپ و دفورمه شدن

(شکستگی ران پای چپ که طی سالها بعد ۵/۳ سانت قدش بیشتر از پای راست رشد کرده کمی هم چاقتر از پای راست شده)

اعلام میکنیم برای؛ سلولهای تخریب گر استخوانی در ناحیه شکستگی برای برداشتن بافت استخوانی اضافی و دفورمه و استخوان سازی صحیح در ناحیه توسط سلولهای استخوان ساز

شکستگی مکرر ، کج شدن و به لرزش افتادن انگشتان دست

اعلام میکنیم برای؛ سلولهای تخریب گر استخوانی در ناحیه شکستگی برای برداشتن بافت استخوانی اضافی و استخوان سازی صحیح در ناحیه توسط سلولهای استخوان ساز

انواع مشکلات و بیماری های مو

موی چرب

بیشتر علت ژنتیکی دارد اما در برخی موارد علل هورمونی نیز دارد

اعلام میکنیم برای؛ بهبود ترشح هورمونهای جنسی

ترشح هورمونهای تخمدان ها و غدد فوق کلیوی در جهت کنترل ترشح فولیکولهای مو

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

اصلاح و بازسازی ژن معیوب مداخله کننده در پرکاری و ترشح بیش از اندازه فولیکولهای مو

موخوره

اعلام میکنیم برای؛ افزایش استحکام مو و بهبود خونرسانی و تغذیه فولیکولهای مو

افرایش چسبندگی لایه های مو در تمام سطوح طولی و عرضی...

(علت آن آسیب فیزیکی مو هست و در صورت استفاده کمتر از سشوار و اتوی مو حل می شود)

اتوایمیون پمفیگوئید (ریزش منطقه یی مو و عدم رویش مجدد)

اعلام میکنیم برای؛ شناسایی صحیح پروتیین های سلولی توسط سیستم ایمنی (قطع فعالیت سیستم ایمنی علیه خود بدن)

افزایش ترشح کورتیکواستروییدها و مهار تخریب فولیولهای مو توسط سیستم خودایمنی و بازسازی آنها

ریزش مو از جلوی سر

(ریزش موی خانمها بخصوص، از جلوی سر مانند آقایان)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد هورمونها + تقویت غدد چربی و عرق دور مو + تقویت بستر رشد مو

تقویت فولیکولهای مو و افزایش جذب مواد لازم جهت سلامت و رشد مو، مثل "روی و ویتامین های خاص"

برای رشد مجدد مو در ناحیه آسیب دیده؛

اعلام میکنیم برای؛ بهبود خونرسانی مویرگهای خونی ناحیه پاپیلای فولیکول

افزایش و تقویت پایانه های عصبی در ناحیه فولیکول که نقش القایی در کارکرد فولیکول دارند.

ریزش موهای کل بدن ناشی از بالا بودن هورمون فوق کلیوی

(برای کسی که موهای کل بدنش ریزش داره و فقط هورمون فوق کلیویشون بالاست همه هورمون ها نرمال هستند و همچنین رگ های صورتشون به رنگ بنفش خیلی اومده بیرون مثل حالتی که پوست نازک بشه و جوش هم میزنن)

برای این مورد که بنام آلوپسی آندروژنیک شناخته می شود و رنگ پوست هم با اون مرتبط هست اعلام میکنیم...

تنظیم عملکرد غده فوق کلیوی در جهت کنترل سطح سرمی هورمون آندروسترون

کاهش فعالیت سیستم ایمنی به خصوص در قسمت T لنفوسیت ها برای بهبود عملکرد فولیکولهای مو

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ریزش مو ناشی از شیمی درمانی

داروهای شیمی درمانی بر روی رشد سریع سلولی مانند سلولهای سرطانی تاثیر دارند و باعث از بین بردن رشد سریع در تمامی سلولهای بدن میشوند. برای کاهش ریزش مو در شیمی درمانی میتونیم به این شکل اعلام کنیم.....

کاهش خونرسانی به فولیکولهای مو و درنتیجه کاهش اثرات بلاک کننده رشد فولیکولهای مو در اثر داروهای شیمی درمانی

ریزش مو ناشی از استرس

اعلام میکنیم برای؛ مهار تخریب فولیکولهای مو بدنبال فعالیت خود ایمنی گلوبولهای سفید

لیکن پلان یا ریزش موی سکه ای

(زنی۵۲ ساله ام که چند سالیست مبتلا به بیماری لیکن پلان -ریزش موی سکه یی- شده ام در ضمن به تازگی کاشت مو داشتم)

(خانمی در دو نقطه روی سرش دچار کچلی شده است که وسعت آن رو به افزایش نیز هست. ایشان یکبار دیگر چند سال پیش هم سابقه داشتند (به دلیل مشکل روحی احتمالاً) که با آمپول کورتون رفع شده بود)

(سالها قبل بسیار عصبی و افسرده بودم و در اثر یه شوک موهام شروع به ریزش کرد لکه های قهوه ای توی سرم که تکه تکه خالی شد دکتر پوست زیاد رفتم و حتی ۶ ماه کورتن درمانی جواب نداد این سالهایی که کلاس اومدم خودم ذهن اشتراکی إصلاح ترمیم و بازسازی پوست و ریشه اعلام کردم که جواب نداده لطفا از دکتر سؤال کنید توی ذهن اشتراکی چی اعلام کنم البته به نظرم ریشه بیماری غیر ارگانیکی هست در ضمن دکتر ها گفتن اسم بیماری لیکن پلان هست)

لیکن پلان، یک بیماری ژنتیکی خارش دار مزمن در پوست است که علت آن نوعی اختلال در سیستم ایمنی بدن است و موجب می شود نوعی هورمون یا ماده مخصوص در خون و پوست آزاد شده و یک فعالیت غیر طبیعی را در پوست و سایر نواحی ذکر شده از بدن آغاز کند که موجب خارش و بروز ضایعات کوچک برجسته می شود. برای ریزش موی سکه ای که مشکلات روحی در اون دخیل هست بهتره اعلام میکنیم برای؛

کاهش برخورد سیستم دفاعی و ایمنی بدن با فولیکول های موهای ناحیه مبتلا

حذف فعالیت سیستم خودایمنی و افزایش ترشح کورتیکواستروییدها در جهت کاهش التهاب و خارش

سفید شدن ناگهان مو

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد و تداوم فعالیت ملانوسیت ها جهت تولید ملانین

افزایش فعالیت سیستم های هورمونی و تغذیه یی برای پشتیبانی از ملانوسیت ها جهت تولید بیش از اندازه ملانین و حفظ رنگدانه ها

ریزش موی ارثی

اعلام میکنیم برای؛ تقویت فولیکول مو (فولیکول پر قدرت)

تقویت غدد چربی و عرقی دور مو

جذب حداکثر مواد لازم برای رشد مو (مثل روی و ویتامین های خاص ...)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

رفع موهای زائد

اعلام میکنیم برای؛ کاهش بسیار زیاد فعالیت فولیکولهای موهای آن بخش از بدن که خواهانیم از بین رفته یا کم پشت شود

کاهش مواد غذایی، خون، عرق و چربی به نواحی مورد نظر

توصیه پزشکی: موهای بدن برای سلامت بافت و پوست همان ناحیه مفید است لذا در صورتی اعلام کنیم که واقعا زائد هستند، مثل موهای زائد و ریش گونه روی چانه و صورت خانمها

آلوپسی آره آتا

اعلام میکنیم برای؛ افزایش فعالیت سیستم ایمنی

افزایش تولید کورتیکو استروییدها در جهت کنترل ضایعه

بهبود خونرسانی به فولیکولهای مو در ناحیه

تشنج

تشنج های دوران نوزادی:

(بچه برادر من در شب دومی که به دنیا اومد تشنج کرده و بعد از ام آر آی لکه ای روی مغزش دیده شده که الان تحت نظره متخصص هست و الان ۳ماه شده و سیستم بلعش درست کار نمیکنه و با لوله شیر میخوره ضمن اینکه پزشک ها میگن ۷۰درصد با رشد بچه امکان رفع شدن ضایعه هست)

تشنج های نوزادی می تواند علل مختلفی داشته باشد که از مهم ترین آنها هایپوکسی یا نرسیدن اکسیژن به بافت مغز و همچنین کاهش قند خون نوزادی و یا آسیبهای تروماتیک کانال زایمان بدو تولد را نام برد. به هر کدام از دلیل های ذکر شده که تشنج ایجاد شود میتواند باعث تخریب نورونهای ناحیه درگیر شود...لذا،

اعلام میکنیم برای؛ بازسازی یا رژنراسیون نورونهای آسیب دیده به دنبال آسیب و یا تشنج ایجاد شده ...

جذب خونریزی احتمالی ایجاد شده و کاهش ادم ناحیه مذکور در جهت بهبود عملکرد انتقالی نورونهای منطقه

(در صورت بهبود و بازسازی نورونهای تخریب شده مشکل بلع نیز برطرف خواهد شد)

تشنج در کودکی و فلج مغزی

(برای بچه 7 ساله که هر روز سه بار در حال خنده و خیره شدن، تشنج میکنه بعد بیحال میشه چطور ارتباط بدیم، در ضمن در مورد بچه هایی که به علت تشنج در کودکی دچار فلج مغزی شدن چه نقاطی که باید کار بشه)

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم متعادل تبادلات یونی در تمام سلولهای عصبی (تشنج انواع مختلفی دارد)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

بهبود عملکرد سلولهای مغزی و راههای عصبی و از بین رفتن کانونهای تشنج در مغز

صرع

صرع دو نوع اصلی و شش زیر مجموعه دارد و بسته به اینکه از کدام نوع باشد می توانیم درخواست ذهن اشتراکی داشته باشیم:

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم متعادل تبادلات یونی در تمام سلولهای عصبی

به حالت طبیعی برگشتن تمام سیستم هایی که در مغز و اعصاب شروع به فعالیت نموده اند (تا تخلیه انرژی و تغذیه آنها طبیعی شود و صرع به سمت کنترل پیش رود که در نهایت، آرامش زیادی رو به همراه خواهد داشت)

کنترل دشارژ سلولی و بلاک فعالیت کانونهای سلولی شروع کننده صرع....

مهار فعالیت نابجای کانالهای سدیمی و افزایش فعالیت کانالهای گابا در مهار تحریکات سلولی

دیابت

دیابت نوع 1 و 2

(دیابت نوع یک یا قند خون وابسته به انسولین و در افراد بالای چهل سال شایع است)

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم تولید انسولین توسط سلول های لانگرهانس در لوزالمعده یا پانکراس(انسولین سازی)

تولید انسولین توسط سلولهای لانگرهانس در روده باریک (مقدار کمی انسولین سازی دارد)

بهبود عملکرد سلول های بدن در مصرف قند (تا قند اضافی در خون باقی نماند)

کاهش کراتین و اوره بدن بیمار دیابتی

اعلام میکنیم برای؛ افزایش و تقویت سیستم دفاعی و ایمنی بدن

بهبود عملکرد سلولهای کلیه + بهبود عملکرد گلومرول های کلیه

بیمار دیالیزی

بهبود عملکرد کلیه + بهبود عملکرد تمام سلولهای کلیه + بهبود عملکرد گلومرول های کلیه

بهبود خونرسانی به کلیه ها + بهبود تخلیه لنفاتیک کلیه + بهبود سیستم تخلیه و ادرار

کاهش آسیب پذیری سلولهای کلیه نسبت به داروهای دیابت مثل انسولین و ...

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

کاهش تولید اسید اوریک + افزایش دفع اسید اوریک و ترکیبات اوره اضافی از بدن

زخم پای دیابتی

در مورد زخم پای دیابتی چند تا نکته را باید بدونید. ما در بیماری دیابت اختلال حسی اعصاب یا نوروپاتی را داریم بعلت اختلالی که در مسیرهای اعصاب حسی به خصوص مسیرهای انتهایی ایجاد میشه. همچنین توی دیابت ما با مشکل عروقی و اختلال خونرسانی مواجه هستیم. پس یک فرد دیابتی بدون توجه به میزان قند خون افزایش یافته و مرتبط با مدت زمان درگیری اش با بیماری دیابت میتونه در اثر بی دقتی مانند پوشیدن کفش نامناسب و یا موارد مشابهی که فشار و آسیب بافتی میده دچار زخم دیابتی بشود که درمانش مشکل بوده و با توجه به شدت و وسعت زخم و اینکه گانگرنه باشه و یا نه، باید درمان آنتی بیوتیکی و شتشو و پانسمان با مواد پانسمانی خاص را داشته باشه. در مورد زخمی که توی تصویر دیده میشه با توجه با گانگرن و یا سیاه شدگی که هست باید تزریق وریدی آنتی بیوتیک و پانسمان لازم با مواد مخصوص انجام بشه...

اعلام میکنیم برای؛ بهبود خونرسانی مویرگهای محیطی در ناحیه زخم و اطراف آن....

برداشته شدن و از بین رفتن میکروارگانیسم های ایجاد کننده عفونت های ناحیه درگیر....

برداشته شدن و حذف ناحیه نکروتیک توسط فاکتورهای دفاعی ترشحی بدن...

بهبود و افزایش ترمیم زخم با سلول سازی از ناحیه ژرمینال پوست

دیابت کودکان

در 96/6 درصد از کودکان مبتلا به دیابت، دیابت نوع یک است و وابسته به انسولین می باشند

می توانیم علاوه بر مواردی که برای دیابت اعلام می کردیم

افزایش تولید انسولین بصورت تخصصی توسط سلول های لانگرهانس در لوزالمعده یا پانکراس

(توصیه پزشکی: داروی انسولین را نمیتوان یکباره قطع نمود زیرا ممکن است فرد به کما برود و منجر به فوت شود لذا؛ همزمان باید کودک را تحت نظر داشته باشیم و با تایید پزشک دوز داروها را بر طبق شرایط جدید کاهش دهیم تا عواملی مانند سرگیجه، افت فشار خون و زمین خوردنهای مکرر رخ ندهد زیرا با اعلام افزایش تولید انسولین در ذهن اشتراکی ممکن است نیاز به انسولین خارجی کاهش یابد)

دیابت حاملگی

دیابت حاملگی مشابه دیابت معمولی اعلام میکنیم

فشارخون بالا

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم چربی های بدن

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

برگشت خاصیت ارتجاعی رگ ها به حالت اولیه

اصلاح عملکرد سیستم خونرسانی در قلب، کلیه ها و کبد

انواع مشکلات و بیماریهای چشمی

تخریب مویرگهای شبکیه به دنبال دیابت

(تجمع چربی ته هر دو چشم - تخریب مویرگهای شبکیه)

در دیابت درمان نشده ی طولانی مدت به علت آسیب هایی که در عروق خونی شبکیه ایجاد میشود می تواند منجر به اختلال در دید و حتی نابینایی شود. این حالت معمولا بدنبال رتینوپاتی دیابتی و تخریب مویرگهای شبکیه بدنبال قند خون بالا و طولانی مدت ایجاد می شود.

به این شکل اعلام کنیم برای؛

کنترل نیوواسکولاریزاسیون یا تشکیل عروق شریانی جدید در شبکیه

جذب مایع اگزوداتیو از محیط اکستراسلولار سلولهای شبکیه

بهبود و ترمیم لایه اندوتلیال عروق ناحیه جهت جلوگیری از پارگی و خونریزی عروق

چشم آستیگمات

اعلام میکنیم برای؛ صاف شدن سلولهای سطح قرنیه برای داشتن بهترین عملکرد قرنیه (در آستیگماتیسم سطح قرنیه ناهموار می شود)

خشکی چشم

کاهش تولید اسیداوریک در بدن - افزایش دفع ادراری اسید اوریک

رژیم غذایی (عدم مصرف الکل - عدم مصرف ماهی کولی - عدم مصرف جگر دل قلوه و اسفناج)

ناخنک چشم

ناخنک رشد بافت همبند همراه با بافت عروقی است که قرنیه را مورد تهاجم قرار میدهد علت دقیق آن مشخص نیست ولی در معرض قرار گرفتن در نور آفتاب طولانی مدت، خشکی و گرد و غبار نقش مهمی در ایجاد آن دارد. تا وقتی که ناخنک کوچیکه کاریش ندارن ولی اگه بزرگ بشه جراحیش میکنن اما در کل عود ناخنک زیاده

ذهن اشتراکی واسه ناخنک عبارتست از توقف رشد بافت ناخنک و کاهش تاثیر پذیری چشم در برابر عوامل ایجادکننده ناخنک

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

آبریزش چشم

(چشمام سه سالی هست که در معرض باد یا حتی نسیم که باشه آبریزش پیدا میکنن و گاهی همراه با سوزش ذهن اشتراکی برای کدوم قسمت چشم باید اعلام کنم در ضمن صبحها با خارش چشم بیدار میشم)

برای آبریزش چشم در اثر باد و ... کاهش حساسیت سلولهای چشمی به واکنش هیستامینی و آلرژی

از طرفی، اگر از لوازم آرایشی جدید استفاده میکنه فعلا قطعش کنه

التهاب چشم

(خانم 46 ساله ای حدود 15 سال است که هر دو چشمش التهاب و آب مروارید دارد، تقریبا هفت سال پیش چشم راستش را عمل آب مروارید کرد که با مشکلات زیادی بخاطر التهابی که داشت مواجه شد بهمین خاطر چشم چپش را پزشک عمل نکرده و گفت تا التهاب برطرف نشود نمیتوان عمل کرد در تمام این مدت از کرتون استفاده میکند ولی دیدش خیلی ضعیف هست و هیچ بهبودی حاصل نشده، از طرف دیگر مدتی بود با عفونت دندان مواجه بود که بعد از درمانهای لازم پزشک متوجه شد که لثه هایش نیز تورم دارد و نمیتواند دندانهایش را بکشد)

اعلام میکینم برای؛ کاهش برخورد سیستم دفاعی بدن با بافت چشم + کاهش اثر کورتون روی بافت چشم

روماتیسم چشم

مطابق روماتیسم اعلام می شود و تفاوتی ندارد

توده چربی روی پلک

(مدت دو سال است که روی پلک هر دو چشمم توده چربی به وجود آمده و پزشک تشخیص جراحی دادن ولی متاسفانه من نمیتونم عمل جراحی انجام بدم چون زخمهایم خوب نمی شوند و دیابت هم ندارم)

معادل توده های خوش خیم اعلام می کنیم برای؛ محدود شدن تغذیه و خونرسانی به توده جهت تخریب توده

خونریزی و عفونت چشم سگ

(این سگ چهارساله می باشد و در قفس سگهای بزرگ نگهداری شده و مورد حمله آنها قرار داشته و چشمهایش دچار آسیب شده در معاینه پزشکی چشم راست فاقد دید و چپ سی درصد و دچار عفونت است. غده ای باندازه فندق پشت گردن و مشگل در گلو و دچار سرفه است)

سلام دوستان، وقتی سگها با هم دعواشون میشه، خب ضربات زیادی به بدن هم میزنن. انسانها هم همینطور هستن ، وقتی ضربه محکمی به چشم میخوره و چشم دچار هایفما یا دچار خونریزی داخل چشم میشن، اینا ممکنه ک این خونریزی بیاد و جلوی اون در واقع اون نوری ک میخواد از محیط بداخل شبکیه برسه و یه تصویری رو برای اون فرد یا اون موجود ایجاد کنه اون دچار مشکل این راه، مثل کسیکه دیابت داره و دچار خونریزی داخل چشم میشه یا کسیکه چشمش ضربه میخوره. اگر این سگ بیشتر استراحت کنه و بتونن اعلام کنن ک اون ضربه های که باعث خونریزی داخلی شده این خونریزی ها جذب بشه انشاالله اثر میکنه و جای نگرانی نیست. ما میتونیم حالا فعلا تا یکمی سگ بهبود پیدا کنه بیائیم اعلام کنیم برای؛

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

تخلیه ی خونهایی که در اثر ضربه های احتمالی به چشم سگ توسط دیگر همنوعانش وارد شده

جذب خونریزی داخل چشم و پاک شدن مسیر ورود نور بداخل چشم و شبکیه و انتقال به مسیر عصب بینایی

افزایش عملکرد سیستم دفاعی بدن برای عفونت چشم سگ

ترمیم اتصال شبکیه و بهبود خونرسانی عروقی شبکیه

ضعف شدید بینایی

(ضعف شدید بینایی بدلیل رسوب کلسیم در رگهای مربوط به چشم و مغز)

اعلام میکنیم برای؛ برقراری بالانس کلسیم در پلاسمای خون، شامل:

مهار برداشت کلسیم از سلولهای بافت استخوانی و کاهش جذب کلسیم روده ای

مهار سیستم سیگنالینگ سلولی مرتبط با رسوب یونهای کلسیم در عضلات و اندامها و استخوانها

انحراف چشم

ترمیم اندازه و قدرت کشندگی عضلات راست داخلی و خارجی، مایل تحتانی و فوقانی چشم ها

تنظیم عملکرد ناحیه فرونتوتمپورال در جهت تنظیم حرکات ساکادی چشم

پتوز یا افتادگی پلک

اعلام میکنیم برای؛ افرایش قدرت انقباضی و تکامل عضله لواتور یا عضله بالابرنده پلک

عیوب انکساری چشم

برای اصلاح عیوب انکساری چشم به هر مدل به این شکل اعلام میکنیم؛

اصلاح قطر قدامی خلفی کره چشم و اصلاح انحنای قرنیه در جهت قرار گیری تصویر بر روی

تنبلی چشم

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ارتباط بین مرکز بینایی مغز و چشم برای حذف برتری طلبی مغز در دریافت اطلاعات از چشم ها

و حذف عامل های مستعد کننده برای این دریافت یکطرفه شامل دوربینی. نزدیک بینی.آستیگماتیسم و استرابیسم

کتابخانه عرفان حلقه Telegram.me/EHbooks

گشادی مردمک

اعلام میکنیم برای، اصلاح انقباض و انبساط عضلات عنبیه و همچنین بهبود عصب محرکه مشترک چشم

تیرگی دور چشم

تیرگی دور چشم علل متعددی دارد که یکی از مهم ترین علت های ارثی بودن می باشد. عواملی مانند سیگار، نوع تغذیه، سن و مشکلات رنگدانه ای پوست و استرس های محیطی و... نیز دخیل اند که با توجه به علت، ذهن اشتراکی اعلام میشود

تجمع اشک در چشم

(چشم کودکی که از لحاظ پزشکی معاینه شده و کاملا سالمه ولی در یکی از چشم ها اشک جمع میشه)

اعلام میکنیم برای؛ حذف عامل عفونی و رفع التهاب و گرفتگی مجرای اشکی

نابینایی

(نابینایی خانم در اثر تصادف و آسیب شبکیه چشم، و نابینایی آقا به صورت ارثی و مادرزادی بوده و خواهر برادرشون هم این مشکل و دارند)

اگر بخواهیم دید مناسب داشته باشیم باید تمام موارد راه بینایی ما سالم باشند، از قرنیه و عنبیه چشم گرفته تا خود کرهء چشم، مایع زلالیه، زجاجیه، عدسی، بعد تازه این ها وقتی نور واردش می شود، در انتهای کرهء چشم وقتی میخواهد وارد مغز شود جایی داریم به نام ماکولا و جایی هست به نام لکهء زرد و شبکیه...

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد تمام مقاطع سلولی و بافتی چشم از قرنیه در ابتدای چشم تا کره ی چشم و عصب اپتیک در انتهای چشم

قرار گرفتن تصویر روی شبکیه و سپس انتقال تصویر به سلولهای عصبی و از آنجا به مغز و بازیابی آن توسط مغز

حذف تمام موانع از مسیر بینایی جهت داشتن یک دید سالم

مگس پرانی در چشم

(علت های مگس پرانی در چشم بدون اینکه ضعیف باشد یا ضربه خورده باشد و البته دارای بیماری نوروفیبروماتوز هستند و فیبروم رو اعصاب چشم در ام آر ای دیده شده!!!! راه درمان چیست؟)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سیستم عصبی و انتقال پیامهای عصب بینایی به مغز

رفع موانع احتمالی در زلالیه، زجاجیه

پیرچشمی

اعلام میکنیم برای؛ افزایش عملکرد عدسی چشم

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

افزایش قدرت ضریب شکست نور در محیط های شفاف چشم مثل قرنیه و زلالیه در حد نیاز بدن

تاری چشم

تاری دید علل مختلفی می تواند داشته باشد ....

اعلام میکنیم برای؛ صاف و هموار شدن سطح قرنیه

افزایش شفافیت در زلالیه، زجاجیه و قرنیه

جذب خونریزی، یا رفع هر نوع مشکل احتمالی در زجاجیه

ترشحات چشم

ترشحات چشم علل مختلفی دارد مثل؛ عفونت، ترشح بیش از حد، گرفتگی کانال درون بینی متعلق به تخلیه ترشحات چشمی ...

اعلام میکنیم برای؛ باز شدن کانال درون بینی متعلق به تخلیه ترشحات چشمی و بهبود فرایند تخلیه ترشحات

دوم اینکه ممکن است ترشحاتی که وجود دارد عفونی شده باشد، پس برای عفونت چشم هم اعلام می کنیم.

میگرن چشمی

برای میگرن چشمی مشابه میگرن معمولی اعلام می شود

آب مروارید (کاتاراکت)

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم میزان آب و پروتیین ساختمان عدسی چشم و تبدیل پروتیین های غیر محلول عدسی چشم به پروتیین های محلول در آب و حذف عامل اکسیداسیون سلولی در این ناحیه

بازسازی سلولهای قرنیه که شکست نورش به حالت عادی بازگردد

تقویت عدسی چشم

آب سیاه (گلوکوم)

اعلام میکنیم برای؛ کاهش فشار داخل زجاجیه چشم و باز شدن و یا رفع تنگی مجاری تخلیه کننده زجاجیه

و همچنین شروع روند ترمیم و بازسازی سلولهای عصبی شبکیه (مخروطی و استوانه ای) و نورونهای عصب اُپتیک

اعلام میکنیم برای؛ مهار تولید مایع زلالیه + تسهیل خروج مایع زلالیه + کاهش حجم زجاحبه

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

قوز قرنیه (کراتوکونوس)

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم و بازسازی سلولهای قرنیه (بافت پوششی، استرومای قرنیه و بافت آندوتلیوم)

اعلام میکنیم برای؛ برگشت سلولهای قرنیه به حالت صاف و طبیعی

از بین رفتن هر اختلالی که احتمال روند داشتن یک قرنیه ی سالم را کاهش می دهد

تیک چشم

تیک چشمی علتهای مختلفی مانند استرس، خستگی، اختلالات برخی یونها و درگیری و فشار عصب فاشیال رو داشته باشد...

اعلام میکنیم برای؛ کاهش فشار و تحریک عصب صورتی در جهت کاهش ایمپالس های عصبی

تنظیم ترشح و تولید واسطه های عصبی شامل هیستامین و سرتونین در جهت کنترل اسپاسم و تحریک عضلات ناحیه درگیر

نارسایی عصب بینایی

(نابینایی در اثر نقص و نارسایی عصب بینایی، در ضمن؛ ساختمان چشم سالم است)

ترمیم سلولهای عصبی ناحیه حسی بینایی در ناحیه اکسی پوت به خصوص قسمتهای v1 و v2 در ایجاد تفسیر بینایی

بهبود عملکرد ارتباط بین نواحی بینایی در لوب پس سری و ناحیه ارتباط بینایی در لوب تمپورال و لوب پری فرونتال در دریافت و تفسیر کلیه محرکهای بینایی

پف زیر چشم

پف زیر چشم علتهای خیلی زیادی داره. تنظیم نبودن سیکل خواب و بیداری، اختلالات هورمونی، اختلالات تیروییید، نارسایی های کلیوی و به دنبالش اختلالات آب و الکترولیت ناشی از اون، بعضی مواقع مشکل آناتومی مثل فتق چربی داریم که معمولا تو سن بالاتر اتفاق می افته.

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ترشحات تیروییدی..

تنظیم ترشحات نوروترانس میتری دخیل در خواب و بیداری مثل نورآدنالین و هیستامین و سرتونین...

تنظیم ترشحات هورمونهای غده آدرنال و برطرف شدن اختلالات آب و الکترولیتهای بدن..

برطرف شدن التهابات پلکی بلفاریت و التهاب ملتحمه مثل کونژکتیویت...

برداشت و جذب بافت چربی اضافه فتق شده در زیر پلکها....

عفونت ویروسی چشم

(برای عفونت ویروسی چشم که به قرنیه زده باشه)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

برای کونژکتیویت یا ورم ملتحمه که می تواند توام با درگیری قرنیه در موارد پیشرفته باشد اعلام می کنیم برای؛ حذف و تخریب عامل ویروسی و فعال شدن پروسه ترشح فاکتورهای ضدالتهابی برای کاهش درد و خارش ملتحمه و ترمیم سلولهای تخریب شده لایه سطحی قرنیه

نابینایی از نوع ارپی

اعلام میکنیم برای؛ بازسازی سلولهای استوانه ای، مخروطی و سلولهای بینابینی شبکیه

و همچنین اصلاح ساختار ژن مرتبط با بیمار

نابینایی در اثر مصرف الکل

اعلام می کنیم برای؛ بهبود خونرسانی مویرگی ناحیه زیر شبکیه و حذف ادم و بازسازی سلولهای بینایی شبکیه

خشکیدن عصب چشم

(خشک شدن عصب چشم و از بین رفتن نیمی از بینایی بعد از تصادف و اصابت ضربه به سر)

اعلام میکنیم برای نوروژنز و ترمیم نورنهای تخریب شده مرکز بینایی در لوب اکسی پوت و ترمیم عصب بینایی

پارگی شبکیه بر اثر ضربه

اعلام میکنیم برای؛ بهبود خونرسانی مویرگی ناحیه زیر شبکیه و ترمیم لایه عصبی سلولهای شبکیه و حذف مایع تجمعی زیر شبکیه بدنبال آسیب

آب آوردن شبکیه چشم

کاهش نفوذ پذیری عروق مشمیه و جذب مایع اگزوداتیو در بین لایه شبکیه و افزایش و ایجاد چسپندگی بین دو لایه شبکیه

خشکیدن شبکیه چشم

(خشک شدن شبکیه چشم که باعث ضعف بینایی شده است)

اعلام می کنیم برای؛ بهبود خونرسانی مویرگی ناحیه زیر شبکیه و حذف ادم و بازسازی سلولهای بینایی شبکیه

خشکی چشم

در مورد خشکی چشم، دو حالت ذهن اشتراکی اعلام می کنیم

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

خلاصه بگویم که در سیستم اشکی ما شامل غده های فرعی اشکی، غده های اصلی اشکی، کیسه اشک و مجراهای اشکی است.

معمولا غده های اشکی در پلک فوقانی، قسمت بالا، خارج و داخل قرار دارند.

ما برای ذهن اشتراکی، بهبود عملکرد نرمال غده های اشکی و بهبود عملکرد اعصابی که به این غده ها عصب رسانی می کنند را درخواست می کنیم تا یک عملکرد مناسب داشته باشیم.

حالت شماره دو، بیماری ها یا چیزهایی که باعث خشکی چشم می شوند را، برای آن موارد ذهن اشتراکی اعلام می کنیم که اگر هست، از بین برود که ترشحات چشمی به حالت اولیه برگردد.

دور بینی

اعلام میکنیم برای؛ افزایش تحدب قرنیه چشم در جهت تشکیل صحیح تصاویر روی نقطه کانونی عدسی

و همچنین اصلاح قدرت تطابق عدسی چشمی در جهت افزایش دامنه تطابق

نزدیک بینی چشم

اعلام میکنیم برای؛ کاهش اندک میزان قدرت عدسی چشم برای به حالت نرمال برگشتن

پیوند قرنیه

(ایشون دیدشون درسته یعنی نور رو می بینند، اما کامل نیست، در این صورت هم همین پروسه باید باشه؟ سپاس از پاسخ البته این مشکل بعد از عملِ گذاشتن لنز، سن بالا هستند ایجاد شده است)

سلام دوستان. معمولا سن مشکلی رو در پذیرفتن تحریک شعوری باعث نمیشه. پس امتحان کنید ما همه دانش آموزیم و نیازمند تجربه.

ماکولار دجنریشن

در ماکولار دجنریشن یا تحلیل رفتگی ناحیه ی ماکولای شبکیه، قسمت حساس شبکیه به دید تخریب شده و می تواند باعث از دست رفتن دید دقیق و گاهی کوری شود... برای این مورد که در اثر افزایش سن و کهولت دیده می شود به این شکل اعلام میکنیم....

افزایش روند ساخت عروق خونی جدید یا نیوواسکولاریزاسیون در بافت شبکیه...

بهبود ساخت نورونها در ناحیه ماکولا و کاهش ادم والتهاب بافتی در ناحیه

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ذهن اشتراکی برای p.v.d شدن زجاجیه چشم

اعلام می کنیم برای؛ بهبود خونرسانی مویرگی ناحیه زیر شبکیه و ترمیم لایه عصبی سلولهای شبکیه و حذف مایع تجمعی زیر شبکیه بدنبال آسیب

انواع مشکلات و بیماریهای گوش

بیماری وگنر

(بیماری وگنر که کاهش شنوایی در گوش میانی هست و شنیدن صداهای اضافی)

اعلام میکنیم برای؛ مهار فعالیت سیستم ایمنی، التهابی در جهت جلوگیری از تخریب دیواره عروق خونی

و همچنین افزایش ترشح کورتیکواستروییدها از غده فوق کلیه در جهت کاهش التهاب

عفونت قارچی گوش

اعلام میکنیم برای؛ تخریب دیواره قارچ های ساپروفیت در مجرای شنوایی گوش خارجی

افزایش آزادسازی فاکتورهای ضد التهابی برای کاهش درد و خارش و التهاب در ناحیه مجرای خارجی و پرده گوش

تنیتوس یا وزوز گوش

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سیستم های وستیبول گوش، مجاری حلزونی و سیستم عصبی گوش و رفع هرگونه فشار از روی آنها

بهبود عملکرد سلولهای بدن (بدلیل آسیب احتمالی ناشی از فلزات سنگین، داروها، تومورها، کاهش وزن در کوتاه مدت که باعث اشکال در شیپور اُستاش می شود و ... تا بحال برای وزوز گوش 122 علت شناسایی شده است)

سرگیجه و عدم تعادل

اعلام میکنیم برای؛ در مورد تعادل یکی مخچه در مغز، وستیبولار در گوش که شامل اوتریکول، وساکول، مجاری نیم دایره و حس عمقی عضلات گردن

گوش درد شدید نوزاد پنج ماهه

التهاب گوش میانی یا اوتیت مدیا یکی از بیماریهای شایع نوزادان است...

افزایش تشرح فاکتورهای ضد التهابی در جهت کاهش التهاب پرده تمپان و کاهش درد ناشی از التهاب

تخریب و از بین رفتن عامل استرپتوکوکی با هضم دیواره سلولی باکتری گرم مثبت

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

سندرم مینیر

سندرم مینیر شامل حملات سرگیجه تکرار شونده، وزوز گوش و افزایش فشار داخل گوش و کاهش شنوایی هست...

اعلام میکنیم برای مایع آندولنف که فشار و تولیدش تنظیم بشه

اعلام میکنم برای گیرنده های دهلیزی در ناحیه حلزون شنوایی که تحریک کاهش پیدا کنه و تعادل در دریافت ارتعاشات داشته باشند

پارگی پرده گوش

برای پارگی پرده گوش چون بافت از جنس همبند مشابه تاندون زانو هست ...

ایجاد داربست سلولی پایه و سپس ترمیم و القای رشد سلولهای همبند آسیب دیده ناحیه پرده تمپان...

ناشنوایی و کم شنوایی

اعلام میکنیم برای، اصلاح عملکرد گیرنده های شنوایی در اندام کورتی و انتقال ایمپالس های شنوایی از عصب زوج هشت

و برای بهبود درک وتفسیر اصوات در کورتکس شنوایی اولیه(منطقه 41 و 42 برودمن) و ارتباطات بین کورتکس و تالاموس

ناشنوایی بعد از سرماخوردگی، که هیچ دلیل قطعی براش تشخیص ندادن

اعلام میکنیم برای بازسازی و ترمیم پرده گوش. استخوانچه های گوش و بازسازی سلولهای عصبی مرتبط با عصب شنوایی و گیرنده های شنوایی در حلزون شنوایی

انواع مشکلات و بیماریهای قلبی

تپش قلب

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ایجاد پالس های الکتریکی در سیستم "اس ایی نوت" قلب(که در دهلیز است)

تنظیم ایجاد پالس های الکتریکی در سیستم "ای ویی نوت" قلب(که بین دهلیز و بطن است)

ضعف عضله قلب باز

اعلام میکنیم برای؛ ایجاد خونرسانی به عضله قلب و تقویت رشته های آکتین و میوزین

عدم تاثیر گشادشدگی روی عضله قلب (و جمع شدن قلب روی خود، طوریکه فشار تولید شده در بطن چپ 120 میلیمتر... و دیگر فشارهای حفرات قلب، همان فشارعادی دوازده، هشت یا ده باشد)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

گرفتگی رگ قلب

اعلام میکنیم برای؛ حل شدن تدریجی و بدون خطر رگ

کاهش کلسترول بدن (برای جلوگیری از رسوب در رگ و باز ماندن رگ LDL)

افزایش فعالیت سیستم ضد انعقاد خون

آریتمی قلبی

آریتمی قلبی به اختلال و بی نظمی در ریتم ضربانات قلب گفته میشود که میتواند ناشی از علل مختلفی باشد. میتواند به صورت افزایش تعداد ضربانات یا تاکی کاردی و یا کاهش تعداد پمپ های قلبی برادی کاردی باشد... در واقع مراکزی در قلب داریم بنام گره سینوسی و گره دهلیزی قلب که نواحی از قلب هستند که ریتم قلب از اون قسمت شروع شده و به تمام عضلات قلبی منتقل میشود. در آریتمی ها اختلال در عمکرد این گره های قلبی در شروع ریتم قلبی داریم که اگر شدید نباشد با داروهایی مثل ایندرال کنترل می شود و در موارد شدید نیاز به درمان جراحی دارد. اعمالی مثل ابلیشن. علت بروز آریتمی ها میتواند حملات قلبی قبلی که ضعف عضلات قلب را باعث میشود باشد و یا مواردی مانند فشار خون بالا، پر کاری تیرویید، استرس های روحی، حتی دیابت و سیگار، تعبیه پیس میکر برای کنترل آریتمی هستند.

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم عملکرد گره سینوسی در شروع اولیه ریتم قلب

تنظیم عملکرو گره دهلیزی در انتقال ریتم قلبی به عضلات بطن

بهبود و تقویت قدرت انقباضی عضلات قلب در پمپاژ خون و انتقال بهینه اکسیژن به عضلات قلب

اسپاسم عضلات ریه هم میتواند ناشی از آریتمی قلبی و اختلال در خونرسانی باشد که بهبود عملکرد قلب برطرف خواهد شد

گرفتگی عروق کرونر

مشابه انسداد عروق در قلب اعلام میشود

سوراخ بین دهلیزی

(بیمار 31 سال داره و دکترا متوجه شدن که بین دو دهلیز سوراخ و دهلیز راست بزرگ شده)

سلام دوستان. در مورد ASD یا سوراخ بین دهلیزی... بزرگی دهلیز راست از عوارض سوراخ بین دهلیزی هست

اعلام میکنیم برای؛ افزایش تولید و ساخت ساکومرها، فیلامانهای اکتین و میوزین در جهت بازسازی نقص دیواره بین دهلیزی

کاهش بار حجم خون پمپاژ شده به بطن راست و کاهش پرفشاری خونی و تنگی در عروق خونی ریه راست

سوراخ ثانویه بین دو دهلیز قلب در کودک

(پسر بچه یی سه ساله که به تازگی تشخیص داده اند سوراخ ثانویه بین دو دهلیز قلب به اندازه متوسط دارد. و قرار است در سال آینده با آمپلاتزر از راه رگ پا بسته شود)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

اعلام میکنیم برای؛ مهار ترشح پروستاگلاندین ها برای بسته شدن کانال

سوراخ بین دوبطن در جنین

(خانمی که 5 ماهه باردارند و جنین تشخیص داده شده سوراخی بین دو بطن وجود دارد، لطفا راهنمایی بفرمایید برای ذهن اشتراکی به مادر باید داده شود یا به جنین؟)

سوراخ بین دوبطن یا VSD درجات مختلفی دارد و در بیشتر موارد پس از تولد کم کم بسته میشود ولی برای جلوگیری از هرگونه خطر احتمالی بهتراست ذهن اشتراکی کار شود روی؛ بسته شدن سوراخ بین دوبطن در جنین

ضخیم شدن دیواره قلب و آئورت

اعلام میکنیم برای؛ شروع روند بازسازی و ترمیم سلولهای میوکاردیوسیت و تنظیم ریسک فاکتورهای مرتبط با بزرگی قلب شامل کاهش بار قلبی؛ کاهش فشار خون سیستولیک؛ کاهش مقاومت عروقی و ترمیم دیواره عروق و همچنین تنظیم ترشح سیستم رنین-آنژیوتانسین و سیستم سمپاتیک

نارسایی قلبی

(مادرم نارسایی قلبی دارند که منجر به بزرگ شدن بیش از حد سایز قلب و بزرگ شدن کبد، آب آوردن شکم و تنگی نفس و ورم پای راست ایشان شده است. دریچه ها مشکل دارند و دریچه سمت راست خیلی اسیب دیده و تقریبا کار نمیکند)

به موازات درمان دارویی، ما به صورت کمکی اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد عضله ی قلب و افزایش قدرت انقباضی آن

صدای اضافه در قلب

بصورت کلی اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد عضله ی قلب

بهبود عملکرد دریچه میترال + دریچه دو لتی و سه لتی + دریچه پورمودر که دریچه ریوی ست + دریچه آئورت

بسته شدن سوراخ های احتمالی در بطن ها

تنگی دریچه میترال

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم در قدرت تارهای کشنده دریچه دو قسمتی میترال (تا به اندازه کافی باز شده و خون را از دهلیز چپ به بطن چپ وارد کند)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

لقی دریچه میترال

اعلام میکنیم برای؛ برای ترمیم پرولاپس دریچه میترال، ترمیم سلولهای میوسیت قلبی،

افزایش قدرت انقباضی فیبرهای اکتین و میوزین در سلولهای میوسیت

بهبود قدرت انقباضی سلولهای عضلات نگهدارنده دریچه میترال

شل شدن سرخرگ آئورت قلب

به نظر می رسد منظور بیماری آنوریسم این سرخرگ باشد (لطفا مدارک این بیمار شامل آنژیوگرافی یا سی تی ارسال گردد)

برای ترمیم شلی دریچه های قلبی اعلام می کنیم برای ترمیم سلولهای میوسیت قلبی..

افزایش قدرت انقباضی فیبرهای اکتین و میوزین در سلولهای میوسیت...

بهبود قدرت انقباضی سلولهای عضلات نگهدارنده دریچه

افتادگی دریچه قلب

اعلام میکنیم برای؛ افزایش تقویت قدرت تارهای کشنده ی دریچه ها در قلب (چه دریچه دو لتی بین دهلیز و بطن چپ است و چه دریچه سه لتی بین دهلیز و بطن راست است و چه دریچه آئورت که داخل رگ آئورت است و چه دریچه پورمودر که داخل شریان ریوی ست)

انواع مشکلات دهان و دندان

عفونت دندان

اعلام میکنیم برای؛ رفع فشار از روی اعصاب دندان با تخلیه ی ترشحات عفونی ناشی از آبسه

درد دندان

اعلام میکنیم برای؛ کاهش فشار روی عصب دندان مورد نظر و دندان مجاور

از بین رفتن فعالیت عصب دندان عقل (البته اگر قراراست که دندان عقل را بکشید)

پوسیدگی و عصب کشی دندان

اعلام میکنیم برای؛ از بین رفتن عملکرد عصب دندان

ترمیم بافت های لثه از داخل و خارج، ریشه و میناهای دندان

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

تشکیل لایه دفاعی محافظ روی بخش پوسیدگی و ممانعت از عملکرد باکتری ها، رشد و تجمع آنها در ناحیه مربوطه

سیاهی دندان ناشی از قطره آهن

اعلام میکنیم برای؛ افزایش فعالیت سلولهای آمیلوبلاست در بازسازی و ترمیم سلولهای آسیب دیده ناحیه مینای دندان

جرم دندان

اعلام میکنیم برای؛ افزایش فعالیت سلولهای آمیلوبلاست در بازسازی و ترمیم سلولهای آسیب دیده ناحیه مینای دندان

برفک دهان نوزاد

(استوماتیت کاندیدیاز یا برفک دهان - نوزاد چهل روزه که دهانش پنیرک زده وسینه های مادرش زخم شده)

استوماتیت کاندیدیاز یا برفک دهان برجستگی های سفید رنگ روی زبان هست که در نوزدان به صورت شایع دیده می شود. نوزدان به هنگام عبور از کانال زایمانی و بعلت وجود عامل کاندیدیایی در آن دچار آلودگی می شوند. اعلام می کنیم برای:

افزایش سطح ایمنی در نوزاد و همچنین تخریب عامل مخمری کاندیدا آلبیکانس در مخاط دهان و بینی

همچنین افزایش و تولید فلور باکتریایی طبیعی بافت مخاط دهان

آسیب عصب کام کودک

(پسر بچه یی که در یکسالگی به علت شکاف کام جراحی نموده و عصب آسیب دیده است. لوزه اش کوتاهه، از نظر گفتاری نیز خیلی ضعیفه)

اعلام میکنیم برای؛ بازسازی نقص بافتی ناحیه کام نرم و استخوان کام سخت و ترمیم عصب واگ (شبکه حلقی)

عفونت لثه ها

اعلام میکنیم برای؛ بر طرف شدن عفونت مخفی زیر لثه ها

اصلاح الگوی جویدن و قرار گرفتن دندانها (اکلوزیون)

متعادل شدن رشد سلولهای لثه

(البته فرد باید از محرکهایی مثل دود سیگار و مشروب و ... پرهیز کند)

خونریزی لثه

(کسی که مشکل لثه داره و شدیدا دچار خونریزی میشه و با جراحی خوب نشه به کجا باید اعلام کرد؟)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

اعلام میکنیم برای؛ بر طرف شدن عفونت مخفی زیر لثه ها

بهبود عملکرد سیستم انعقادی بدن جهت مهار خونریزی ناحیه مربوطه

آفت دهان

افزایش و بهبود فعالیت اجزای سیستم ایمنی شامل لنفوسیت ها B و T ماکروفاژها...

افزایش و بهبود فعالیت سیستم ایمنی هومورال شامل آنتی بادی ها و پلاسموسیت های ترشح کننده پادتن

جای بخیه روی لب

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم سلولهای ناحیه و بعد هماهنگ شدن با سلولهای پوستی ناحیه مورد نظر

از دست دادن حس چشایی

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ساختار پاپیلاهای زبان و رسپتورهای موجود بر روی آن

اصلاح انتقال پیام های عصبی از اعصاب فاشیال، گلوسوفارنژیال و عصب واگ

بهبود دریافت و تفسیر اطلاعات چشایی در نورونهای مرکز چشایی در لوب آهیانه و لوب لیمبیک

برای التیام سریع جراحی فک بخاطر ایمپلنت و جلوگیری از عفونت و درد

اعلام میکنیم برای، ترشح فاکتورهای ضدالتهابی استروییدی و بلاک مسیر سیکلواکسیژناز

و ترشح فاکتورهای ضد درد انکفالین و اندورفین جهت کنترل درد

آسیب تارهای صوتی و حنجره

(آسیب تارهای صوتی و حنجره به دلیل بیماری بسیار شدید و عفونت در دوران نوجوانی)

اعلام میکنیم برای؛ فعال شدن پاسخ های بافتی موضعی شامل، افزایش فعالیت نوتروفیل ها، لنفوسیت ها و فیبروبلاست ها

بهبود متابولیسم سلولی در سلولهای آسیب دیده و شروع فرایند بازسازی و رژنراسیون سلولی در سلولهای تخریب شده

برای تارهای صوتی خانمی که صداش مثل مردا شده در اثر سیگار کشیدن

اعلام می کنیم برای ترمیم تغییرات ایجاد شده در ماهیچه های صاف تارهای صوتی و ترشح فاکتورهای ضدالتهابی برای کاهش التهاب بافت حنجره و تارها

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

شکاف زبان در اثر آلرژی غذایی

(شکاف زبان در اثر مصرف برخی مواد غذایی مثل؛ بادمجان، هلو، خریزه)

آلرژی نسبت به برخی مواد غذایی مثل بادمجان میتواند باعث تحریک و شکاف ناحیه زبان و همچنین درگیری های پوستی بشود....

اعلام میکنیم برای؛ کاهش فعالیت سیستم ایمنی شامل آزاد سازی پادتن ها

و کاهش تخریب ماست سل ها و در نتیجه کاهش آزاد سازی عاملهای آلرژن مانند هیستامین و اینترلوکین ها

کجی مادرزادی لب پایین سمت راست که به سمت پایین میکشه

سوال کلی است و علت باید مشخص شود. ممکن است علت تخریب اعصابی باشد که ناحیه مذکور را عصب دهی می کنند که برای این مورد اعلام میکنیم برای؛

بازسازی عصب تخریب شده و افزایش ترشح و تولید فاکتورهای رشد عصبی

انواع مشکلات حلق و بینی

کاهش یا عدم حس بویایی

*** (شخصی که حس بویایی اش دچار مشکل شده و بطور طبیعی بویی رو حس نمی کند و تقریبا کَربو هست)**

آنوسمی (هیچ بویی حس نمی شود) – کاکوسمی (تنها بخشی از بو دریافت می شود)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد صفحه ی غربالی (که در ریشه بینی قرار دارد و مرتبط با بخشی از مغز است که حس بویایی را شناسایی می کند و در نهایت منجر به حس بویایی می شود)

*** (خانمی که مدت سه ماه حس بویایی اش را از دست داده است)**

اعلام میکنیم برای؛ تقویت و ترمیم پیاز بویایی، عصب های بویایی، بافت پوششی بویایی، راه بویایی

خروپف

اعلام میکنم برای؛ محدود شدن یا برداشتن هر گونه مانع بر سر راه هوای ورودی به بدن، از راه بینی گرفته تا شُش ها

برطرف شدن موانعی مثل، وجود پولیپ در مسیر تنفسی، تنگی یا انحراف مجرا در بینی، بزرگ شدن زبان کوچک...

وجود مشکلاتی در گلو مثل شُلی عضلات ته حلق، وجود تومور در مجاری تنفسی

برای شل شدن عضلات ته حلق اعلام می کنیم: افزایش قدرت انقباضی عضلات ته حلق

برای بزرگ شدن زبان کوچک اعلام می کنیم: بهبود عملکرد و انقباض مختصر درعضلات نگهدارنده زبان کوچک

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

(هشدار پزشکی: اگر نفس فرد در مابین خروپف حدود ده ثانیه قطع می شود حتما به متخصص حلق و بینی مراجعه نماید)

بیماری بینی رینیت اتروفیک

اعلام میکنیم برای؛ رفع عامل باکتریایی و ویروسی دخیل در پیشرفت بیماری

ترمیم اپی تلیوم استوانه ای مژکدار مخاط بینی و غدد سروزی موسینی ناحیه مخاط و بهبود خونرسانی مویرگی ناحیه

انحراف سپتوم بینی

(به وجود آمدن انحراف در تیغه بینی بعد ازعمل جراحی شکستگی بینی)

برای انحراف سپتوم بینی اعلام میکنیم برای؛ هماهنگی فعالیت مراکز غضروف سازی و استخوان سازی دخیل در رشد تیغه بینی

شکستگی بینی

اعلام میکنیم برای؛ هماهنگی فعالیت مراکز غضروف سازی و استخوان سازی دخیل در رشد تیغه بینی برای اصلاح شکستگی

گرفتگی و پلیپ بینی

اعلام میکنیم برای؛ از بین بردن مخاط اضافی در بینی و سینوسها

کاهش التهاب، ممکن همراه عفونت باشه از بین بردن عفونتها

گرفتگی بینی و کر بویی

می تواند علل مختلفی داشته باشد. برای مثال سینوزیت های مزمن و درمان نشده که در این صورت برای بیماری مورد نظر اعلام می شود. علت بیشتر موارد التهاب در سلولهای مخاط بینی و تخریب سلولهای پیاز بویایی و حتی تخریب در عصب بویایی باشد.

اعلام می کنیم برای؛ فعالیت پروسه ضد التهابی برای برطرف شدن تورم و التهاب سلولهای مخاط بینی و ترمیم سلولهای عصبی بویایی در ناحیه پیاز بویایی و عصب بویایی و بازسازی سلولهای گیرنده بو در مخاط

ترشحات پشت حلق (به صورت خلط در گلو یا پر شدن بینی)

مشکل ترشحات پشت حلق چندین دلیل دارد؛ هم می تواند ترشحاتی باشد که از سر و سینوس ها تخلیه می شود و پائین می رود هم اینکه ترشحاتی باشد که از ریه ها، کلینرها دارند آنجا را تمیز می کنند، به سمت بالا می آید و تخلیه می شود. پس می تواند از عفونت سینوسها یا عفونت ریه باشد. برای این موارد ذهن اشتراکی درمان عفونت سینوس و ریه را اعلام می کنیم و نیز اینکه تخلیه ترشحات به خوبی انجام شود.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

اگر معمولا از بالا باشد طوری که پشت حلق جمع می شود و یا بخواهد داخل دهان بیاید اینها مال عفونت هایی است که در قسمت سینوسها است، سینوس هایی که در سر و صورت هستند اینها ممکن است ترشحات شان به صورت ترشحات دائم باشد. همانطور که گفتم یک سری ممکن است به دلیل عفونت ریه باشد؛ البته! اگر شخصی باشد که سیگار می کشد، به دلیل این که مژک های تنفسی (به صورت قطعه ای) فلج می شوند، اینها ممکن است خلط صبحگاهی داشته باشند طوری که باید چند بار سینه صاف کند و خلط بزرگ بیرون بدهد، پس به خاطر اینکه ممکن است سیگاری هم باشد علاوه بر ذهن اشتراکی که اعلام کردید باید برای مژک های تنفسی هم که در لوله های تنفسی فلج شده اند اعلام کنیم مژک ها هم کارکرد اولیه شان را به دست بیاورند و بهبود پیدا کنند

اعلام میکنم برای؛ درمان عفونت سینوس ها و عفونت ریه ها

تخلیه کامل ترشحات پشت حلق

بهبود کارکرد مژک های تنفسی در لوله های تنفسی (در افراد سیگاری مژک های تنفسی فلج می شوند)

زخم حفره بینی

(روی تیغه بینی م از داخل حفره یه زخم عمیق شده که بعد از عمل سزارین اومده چند روز خوبه چند روز بعد دوباره زخم میشه الان تو دو تا حفره بینی م زخم شده و دردناک هست برای ذهن اشتراکی روی چی باید کار کنم)

کلا در مورد زخم در حفره های بدن؛ مثل بینی، گوش، باید خیلی مراقب بود! حتی موردی را سراغ دارم در مورد زخم داخل بینی، که وضعیت وخیمی پیدا کرده. یک نوع باکتری به نام استافیلوکوک در این محل رشد می کند و کنولیزه می شود. به این خانم باید بگویم به هیچ وجه بینی اش را دستکاری نکند، موهای بینی اش را نکند و اگر الان عفونتی وجود دارد؛ این معمولا زخم استافیلوکوکی هست و می تواند پماد تتراسایکلین استفاده کند.

در مورد اعلام ذهن اشتراکی اعلام میکنیم برای؛ کاهش عفونت و از بین رفتن عفونت استافیلوکوکی

مشکلات دسته روانشناسی و روانپزشکی

اسکیزوفرنیا

(بیمار یک مرد مجرد و ۵۸ ساله است و سالهاست که خودارضایی نیز دارد)

اسکیزوفرنی یا شیزوفرنی یا روان گسیختگی یک بیماری روانی حاد است که باعث تغییر در ادراک، افکار و رفتار بیمار می شود. در مورد اسکیزوفرنی، علامت ها مختلف است، جنسیت در روند بیماری خیلی تفاوت ایجاد می کند.

اعلام می کنیم برای؛ کاهش فعالیت دوپامین و سروتونین مخصوصا کاهش فعالیت دوپامین در سیستم لیمبیک مغز

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

این ها یک مقداری علامت ها را کنترل می کند و آن رفتارهای خطرناک ازشان سر نمی زند.

وسواس

در مورد ترشح سروتونین در مغز، سروتونین نوعی هورمون هست که توسط سلولهای عصبی در مغز و در سلولهای عصبی دستگاه گوارشی تولید می شود که معمولا پیش ساز آن، تریپتوفان هست که یک اسید آمینه است.

افزایش میزان تولید سروتونین از طریق افزایش تبدیل تریپتوفان به سروتونین توسط سلولهای عصبی دستگاه گوارش و سیستم عصبی مرکزی که همان مغز است (که با افزایش ویتامین B6 انجام میشد)

اعلام مثبت یک کمال برای تغییرات بینشی فرد

توصیه های مکمل در زمینه رفتار درمانی: تغییر محیط کار یا زندگی جهت ایجاد تنوع در اوضاع موجود +سرگرمی + در جمع بودن

مصرف مواد غذایی که می تواند باعث افزایش سروتونین شود مثل؛ بوقلمون، ماهی هایی چون ساردین، سالمون.

سادومازوخیسم

اعلام می کنیم برای؛ اصلاح فعالیت مراکز دخیل در شناسایی و درک تجربیات شامل کورتکس مغز بخصوص ناحیه پری فرونتال(مرکز شخصیت) و ناحیه لیمبیک و تنظیم ترشحات نوروترانس میتری این نواحی

پارانویید

در مورد پارانوئید می توانیم چند تا مورد را اعلام کنیم. پارانوئید هم می تواند به تنهایی باشد هم همراه با بیماریهایی چون اسکیزوفرنی یا بیماری های سایکوتیک دیگر باشد. برای خود پارانوئید به تنهایی، می توانیم اعلام کنیم برای چند هورمون، بهبود عملکرد و تنظیم متعادل، هورمونهایی چون دوپامین، نوراپی نفرین، آمینو بنزوئیک اسید گاما، سروتونین و گلوتامات. وقتی این ها بر اساس افراد مختلف و ساعات مختلف و نوع کار و استرس های مختلف به اندازه ای ترشح بشوند که نیاز فرد هست، معمولا کمک کننده است.

وقتی ما تنظیم ترشحات این هورمون ها را درخواست می کنیم، در کنارش هم یک، مثبت یک کمال، اعلام کنیم که این ها هر دو با هم کمک کننده است از این جهت که هم دید فرد عوض می شود و هم اینکه هورمون هاش به میزان معمول در کنار هم (اگر فقط پارانوئید تنها داشته باشد) به مرور و روز به روز این پارانوئید کمتر شود.

بیماری دو قطبی

(پسرم با تشخیص پزشک دارای بیماری دوقطبی است و داروی لیتیوم و ریسپریدون مصرف می کند)

سلام دوستان. اختلال بای پلار یا دوقطبی یکی از اختلالات شایع روانپزشکیه که شخص دو تا خلق بالا و پایین را داره. گاهی وقتها خلق افسرده و گاهی وقتها خلق بالا یا مانیک داره، داروی لیتیوم برای تنظیم خلق استفاده میشه و داروی ریسپریدون داروی ضد سایکوزه...

میتونیم به این شکل اعلام کنیم....

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

کنترل خلق پایین یا افسرده با افزایش ترشح سرتونین از هسته های رافه یا سجافی...

کنترل خلق بالا و دورهای مانیا با کنترل تو تنظیم ترشح دوپامین از جسم سیاه ..

کنترل توهمات بینایی و شنوایی ناشی از ترشح و فعالیت بیش از حد دوپامین ...

بهبود و تنظیم مدارهای ترشحات نوروترانسمیتری داخل مغزی و تنظیم فعالیتهای نورونی شان...

فوبیا اجتماعی

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ترشحات نوروترانس میترهای سرتونین، نوراپی نفرین و دوپامین

اصلاح ارتباطات نواحی مختلف کورتکس مغزی از جمله قشر پریفرونتال با نواحی لیمبیک و آمیگدال

ترس

(برای ترس مثلا ترس از عمق یا ارتفاع، بجز دفاعی میشه ذهن اشتراکی هم اعلام کرد؟)

بله، در مغز مراکز ترس داریم. ناحیه پیش پیشانی و قسمتی از هیپوکمپ و یه ناحیه خاص از مغز به نام آمیگدال یا هسته بادامی اینها مراکز مرتبط با ترس هستند. مرکز پریفرونتال یا پیش پیشانی در مواجهه با ترس اون عامل ترس رو شناسایی میکنه و به دو مرکز دیگه شامل هیپوکمپ و آمیگدالا دستور تحریک شدن و واکنش در مقابل ترس رو میده...

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم فعالیت این سه مرکز (مرکز پریفرونتال، مرکز هیپوکمپ، و مرکز آمیگدالا) در شناخت ترس های بی علت و واکنش در مقابل اون و تنظیم ترشح سیستم اماده کننده بدن در مقابل ترس (ترشح آدرنالین از مغز)

اختلال شخصیت مرزی

برای شخصیت مرزی یا بوردرلاین اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن

اصلاح اختلال عملکرد سلولهای قسمتهای هیپوکامپ آمیگدال و کورتکس پره فرونتال

اصلاح عملکرد مخور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال و اصلاح ترشح کورتیزول

اصلاح سطح استروژن خون

* در ضمن، این بیماران نیاز به تشعشع دفاعی هم دارن

بیش فعالی

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم تکامل سیستم عصبی مرکزی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

تنظیم سلول های مغزی به بهترین نحو ممکن

تنظیم سیستم های دوپامین و نورآد انرژیک در مغز

ناخن جویدن

میشه روی کاهش اضطراب فرد کار کرد. آدرنالین و هسته لوکوس سرلیوس مغز درگیره یا سیستم اتونوم و ترشح آدرنالین و سرتونین و گابا درگیره... اینا واسطه های ترشحی مغزی هستن که توی اضطراب و افسردگی ترشح میشن از نواحی خاصی از مغز ... باید تنظیم ترشح بشن

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم سیستم اتونوم، ترشح آدرنالین و سرتونین، گابا و هسته لوکوس سرلیوس در مغز

شب ادراری کودکان

شب ادراری علل فراوانی دارد اما در دو دسته کلی طبقه بندی می شود: دلایل عضوی یا غیر عضوی. دلایل عضوی شامل مشکلات احتمالی است که از کلیه تا مجرای خروجی ادرار وجود دارد. دلایل غیر عضوی که بیشتر در کودکان زیر شش سال وجود دارد شامل ترسهایی در ناخوداگاهی کودک است که به علل مختلف ایجاد شده است مثل، آسیب در مهد کودک، ترس از والدین، ترس های درونی مثل موجودات خیالی، اتاق و .... این ترس ها عاملی برای عدم کنترل ادرار در کودکان محسوب می شود.

اعلام میکنیم برای؛ افزایش میزان سروتونین برای بهبود عملکرد سیستم کنترل ادرار

توصیه هایی به والدین عزیز در زمینه رفتار درمانی؛

کشیدن نقاشی توسط کودک برای پی بردن به عمق تفکر کودک و ریشه یابی ترس های او

شب ادراری را به روی کودک نیاورید و به او استرس وارد نکنید

بخاطر کارهای کوچک او را سرزنش و دعوا نکنید و در کل سعی کنید اعتماد بنفس کودک را بالا ببرید

توصیه های دارویی: کپسول یا شربت فلوکسیزین هر 12 ساعت یک قاشق مرباخوری

اختلال یادگیری

اعلام میکنیم برای؛ بهبود فعالیت نورونهای ناحیه هیپوکمپ و ارتباطات مدارهای عصبی ناحیه کورتکس با هیپوکمپ و پریفرونتال برای بهبود توجه و تمرکز

اوتیسم

اعلام میکنیم برای؛ افزایش میزان تولید سروتونین در مغز (برای ایجاد برقراری ارتباط منطقی و احساسی در مغز و بروز آن)

بهبود عملکرد هورمونها و سلولهای مغزی برای برقراری بهترین ارتباط منطقی بین فرد و محیط

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

معمولا با کمک اطرافیان، با کاهش استرس مقدار زیادی از این مشکلات حل می شود. (البته به یاد داشته باشید که اوتیسم به معنای این نیست که فرد حافظه خوبی نداشته باشد یا قدرت تمرکزش خراب باشد، ، ما یک آقایی داریم به نام سلطان حافظه که ایشان خودش مبتلا به اوتیسم است و در هفت، هشت ثانیه دو صفحهء کتاب را که نگاه می کند می تواند حدود 98٪ آن را برای یک عمر به خاطر بسپارد . در افراد اوتیسمی فقط ارتباط بین اموشنال مغز و سلول های مغزی برای شان یک مقداری تعریف نشده است)

*(دختری 15 ساله، بینهایت باهوش، مدتی نسبت به خانواده و اطرافیان و درس بی علاقه شد، پس از بررسی دکتر روانشناس، مشخصات بیماری را هدایت الهی سلامت روحی عنوان کرده، لطفا" از دکتر بخواهید که چگونه برایش ذهن اشتراکی اعلام کنم)

در مورد اون دختر خانوم باید اول پیش روانپزشک برن ببینه شاید دچار بیماری اوتیسم یا..... شده و بعد برای اون اعلام کنید. دقت کنید روانپزشک گفتم دوباره نبره پیش روانشناس.

احساس حقارت و درجاتی از اسکیزوفرن به علت آزار جنسی در کودکی

(فردی که در کودکی مورد آزار جنسی قرار گرفته و مبتلا به احساس حقارت، انزواطلبی و درجاتی از اسکیزوفرن و خودارضایی شده)

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ترشحات ترانس میتری مغز(دوپامین. سرتونین.آدرنالین) و بهبود فعالیت مدارهای عصبی ناحیه کورتکس به خصوص مرکز شخصیت و فعالیتهای اجتماعی(پریفرونتال) با مراکز تولید کننده این واسطه ها ی عصبی

تیک عصبی

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ترشح نوروترانس میترهای سرتونین و دوپامین در جهت کنترل اختلالات خلقی

اصلاح ژن معیوب مستعد کننده مرتبط با بیماری ژیلاتوره

انواع کیست ها، توده ها، تومورها

سرطان

(آیا برای سرطان در قسمتهای مختلف بدن درمان یکیه مثل روده، معده، ریه، تخمدان یا هرکدام از مواردی که اعلام میشه با هم فرق دارند یا همون درمان متاستاز باید اعلام بشه؟)

برای سرطان ها معمولا مثل هم عمل میشه

سرطان فیبو سارکوما (منی جمع شده و بیضه ها بزرگتر از حد معمول)

اعلام می کنیم مشابه سایر بدخیمی ها برای فعال شدن مرگ سلولی در سلولهای بدخیم فیبروبلاستی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

سرطان مغز و استخوان

مطابق تومور ها اعلام میکنیم + اعلام میکنیم برای؛ تشکیل بافت سالم استخوان و استحکام لازم در آنها

سرطان پستان

(سرطان سینه که دو سال پیش متاستاز داده و جراحی شده الان دوباره در همون نواحی رشد کرده و این بار به سلولهای مغز هم رسیده و نوع آن هنوز مشخص نشده است)

سلام دوستان. بیشترین متاستازهای سرطان پستان روی ناحیه ریه و استخوانهای ستون فقرات هست. به صورت نادر میتونیم متاستاز مغزی هم داشته باشیم که البته به خاطر وجود سد خونی مغزی معمولا متاستاز مغزی نادره... این بیماران قطعا یه رادیوتراپی ناحیه مغز داشته باشند. به صورت کمکی میتونیم اعلام کنیم...

محدود کردن حاشیه تومور و سلولهای باقی مانده کانسری پستان...

محدود کردن و بلاک کردن رشد متاستازهای سلولی از ناحیه پستان در بافت نرم مغز به خصوص ناحیه مننژ...

کاهش ادم و التهاب ناشی از متاستاز مغزی در ناحیه عنکبوتیه، نرم شامه و سخت شامه

کاهش ترشح واسطه های التهابی در ناحیه مغز مثل اینترلوکینها، تی ان اف آلفا، و برادی کینین ها در جهت کاهش تورم ناحیه متاستاتیک

توده پستانی در دوران شیردهی

اعلام میکنیم برای؛ محصور شدن توده توسط سیستم دفاعی بدون از بین رفتن سیستم تغذیه ی تومور

(چون یک سری از توده ها هستند که در دوران شیردهی پر از شیر بوده و نمای توده های پستانی دارند. بنابراین اگه بعد از اعلام ما به صورتی که عرض کردم توده کوچکتر شد که هیچ، لذا اقدامات تشخیصی تکمیلی مثل ماموگرافی و سونوگرافی در کنار ذهن اشتراکی رو میذاریم واسه بعد از دوران شیردهی. اما اگر با اعلام ما، تورم و درد بیشتر شد شیردهی رو متوقف کرده و روزانه شیر رو دوشیده و دور ریخته و اقدامات تشخیصی رو شروع میکنیم و اونجا ذهن اشتراکی رو اعلام میکنیم برای؛

محصور شدن توده توسط سیستم دفاعی و ایمنی بدن و قطع ارتباط تغذیه ای توده برای کوچک شدن و از بین رفتن توده

سرطان متاستاتیک معده به ستون فقرات و لگن

اعلام میکنیم برای؛ فعال شدن فرآیند آپپتوز به واسطه فعال شدن فاکتورهای نکروز دهنده تومور و کاسپازها در جهت تخریب سلولهای بدخیم در معده و نواحی متاستازی

سرطان بدخیم پانکراس

اعلام میکنیم برای؛ بدخیمی های پانکراس؛ کاهش خونرسانی به توده بدخیم ناحیه،

شروع روند آپپتوز یا مرگ از پیش برنامه ریزی شده در سلولهای بدخیم و جلوگیری از متاستاز ضایعه به ناحیه اثنی عشر و کبد

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

انواع لوکمی ها یا سرطان های خون

برای انواع لوکمی ها یا سرطان های خون همگی به یک شکل اعلام میکنیم؛

اصلاح روند تقسیم (میتوزی) و بلوغ در گلبولهای سفید و پیش سازهای آنها در رده لنفوییدی و میلوییدی در سلولهای خونساز مغز استخوان

سرطان لنفوم

اعلام میکنیم برای؛ سلولهای پیش ساز لنفوسیتی B cell . ها T cell .ها برای انجام تقسیم صحیح و بلاک شدن فرایند تقسیم های غیر طبیعی

بیماری cml

نوعی از سرطان خون است و مشابه سرطان خون اعلام میکنیم

سرطان متاستاتیک کلیه به مغز

سلام دوستان، مشابه توده های بدخیم اعلام میشود

سرطان حنجره

اعلام میکنیم برای؛ شروع فرایند آپپتوز یا مرگ سلولی در سلولهای بدخیم ناحیه حنجره

ترشح فاکتورهای ضد التهابی و کورتیکو استروییدها در جهت کاهش درد و التهاب تارهای صوتی

غده های سینه

اعلام میکنیم برای؛ محدود شدن غده توسط سیستم دفاعی بدن، برای جلوگیری از رشد بیش از حد

تضعیف و از بین رفتن تمام سیستم های تغذیه کننده غده

لنفوم هوچکین

اعلام میکنیم برای؛ محدودیت رشد تومور، قطع عوامل تغذیه رسان و خشک شدن آن از داخل

عدم دسترسی تومورها به سیستم های خونی بدن (تا متاستاز ندهد)

تقویت سیستم دفاعی بدن در محصور کردن تومور

تشکیل جداره یی خاص در اطراف تومورها جهت ممانعت از پخش شدن تومورها

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

فیبروم

ذهن اشتراکی برای فیبروم رحمی، ساب سروزال و مورال رو میشه سوال کنید؟

ذهن اشتراکی فیبروم هم تقریبا مثل تومور اعلام میشه یعنی قطع شبکه خونرسانی و توقف رشد فیبروم

کیست هموروییید که خیلی دردناک و بزرگ شده

اعلام می کنیم برای ترمیم شبکه عروقی بواسیری . بافت همبند و ماهیچه صاف رکتوم اصلاح فشار سیاهرگی عروق ناحیه

کیست تخمدان

اعلام میکنیم برای؛ تخلیه ی ترشحات کیست و جذب آن توسط بدن

محصور شدن باقیمانده ی کیست توسط بدن در داخل تخمدان (تا دیگر ایجاد اشکال نکند)

سرطان تخمدان

مشابه توده های بدخیم اعلام می شود

سرطان ریه

(خانمی شصت ساله سرطان ریه بدخیم دارند تومور طرف چپ هست الان کوچیک شده پزشک گفته چسبندگی ریه داره)

اعلام میکنیم برای؛ حذف سلولهای بدخیم از طریق فعال شدن مکانیسم های آپپتوزی(مرگ سلولی) و حذف عامل عفونی باکتریایی از فضای پلور و اصلاح ترشح مایع پلور و ترمیم سلولهای ترشح کننده

متاستاز ریه

(سلام سال ۸۴ مبتلا به canser breast شدم ازمایشات مختلف از ریه و نمونه برداری نشان داد مشکوک به متاستاز ریه هستم)

مشابه بدخیمی ها اعلام می شود.. فعالیت آپپتوزی و حذف سلولهای بدخیم از ناحیه پستان و پلورو سلولهای بافت ریه

توده

(غده یی که بخاطر ضربه و پاره شدن رگ و خونریزی، مشکل دار شده است. لطفا توضیح ذهن اشتراکی رو بفرمایید)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

برای این مورد میتونیم ذهن اشتراکی بدیم بصورت محدود و محصور شدن توده توسط بدن و از بین رفتن منابع بقاء توده.

توده ریوی

(مشاهده ی توده یی مشکوک در سمت راست ریه، لطفا بفرمایید در ذهن اشتراکی چی اعلام کنیم؟)

معادل دیگر انواع توده ها و به این شکل اعلام میکنیم؛

محدود و محصور شدن توده توسط سیستم دفاعی و ایمنی بدن

قطع خونرسانی و تغذیه ی توده برای کوچک شدن و در نتیجه از بین رفتن آن

لیپوم چربی

(من بینا 51 ساله، سال 90 متوجه شدم در قسمتهای راستِ پشت گردنم، زیر بغلم و سینه راستم لیپوم خوش خیم چربی دارم. مشکل دیگرم گرگرفتگی است مثل اینکه همه جای بدنم بخصوص سرم آتیش روشن شده و دیگه اینکه همه جای بدنم لاغر میشه بجز شکمم)

به این شکل اعلام میکنیم؛ کاهش رشد لیپوم ها و قطع خونرسانی و تغذیه ی توده ها برای از بین رفتن آنها

گرگرفتگی هم با توجه به سن فرد می تواند از علائم یائسگی باشد و ...

گواتر سمی

در بیمار، گواتر سمی یا گریوز پرکاری و یا تومور خوش خیم یا بدخیم غده تیرویید وجود دارد...

اعلام میکنیم برای؛ بهبود و تنظیم ترشح سلولهای غده تیرویید

حذف و شروع فرایند تخریب سلولی توده ترشح کننده هورمونهای تیروییدی به وسیله فرایند آپپتوز

میاستنی گراو

سلام دوستان. در این مورد نوع توده باید مشخص گردد. در صورتی که توده بدخیم مربوط به بافت ریوی و یا استخوان استرنوم یا جناغ سینه است مطابق روال برای توده های بدخیم اعلام میکنیم... اما با توجه به توضیحات بیمار به نظر می رسد اختلال در سیستم ایمنی به صورت بیماری میاستنی گراو مطرح باشد. در این صورت برای بیمار؛

معادل توده های بدخیم اعلام می شود و همچنین اعلام میکنیم برای؛

حذف فعالیت ایمنی بر ضد رسپتورهای استیل کولین در سیناپس های عصبی عضلانی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

توده کبدی

سلام دوستان. توده های کبدی میتوانند به اشکال مختلف بدخیم شامل توده های سرطانی و یا خوش خیم به صورت کیست های کبد و همانژیوم کبد وجود داشته باشند. برای تمامی موارد در مجموع اعلام میکنیم...

شروع فرایند آپپتوز سلولهای توده توسط فعال شدن سایتوکاین ها، تومور نکروزیس آلفا و ماکروفاژها در تخریب ضایعه

کاهش خونرسانی که ضایعه همانژیوم و یا ضایعات هموراژیک کبدی و کیستیک در جهت نکروز و تخریب ضایعه

پلیپ رحم

معادل توده های خوش خیم اعلام می شود و همچنین اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ترشح هورمونهای جنسی زنانه به خصوص استروژن

پولیپ معده

برای پولیپ معادل توده های خوش خیم اعلام می شود

کیست

(کسی که توی مغزش -نزدیک خط وسط مغز -کیست داره و باعث ایجاد لرزش دست شده چی باید واسش اعلام کرد؟ دکتر ام آر آی رو دیده و گفته تا جایی که بشه با عمل مخالفه چون ریسکش زیاده، ما در ذهن اشتراکی چی باید اعلام کنیم)

برای کیست همون ذهن اشتراکی عفونت و تومور رو بکار میبریم

پلیپ بدخیم روده بزرگ

(دختر برادر من اول پلیپ روده بزرگ داشت که تشخیص دادند بدخیم هستش روده شو عمل کردن ولی الان دوباره هم روده بزرگش هم روده کوچک و هم طحال پلیپ سرایت کرده دکترا به اصطلاح خودشون میگن شکمش آب آورده نمیدونم معنیش چیه کم خونی شدید داره و دفع مدفوع هم خیلی زود زود اتفاق میوفته و میگن اوضاش خیلی خرابه...)

اطلاعات این پولیپ خیلی ناقص و اشتباه هست. اعلام کنید برای؛ بهبود عملکرد سیستم گوارش و روده ها و اعصاب تنظیم کننده

کیست روی پانکراس

مشابه توده های بدخیم اعلام میکنیم

خال گوشتی

(برای خالهای گوشتی که روی سر یا صورت هستند چی باید اعلام کنم؟)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

مطابق تومور ها اعلام می کنیم. همچنین مراجعه به پزشک جهت بررسی و نمونه برداری جهت تشخیص نوع آن

هماتوم سینه

معادل توده های خوش خیم اعلام می شود

آلرژی

اعلام میکنیم برای؛ به حداقل رسیدن پاسخ بدن به سیستم های هیستامین و حساسیت زا

به حداقل رسیدن میزان ترشح هیستامین (به روال عادی و نرمال برگردد)

بیماریها و مشکلات جنسی

زودانزالی در آقایان

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم و بهبود عملکرد سلول های مغزی

تنظیم و بهبود عملکرد دستگاه لیمبیک برای احساسات هیجانی

افزایش خونرسانی به آلت تناسلی

کاهش احساسات پوستی در آلت تناسلی

درمان افسردگی از طریق افزایش فعالیت و میزان هورمون سروتونین در مغز

پیرونی

اعلام می کنیم برای؛ حذف بافت همبند فیبری از بافت نرم پنیس

سندرم کالمن (کم کاری غدد جنسی در مردان)

ترشح هورمون آزاد کننده ی گنادوتروبین توسط هیپوتالاموس (GNRH)

بهبود عملکرد کلیه اعضای بدن و غدد داخلی و ....

افزایش میل جنسی در آقایان و خانمها

اعلام میکنیم برای؛ افزایش میزان هورمون های زنانه در خانمها و مردانه در آقایان و از بین رفتن تمام عواملی که باعث کاهش این هورمونها می شود مثل، دارویی خاص یا تومور یا غده یا مشکلات روحی.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

افزایش روحیه فرد مخصوصا افزایش فعالیت و میزان هورمون سروتونین در مغز

افزایش میزان گنادوتروبین ها که هورمونهای تنظیم کننده ترشح هورمون های جنسی هستند

افزایش تحریک مناطق حساس در سیستم تناسلی

انحنای آلت تناسلی توام با هایپوسپادیاس

(نوزاد ده ماهه یی دارم که از بدو تولد، دارای آلت تناسلی کوچک و کج و مجاری ادراری هم کج است. با توصیه متخصص اطفال به متخصص اورولوژ اطفال مراجعه کردیم که گفتند باید عمل جراحی بشه، که عمل جراحی هم ملزم به بزرگ شدن و رشد قطر آلت هست، در ضمن، هایپوسپادیاس هم بوده ست)

برای انحنای آلت تناسلی اعلام میکنیم برای؛ تقارن اجسام غاری دو طرفه برای اصلاح انحنای آلت تناسلی

در صورت توام بودن با هایپوسپادیاس اعلام میکنیم برای اصلاح ساختار ژن معیوب و ترمیم و بازسازی سلولهای سنگفرشی و بازال مجرا

پاره گی فتق

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم عضلات جدار شکمی همون سمت

تنوع طلبی جنسی

در این مورد علت فیزیولوژیک نداریم فقط علت سایکولوژیک دارد و مربوط میشه به تیکهای شخصیتی مثل شهوترانی که باید قربانی شوند

خود ارضایی (استمنا)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سیستم سروتونین و هسته ی آمیگدال در مغز

اصلاح نرم افزاری و حلقه ترک عادت

حرکت و افزایش اسپرم

اعلام میکنیم برای؛ تولید بهینه اسپرم توسط سلولهای اسپرماتوگونی در بیضه

روند بهینه ذخیره سازی و روند بلوغ اسپرم در مجاری وازودفران و اپیدیدیم

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

هرپس تناسلی

هرپس تناسلی (زگیل یا تبخال نوع 2) یک عفونت ویروسی هست که در اثر آلودگی به ویروس هرپس سیمپلکس ایجاد میشه. بیماری میتونه به صورت غیر فعال در بدن باقی بمونه و بارها عود مکرر داشته باشه. در این بیماری زخم هایی با ظاهر تاول مانند در ناحیه تناسلی هم در مردان و هم در زنان ایجاد می شود. با توجه به ماهیت ویروسی ش حتی میتواند در اثر عدم درمان نواحی دیگری مثل کبد و مغز را هم درگیر کند. در درمان پزشکی حتما باید از داروهای ضد ویروسی مثل آسیکوویر استفاده بشود و رفتارهای جنسی هم باید کنترل شده و با مراقبت کامل باشه.

اعلام میکنیم برای؛ افزایش و تقویت قدرت سیستم ایمنی بدن جهت مقابله با ویروس

تخریب در دیواره ویروس و مهار ساخت DNA ویروس

بهبود و ترمیم بافتی زخم های ناحیه تناسلی

واریکوسل (واریس وریدهای بیضه)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سیستم تخلیه وریدهای بیضه (چپ یا راست)

واریکوسل و کریپتوکیدیسم

(در مورد نازایی آقایی که واریکوسل داره و همچنین کوتاهی رگ بین بیضه ها و مجرا که باعث شده بیضه هاش کوچیک بمونن ودرون شکم و اسپرم هاش مُرده بیرون بیان)

برای واریکوسل اعلام می کنیم برای؛ اصلاح شبکه وریدی بالای بیضه ها (تنطیم تخلیه وریدی و ترمیم دریچه های وریدی)

و برای بیضه های پایین نیامده (کریپتوکیدیسم) اعلام می کنیم برای تکثیر سلولهای اسپرماتوگونی (اصلاح فرایند اسپرماتوژنز)

بی اختیاری ادرار

(بی اختیاری ادرار مربوط به اعصاب مثانه در بزرگسال)

اعلام میکنیم برای؛ افزایش قدرت انقباضی اسفنکتر(دریچه) مثانه

افزایش قدرت انقباضی اسفنکتر(دریچه) مجرای خروجی ادرار (کلیتوریس در خانمها – آلت تناسلی در آقایان)

تکرر ادرار

(برادرم سی سالشه. حدود یه ساله دچار تکرر ادرار شدید شده. همه ازمایشها سالمه. پزشکی اخیرا تشخیص داده که قسمت هیپوفیز مغزش ویتامین مربوط به کلیه رو ترشح نمیکنه. اسپریی بهش تجویز کردن که از این طریق تکرر ادرار رو تا حدودی کنترل میکنه. در ضمن دچار سردردهای شدید هم میشه)

اعلام میکنیم برای؛ افزایش قدرت انقباضی اسفنکتر(دریچه) مثانه

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

افزایش قدرت انقباضی اسفنکتر(دریچه) مجرای خروجی ادرار (کلیتوریس در خانمها – آلت تناسلی در آقایان)

آزواسپرمی (فقدان اسپرم)

(نبودن اسپرم در مایع منی و همین طور بسته بودن لوله ی انتقال اسپرم بر اثر بیماری عفونت در دوران کودکی)

آزواسپرمی (فقدان اسپرم) علتهای بسیار متفاوتی داشته و در ابتدا باید علت مشخص گردد. به طور خلاصه برای مهم ترین علتهای آن ذهن اشتراکی اعلام می شود. آزواسپرمی می تواند علت انسدادی یا غیر انسدادی داشته باشد.

برای نوع انسدادی اعلام میکنیم برای؛ ترمیم و بازسازی سلولهای مجاری اپیدیدیم و لوله منی بر و مجرای نزولی

و برای نوع غیر انسدادی اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ترشح هورمونهای هیپوفیز و جنسی مرتبط (FSH) و بهبود تولید اسپرماتوزویید ها (مراحل پیاپی تقسیم سلولی از سلولهای پایه تا تولید اسپرم فعال) و همچنین اصلاح اختلال ژن معیوب احتمالی

بیماریهای زمینه ای مانند واریکوسل و یا اختلالات هورمونی و حتی در معرض بودن با مواد شیمیایی نیز می تواند در بروز آن دخیل باشد.

کوچک و مخفی بودن آلت تناسلی در پسربچه 9 ساله

اعلام می کنیم برای؛ حذف تجمع چربی در بالای استخوان پوبیس و ترمیم نقصان پوستی پوشاننده آلت تناسلی

انواع بیماریهای پوستی

پسوریازیس

(در مورد خانمی ۴۰ ساله که حدود ۲۰ سال پسوریازیس Psoriasis دارند و در نواحی؛ کف سر ، آرنج و داخل گوش درگیر بیماری هست)

پسوریازیس مرتبط هست با اختلالات سیستم ایمنی و ژن معیوب نیز می تواند در افزایش احتمال ابتلا دخیل باشد. اعلام میکنیم برای؛

غیر فعال شدن آبشار سیگنالینگ مسیر التهابی در داخل سلولهای درم پوست و کنترل فعالیت ماکروفاژها و لنفوسیت هایT

غیر فعال شدن مسیرهای سیگنالینگ سایتوکاین ها برای جلوگیری از رشد غیر طبیعی و زودرس سلولهای اپیدرمی

اصلاح ساختاری و ترمیم ژن معیوب مرتبط با پسوریازیس

بهبود عملکرد سلولهای پوست در نواحی مربوطه

کاهش بیش از حد دخالت سیستم ایمنی به سلولهای پوست در نواحی مربوطه

بهبود عملکرد مناسب ذخیره و برداشت ویتامین D و کلسیم بخصوص در سلولهای اون ناحیه

کاهش تجمع نوتروفیل ها در زیر لایه شاخی پوست بازگشت روند شاخی شدن پوست به روال طبیعی

افزایشcAMP + کاهشcGMP

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ویتیلیگو یا بَرَص (لک و پیس)

(سوال 1. من بیماری برص یا لک و پیس دارم که کل بدنم یک دست سفید شده ولی الان شروع شده به سفید شدن و از بین رفتن رنگدانه های موهای بدنم میخواستم ببینم با وجود اینکه رنگدانه ای ندارم باز هم برای ذهن اشتراکی (افزایش فعالیت منالوسیدها برای تولید منالی)را اعلام کنم؟)

(سوال 2. خانمی هستم 45 یاله که از 10 سالگی ویتیلگو یا لکهای سفید پوستی دارم در سالیان متمادی که تحت درمان بودم قرص متوکسالن همراه با اشعه سولاریوم تحت نظر پزشک استفاده میکردم .حدوداً 80 درصد بهبودی موقت ایجاد شد ولی بعد از قطع درمان با سرعت لکها برگشتند. لطفاً بفرمایید چه مواردی اعلام شود)

سلام دوستان. بیماری بَرَص یا ویتیلیگو بیماری هست که در اثر اختلال در تولید رنگدانه ملانوسیت بعلت اختلال در غده پینه آل ایجاد میشه. علت بیماری درگیری سیستم ایمنی فرد و تخریب سلولهای تولید کننده ملاتونین هست. درمان رایج شون پوآتراپی که یک نوع اشعه درمانیه هست و استفاده از کورتتیکو استروییدها...

پاسخ 1. اعلام میکنیم برای؛ کاهش فعالیت سیستم ایمنی در تخریب اتوایمیون سلولهای رنگدانه ساز...

بهبود و بازسازی تولید سلولهای ترشح کننده ملاتونین...

درمان و بهبود بیماریهای ایمنی زمینه ای توام مانند نارسایی های غدد فوق کلیوی، غده تیروییید...

پاسخ 2. اعلام میکنیم برای؛ کاهش ترشح اسیتیل کولین بصورت نرمال و به اندازه مورد نیاز بدن از انتهای اعصاب محیطی اون ناحیه

افزایش فعالیت ملانوسیت ها و افزایش تولید ملانوسیت در اون ناحیه

افزایش تولید سروتونین برای آرامبخشی و کاهش استرس فرد

رفع لکه های پوستی و جای بخیه ها

(من مدت سه ساله که افتادگی پلکهام رو جراحی کردم که جای بخیه ها به شکل سفید گچی مونده؛ در مورد لکه های قهوه ای روی پوست هم که بیشتر روی پیشانی و لب قرار داره، راهنمایی میخواستم)

اعلام میکنیم برای؛ بازسازی لایه های پوست از سلولهای بازال(سلولهای شاخی و اپیدرم و درم) و تنظیم ترشح رنگدانه ملانین برای حذف لکه های پوستی

درمان جای سوختگی

برای ترمیم اسکار سوختگی اعلام میکنیم برای حذف بافت اسکار و همچنین بهبود تشکیل کلاژن و الاستین جدید در محل اسکار و ساخت عروق کاپیلاری جدید در جهت بهبود خونرسانی موضعی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

لکه های قارچی

اعلام میکنیم برای؛ از بین رفتن روندی که باعث ایجاد لکه ها شده است (که میتونه فعالیت قارچ باشه یا کاهش قدرت سیستم ایمنی بدن که به اون حالتش پیتریازیس آلبا میگن) و همچنین، پوسته ریزی ملایم لکه ها

زخم های بعد از لیزر

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم سلولهای پوستی ناحیه مورد نظر

بیماری پوستی روزاسه

اعلام میکنیم برای؛ بهبود فعالیت مویرگهای خونی در ناحیه و ترمیم بافت همبند آن و حذف عامل باکتریایی یا قارچی احتمالی

درمان پوست مرغی

اعلام می کنیم برای؛ اصلاح ژن معیوب و توقف هایپرتروفی (ضخیم شدن)لایه شاخی پوست

سوختگی و التهاب پوست

اعلام میکنیم برای؛ بهبود خونرسانی مویرگهای محیطی در ناحیه و توقف مسیر التهاب زایی

بهبود و افزایش سلول سازی از ناحیه ژرمینال پوست

خارش پوست نواحی تناسلی

خارش های ناحیه تناسلی در هر دو جنس بروز میکند و در زنان بیشتر التهاب بدلیل عوامل قارچی بروز میکنه و در جنس مذکر مهم ترین علت با توجه به مورد مذکور که پسر بچه هست درماتیت آلرژیک باشد. که معمولا بعلت حساسیت تماسی با مواد آلرژن با مخاط سر پنیس ایجاد می شود. به این مادر مهم ترین توصیه ای که می شود این هست که به احتمال زیاد فرزندش به لباس زیر از برخی از الیاف خاص حساسیت داره که بهتره از الیاف نخی که کمترین حساسیت را دارن استفاده کنه و همین طور ممکنه فرزندش به برخی از شتشو دهنده های لباس حساسیت داشته باشه که بهتره از صابون های گیاهی و خنثی برای شستشو استفاده کنند.

اعلام میکنیم برای؛ کنترل و کاهش آزاد سازی فاکتورهای التهابی در بروز و شروع فرایندهای التهابی..

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

اگزما (درماتیک تماسی آلرژیک)

(پسرم دستشون به ماده یی بنام z1 که ماده یی خنک کننده در دستگاههای cnc میباشد حساسیت پیدا کرده چند بار دکتر پوست مراجعه کرده و پمادهای مومتازول و چند پماد دیگر استفاده کردن بهبود چندانی نداشتن. کارگاهشون ماده مورد نظر رو عوض کردن و قبلا هم سابقه چنین حساسیتی نبوده. بفرمایید ذهن اشتراکی رو برای چه مواردی اعلام کنیم)

اعلام میکنیم برای؛ تقویت سیستم ایمنی + کاهش ترشح هیستامین

بهبود عملکرد سلولهای پوست و بازگشت روند شاخی شدن پوست به روال طبیعی

توصیه: پرهیز جدی از آب و رطوبت + استفاده از دستکش نخی در زیر دستکش پلاستیکی

پوست پرتقالی

برای پوست پرتقالی برای فیبروبلاست ها و رشته های کلاژن اعلام میکنیم

افزایش و ترمیم تولید بافت کلاژن و حذف سلولهای چربی در نواحی بین رشته های کلاژن

انواع لکه های صورت

لکه های صورت ممکنه بصورت کک و مک باشه، ممکنه جای جوش باشه که با فشار دادن ممکنه خال بشه. ما کلا برای لکه هایی که بدون عارضه ست مثلا خالهای برجسته داریم که این خالها ذهن اشتراکیشون فرق میکنه اینا یه سری اتفاقای دیگه توش میفته لکه هایی دیگه که تو صورت هست مثل کک مک یا لکه های حاملگی یا لکه های قرص های جلوگیری از بارداری باشه

برای انواع لکه های صورت مثل کک و مک یا جای جوش یا ... اعلام میکنیم برای؛ لایه برداری خیلی خفیف توسط پوست (مثل همون کرمهای aha که برای توسط لایه بردارها تجویز میشه)

هشدار پزشکی: پس از اعلام ذهن اشتراکی و بعد از مدتی که پوست بصورت پوسته پوسته در آمد نسبت به أشعه آفتاب بی حفاظ است و حتما باید در مقابل نور خورشید از ضد آفتاب استفاده شود

خشکی پوست

خشکی پوست علل متفاوتی دارد که در صورت وجود علت بیماری زمینه ای برای بیماری مذکور اعلام میکنیم.

در سایر موارد اعلام میکنیم برای؛ افزایش ترشح غدد چربی در زیر پوست

شُل شدن پوست بدنبال لاغری

اعلام میکنیم برای؛ بهبود چربی و ساخت کلاژن در ناحیه لایه های داخلی پوست

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

برطرف شدن جای زخم

اعلام میکنیم برای؛ برطرف شدن جای زخم و ترمیم سلولهای آسیب دیده در لایه های مختلف پوست

افزایش تعداد سلولهای پوست در مناطق اسکار (جای زخم) در حد نرمال

و پوشیده شدن محل ترمیم با سلولهای پوششی پوست در مسیر بافت پوست همان ناحیه به منظور یکدست شدن

برای کلاژن سازی کلیه

حدود ٪۷۰ پوست صورت از کلاژن تشکیل شده است. کلاژن یک بافت پیوندی است که مثل چسب سلولها را به هم چسبانده و هر چه افزایش سن پیدا می کنیم، چون کاهش کلاژن داریم، چین و چروک ها پیدا می شود.

ذهن اشتراکی اعلام می کنیم برای؛ افزایش تولید کلاژن توسط سلولهای پایه ای پوست

هر گونه تحریکی می تواند افزایش کلاژن سازی را در پی داشته باشد، مثل ماساژ صورت، مثل میکرودرم یا اندودرمی.

حداقل می توانیم از ماساژ صورت استفاده کنیم و کلاژن سازی را تحریک کنیم.

چروکها و خطوط عمیق صورت و گودی چشم

اعلام میکنیم برای؛ بهبود چربی و ساخت کلاژن در ناحیه لایه های داخلی پوست

لک های پوستی رایج در پشت دست

لک های پوستی معمولا به علت اختلال در رنگدانه های پوستی ایجاد شده و در مجاورت آفتاب تشدید می یابند.

اعلام میکنیم برای؛ کنترل تشرح و آزاد سازی هورمون ملاتونین از غده پینه آل و همچنین ترشح هموسیدرین از کبد و طحال

آلرژی پوستی به سرما که تبدیل به کهیر میشه

همانند آلرژی اعلام میکنیم برای؛ به حداقل رسیدن میزان ترشح هیستامین و کاهش پاسخ بدن به سیستم های هیستامین و حساسیت زا

ترکهای پوستی بعد از زایمان

اعلام میکنیم برای؛ افزایش فعالیت فیبروبلاست های اپیدرمال در جهت افزایش تولید بافت کلاژن در ناحیه آسیب دیده

بروز عارضه پوستی پس از فرادرمانی و دفاعی

(مدتی است با مادرم فرادرمانی و دفاعی کار میکنم، این عارضه پوستی براش بوجود اومده که هیچ مشکلی براش نداره، بیرون ریزیه؟)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه



در مورد عکس میتونه برون ریزی باشه مشکلی نیست

نظر دکتر در مورد روزه و نخوردن آب و غذا در ماه رمضان

اتفاقا روزه عالیه طبق تحقیقات آمریکایی ها، روزه IGF-1 یا هورمون رشد رو بالا میبره که إکسیر جوانی و طول عمر و ضد آلزایمر و بیماریهای بدخیمه در واقع جزو بزرگترین کشفهای تاریخ پزشکیه. الان در سیاتل آمریکا و مریلند چند انجمن پزشکی با روزه داری مریضاشونو درمان میکنن. میگن دکترای تغذیه نخوردن آب رو اشتباه میدونند درسته؟ متأسفانه اشتباه میگن و توضیح میدم که اونها میدونن یا آفریدگارشون....

اگر قرار بر این بود که نخوردن آب بخصوص در ماه رمضان ضرر داشته باشد پس در واقع، ما باید در کشورهایی نظیر؛ عربستان، اتیوپی، یمن، نیجریه و ماداگاسکار با بیشترین آمار سنگ کلیه مواجه می شدیم در صورتیکه علی رغم هوای بسیار گرم و زمان روزه داری طولانی در این نقاط، میزان سنگ کلیه کمتری وجود دارد

در بدن شخص روزه دار و کسانی که اعمال مذهبی رو عاشقانه انجام میدن ماده ای بنام اینترفرون ترشح میشه که از قویترین مواد دفاعی و قدرتمند بدن هستش

دژنرسانس - مشکل تعادل

طبق تحقیقات امریکایی ها در مورد روزه داری، دریافتند که در اثر گرسنگی، هورمون آی جی اف وان (IGF-1) افزایش می یابد و سلولهای عصبی که جزو اون دسته از سلولهایی هستند که بعد از تولد رشد آنچنانی ندارند - بر خلاف حالت عادیشون - شروع به تکثیر و رشد می کنند در صورتی که فرد شرایط روزه داری را دارد روزه در ماه رمضان و همچنین دو روز در هفته در غیر از روزهای ماه رمضان (بطور مثال دوشنبه و پنجشنبه) با تأیید پزشک خیلی مفید خواهد بود. در صورتی هم که فرد شرایط روزه داری را ندارد این گونه عمل کند که دو روز در هفته (بطور مثال؛ دوشنبه و پنجشنبه) صبحانه را کامل بخورد ولی از بعد از صبحانه تا فردا صبح فقط آب یا چای بخورد و روز بعدش رژیم عادی خودش را انجام دهد

اعلام میکنم برای؛ بهبود عملکرد و اندازه تمام سلولهای عصبی مغز و مخچه

چاقی

اعلام میکنیم برای؛ کاهش متناسب میزان جذب مواد در روده ها

کاهش آستانه تحریک مرکز سیری (تا زودتر دست از غذا بکشیم)

بالا رفتن آستانه تحریک مرکز گرسنگی در مغز (که دیرتر گرسنه بشیم)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

جلوگیری از تشکیل چربی های سلولیت (سلولیت ها، چربی های بدشکل و ایجاد کننده چاقی های نافرم هستند)

جلوگیری از تبدیل هرگونه ذخیره بدن به چربی های اضافه (یعنی ذهن اشتراکی اعلام میکنیم تا چربی بعنوان منبع انرژی به اندازه لازم برای بدن ذخیره شود و مابقی آن بصورت حرارت یا به طرق مختلف از بدن دفع شود)

ایجاد احساس تنفر از پرخوری و خوردن غذاهای پرکالری از طریق پل ارتباطی سیستم گوارش و دستگاه لیمبیک مغز برای کنترل احساسات هیجانی

چربی های بدفرم یا سلولیت

اعلام میکنیم برای؛ تسریع روند تجزیه ی چربی ها

کاهش روند تبدیل قند اضافی بدن به چربی

تسریع شکسته شدن مولکولهای چربی در بدن (لیپولیز)

کاهش روند تبدیل اضافی مواد غذایی (از طریق تبدیل قند به گلیکوژن و گلیکوژن به چربی)

افزایش متعادل هورمونهای مردانه و هورمونهای آنابولیک و کاتابولیک

توصیه پزشکی: انجام ورزشهای ایزومتریک در طول روز به مدت حداقل بیست دقیقه مثل؛ پیاده روی، رقص، طناب زدن و ...

نکته جالب و اساسی برای چاقی در ماه رمضان

(آیا می توانیم در ماه رمضان که روزه هستیم در مواقع گرسنگی ذهن اشتراکی رو اینجوری اعلام کنیم: استفاده از ذخیره سلولها؟)

در مورد چاقی قبلا توضیحاتی ارائه شد اما نکته ای که در ماه رمضان اتفاق می افتد این است؛ یادتان باشد مغز اندام بسیار هوشمندی است! دیده ایم که وقتی شخصی در حالت عادی قرار است رژیم بگیرد، اگر رژیمش ثابت باشد مغز بعد از یک مدت می فهمد، مثلا فرد قرار است غروب غذا بخورد، چه در رژیم درمانی چه در روزهای ماه مبارک رمضان، روزهای اول از ذخیره های چربی بدن استفاده می شود؛ مغز برای انجام فعالیت های بدنی؛ دستور استفاده از چربی ها را صادر می کند، ولی وقتی که چند روز گذشت و متوجه شد که شخص مثلا طبق ساعت ۸ شب ۹ شب قرار است افطار کند و غذا بخورد، معمولا خیلی کم این دستور را صادر می کند و بدن را در حالت بینابین قرار می دهد که کمتر از این ذخیره ها استفاده شود به همین دلیل، بهترین ذهن اشتراکی که برای چاقی در ماه مبارک رمضان می توانیم اعلام کنیم این است که روی ذخیره چربی بدن بیشتر کار شود یعنی جایی که قرار است ذخایر چربی بدن تبدیل شوند به انرژی و این انرژی به صورت های مختلف صرف شود.

ما در حالت عادی به مریض ها می گوییم کسی که می خواهد در ماه مبارک بیشتر لاغر شود، کافی است در ساعاتی مثل ۲ بعد از ظهر ۳ بعد از ظهر فعالیتی را شروع کنند، مثل پیاده روی، دوچرخه سواری. دیگر در این شرایط مغز نمی تواند دستوری را صادر نکند! مغز مجبور است که تسلیم شود و دستور استفاده از ذخایر چربی را صادر کند. این خیلی کمک کننده است؛ هم در ماه مبارک و هم در رژیم درمانی. کسانیکه رژیم می گیرند سر یک ساعت خاص غذا نخورند، مثلا یک بار شام نان و پنیر ساده بخورند و بار دلبخواهی بعد کمی بیشتر. این خیلی کمک کننده است.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

مسائل زنان، زایمان

لکه های قهوه ای در اثر بارداری

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ترشح و آزاد سازی هورمون ملاتونین از غده پینه آل

تنظیم مدار ترشح هورمونهای جنسی در محور هیپوفیز. هیپوتالاموس و غده فوق کلیوی

پست پارتوم(افسردگی پس از زایمان)

اعلام می کنیم برای؛ اصلاح ترشحات نوروترانس میتری مغز شامل سرتونین . نوراپی نفرین و دوپامین

آمنوره یا عدم قاعدگی

الف) آمنوره یا عدم قاعدگی و تخمک نابالغ

(خانمی ۴۰ ساله و مبتلا به آمنوره هست که هیچوقت بطور طبیعی پریود نشده ولی حدود ۱۳ سال با مصرف داروهای هورمونی پریود میشدن که بخاطر عوارض این داروها دیگه نمیخورن و در نتیجه پریود هم نمیشن. در ضمن، ایشون تخمک نابالغ دارن و دکترها میگن هورمونها از هیپوفیز ترشح نمیشه)

اعلام میکنیم برای؛ ترشح و تولید مناسب برای عملکرد مناسب از هورمون GNRH

افزایش ترشح با عملکرد مناسب هورمونهای LH و SFH و پرولاکتین

اثر بخشی هورمونهای تولید شده جهت تخمک گذاری و ایجاد سیکل طبیعی تخمدانها

بهبود عملکرد طبیعی سلولهای مغز و تخمدانها

ب) آمنوره یا عدم قاعدگی بدنبال سرطان سینه

(خانمی ۴۸ سال هستم که در سن ۳۹ سالگی سرطان سینه داشتم عمل جراحی کردم ولی سینه رو بر نداشتن فقط غده رو در آوردن، شیمی درمانی کردم و بعد از ۵ سال داروهام قطع شده بود چند ماهی پریود شدم و دیگه این اتفاق نیفتاد و همونطور که میدونین برای این مسئله من نمیتونستم دارو استفاده کنم چند ساله فرادرمانی کار میکنم ولی پریود نشدم البته به یمن حلقه ها خیلی خوبم و چند سالیه که دیگه ازمایشم نمیدم و چون به هوشمندی ایمان دارم امکانش هست که من دوباره پریودشم و باید رو چه قسمتی کار بشه)

سلام دوستان. برای موردی که خانم بدنبال سرطان سینه دچار آمنوره یا عدم قاعدگی شده بود: تومورهای سرطانی در ناحیه پستان برای رشدشان نیاز به هورمون دارند. به همین دلیل طبق جواب پاتولوژی موارد خیلی زیادی از سرطان های پستان به صورت درمانی از بازدارنده های هورمونهای جنسی مانند داروی تاموکسی فن استفاده میکنند تا رشد تومور متوقف گردد. بنابراین برای این خانم به صلاح هست که ترشح هورمونهایی که باعث ایجاد قاعدگی می شوند بلاک شده باشد تا از رشد مجدد تومور جلوگیری بشود.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

حاملگی خارج از رحم

حاملگی خارج از رحم وقتی رخ می دهد که محصولات حاملگی داخل رحم نباشد مثلا داخل لوله های رحمی شکل بگیرد. در چنین مواردی با هر چه بزرگتر شدن جنین، احتمال خونریزی بالا می رود و جان مادر بطور جدی در خطر است و اصولا در این شرایط جان مادر را نجات میدهند

ما نیز در کنار درمان پزشکی ایشان، بصورت کمکی اعلام میکنم برای؛ حرکت توده به سمت رحم و قرار گرفتن در مسیر طبیعی خویش،

یا از بین رفتن آن قبل از اینکه روح در آن دمیده شود

مسمومیت بارداری یا پرگلامپسی

اعلام میکنیم برای؛ کنترل ترشح و آزادسازی پروتیین های جفتی به جریان خون...

بهبود جریان خون بافت رحمی

کنترل ترشح فاکتورهای منقبض کننده عروق مانند نوراپی نفرین و اپی نفرین

درد رحم

(خانومی هستند ۴۸ ساله درد رحم دارند و فشار روی سر شون احساس می کنند، و احساس می کنند دستشویی دارند و زمانیکه دستشویی میروند احساس میکنه رحم داره از بدن خارج میشود، در ضمن ایشان دکتر رفتن ازمایش هم داده اثری از عفونت نبوده)

رحم و مثانه نزدیک هم قرار دارند. خانمها هم وقتی که سن شان بالا می رود، یا به دلیل زایمان های مکرر یا به دلایل دیگر. اولین چیزی که در مورد این خانم به فکر می رسد (از راه دور و ندیده البته، متاسفانه ما اطلاعات زیادی در دسترس نداریم) افتادگی مثانه یا افتادگی رحم هست. افتادگی هر دو با افزایش سن اتفاق می افتد. وقتی یکی از اینها شل می شود یا می افتدیا روی آن یکی می افتد و تحت فشار قرار می گیرد، فرد دائم احساسی روی مثانه می کند و احساس داشتن ادرار، گیرنده ها پالس می فرستند به مغز که ادرار داری برو تخلیه کن. در حالیکه ادرار نیست، فشاری است که از رحم به سمت مثانه می آید.

به احتمال زیاد افتادگی رحم دارند، یعنی شل شدگی رحم در داخل شکم. اولین کاری که باید انجام شود، سونوگرافی است تا ببینند وضعیت رحم و مثانه در چه حالتی هستند؟ آیا واقعا مشکل دارند یا نه؟ آیا واژن بیرون زده؟ آیا مشکل دیگری دارند؟

اول باید از این سیستم خیالمان راحت باشد و می توانیم ذهن اشتراکی اعلام کنیم. تا قبل از این جواب آزمایشها ذهن اشتراکی اینگونه اعلام می کنیم؛ درخواست افزایش قدرت رباط های نگه دارنده رحم و مثانه. رباط هایی که رحم را نگه داشته اند و عضوی که پشت مثانه هست و باعث انقباض مثانه می شود و پالس های عصبی اش بیشتر است، اعلام می کنیم تقویت بشوند و با تقویت رباطهای اطراف رحم که نگه دارنده هستند معمولا فشار کمتری روی مثانه می آید و ایشان احساس کمتری در دفع ادرار پیدا می کند.

بعد از جواب سونوگرافی و مشخص شدن اینکه مشکل کجاست، ذهن اشتراکی برای آن مورد هم اعلام می کنیم انشاالله.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

گُرگرفتگی خانم ۴۸ ساله

(من ۴۸سالمه و چهارساله که رحمم رو بخاطر اینکه پر از فیبروم بود در آوردم الان یکساله گرگرفتگی دارم تخمدانهام سالمه، ولی این گرگرفتگی بیچارم کرده هرچی قرص خوردم فایده نداره)

یک سری هورمون ها هست که از سیستم تناسلی مثل تخمدان ها ترشح می شود که سردسته شان استروژن هست. وقتی به هر دلیلی رحم یا تخمدان را بیرون می آوریم یا شخص یائسه می شود، میزان استروژن در خون کم می شود و یکی از دلایلی که منجر به گر گرفتگی ها در بیمار می شود، همین است! جالب است که درمانش با قرص های استروژن است یا قرص های گیاهی که میزان استروژن بالایی دارد. البته ما در بدن مان غده فوق کلیوی هم استروژن تولید می کند. پس برای این مورد ذهن اشتراکی را اینطور اعلام می کنیم:

افزایش میزان تولید استروژن از طریق غده های فوق کلیه که برای بدن نیاز هست، چون افزایش بیش از حدش هم دردسر ساز است.

اگر از تخمدان ها باقی گذاشته اند هم می توانیم همین را اعلام کنیم.

کلا افزایش استروژن به حد نیاز بدن باشد، برای جلوگیری از پوکی استخوان و جلوگیری از گر گرفتگی برای این بیمار، درخواست کنیم.

آبسه و عفونت سینه در طی بارداری که ماندگار شده

اعلام میکنیم برای؛ حذف و تخریب عامل باکتریایی ایجاد کننده آبسه و فعالیت سیستم ضدالتهابی(ترشح استرویید‌ها) و ایمنی برای بهبود درد و ادم درناحیه لوبولهای پستانی

بینظمی سیکل قاعدگی

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سیستم های کنترل کننده ی سیکل های ماهیانه در مغز، تخمدانها و رحم

تاخیر در قاعدگی

(عقب افتادن عادت ماهیانه به مدت چند ماه، بدون هیچ علت مشخص پزشکی و قبل از سن یائسگی پرژسترون هم زدن جواب نداده)

اعلام میکنیم برای اصلاح ترشح و فعالیت سیستم آندوکرین(به خصوص هورمون FSH) برای تنظیم فازهای قاعدگی

درد قاعدگی

دو یا سه روز قبل از پریود اعلام میکنیم برای؛ کاهش فعالیت پروستگلاندین ها مثل (F2آلفا) در حد تعادلی که برای بدن فرد وجود دارد...

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

یائسگی زودرس

(یائسگی زودرس که قطع پریود و ناباروری به دنبال داشته باشد)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سلولهای مغز، غده فوق کلیه، سلولهای تخمدان ها و رحم

افزایش توان سلولی و جوان ماندن سلولها دربخش های ذکر شده

تداوم فعالیت و تنظیم ترشحات استروژن و پروژسترون از طرف تولید کنندگان و پذیرندگان آن که در رحم و تخمدان ها هستند

(می توانیم اعلام کنیم که سلولهای جنسی - استروژن و پروژسترون - در مغز، رحم و تخمدان ها، و غده فوق کلیه که تولید کننده ی اینهاست، هنوز به ترشح خود در اندازه یی که فرد می خواهد جوان بماند - مثلا 25 ساله - ادامه دهند و سلولها جوان بمانند)

هم اندازه نبودن سایز پستانها به دلیل شیردهی از یک پستان

اعلام میکنیم برای؛ ترشح فاکتورهای ضد التهابی برای رفع ماستیت احتمالی و یا انسداد مجاری شیری

ترشح نابجای شیر از پستانها یا گالاکتوره

ترشح نابجای شیر از پستانها (گالاکتوره) علامتی از بیماریهای مختلف بوده و بعنوان یک بیماری در نظر گرفته نمی شود. شایع ترین علل آن شامل: مصرف هورمونها، تعداد زیادی از داروها مانند ضد افسردگی ها، ضد فشار خون، آرامبخش ها، بلاکرهای هیستامینی نوع H2 و یک سری از داروهای گیاهی مانند گزنه، رازیانه ... بوده و برخی بیماریهای زمینه ای مانند پرکاری و کم کاری تیرویید، اختلال کبدی، استرس ها، بیماریهای غدد هیپوفیز و هیپوتالاموس و حتی برخی تومورها می توانند علت این ترشح نابجای شیر باشند. میتوانیم به این منظور اعلام کنیم برای؛

تنظیم ترشح هورمونهای استروژن، پروژسترون از تخمدان ها و پرولاکتین از هیپوفیز و تنظیم ترشح دوپامین از هسته جسم سیاه

برای بارداری و تشکیل بی عیب جنین

اعلام میکنیم برای؛ انجام صحیح مراحل مختلف، تقسیم سلولی برای تشکیل اسپرم و تخمک (انتخاب بهترین ذخیره کروموزمی و ژن)،

تشکیل تخم، حرکت و جایگزینی جنین در بافت رحم، تغذیه و خونرسانی کامل جنین، و مراحل مختلف بافت زایی و اندام زایی جنین

توده در حفره اندومتر رحم

(به تازگی در حفره اندومتر رحمم توده یی از جنس پولیپ یا clot در اومده و خونریزیم هم قطع نمیشه، پنج ماهه وضعیتم اینه و دیگه کلافه شدم. برای حذف توده و قطع خونریزی ذهن اشتراکی به کجا باید اعلام کرد؟)

اگر پلیپ، تومور یا فیبرومی در رحم وجود داشته باشد رحم جمع نمی شود و در این صورت خونریزی هم متوقف نخواهد شد لذا؛ در ابتدا باید با مشورت پزشک مربوطه و انجام سونوگرافی، مشکل دقیقا مشخص شود و سپس ذهن اشتراکی رو برای همون بخش اعلام کنید

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

چسبندگی در لوله‌های رحمی (لوله های فالوپ)

چسبندگی در لوله‌های رحمی علتهای متعددی دارد شامل؛ عفونتهای لگنی و التهاب ناشی از آن، سابقه جراحی هایی مانند آپاندیسیت، کیست تخمدان، فیبروم رحمی و جراحی های لگنی، بیماری آندومتریوز ... که با توجه به نوع علت ذهن اشتراکی اعلام می شود.

چسبندگی لوله های رحم و تخمدانها

(خانمی که حدود ۱۵سال نمی تواند باردار شود و علتش فعالیت شدید آندمیتوز و چسبندگی در لوله های رحم و تخمدانهاست)

اعلام میکنیم برای؛ حذف سلولهای آندومتری نابجا در لوله ها و ترمیم بافت فیمبریای ضخیم شده برای حذف چسپندگی فیمبریا

چسبندگی لوله های رحم و تخمدانها

(نازایی: چسبندگی لوله و تخمدان، احتمالا بر اثر ویروس سل، (تست سل مثبت بود) 22 سال از ازدواجمون میگذره، چهاربار IVF بی نتیجه با تخمک اهدایی، خشکی واژن، کیست تخمدان)

اعلام میکنیم برای، ترمیم بافت فیمبریای ضخیم شده برای حذف چسپندگی فیمبریا و حذف عامل ویروسی سل

زایمان زودرس

(خانمی سی ساله که یکبار شش ماهه زایمان زودرس داشته گفتن بخاطر کوتاه بودن دهانه سرویکس رحم هست الان بارداره دوباره دکتر شون احتمال داده که دوباره همون مشکل پیش بیاد لطف میکنید از جناب دکتر سوال کنید که چه درمانی اعلام کنیم؟)

اعلام میکینم برای؛ افزایش قدرت سر دهانه رحم درخواست بشه

البته درمان پزشکیش سرکلاژه مشابه همونی که درخواست میشه

پرولاپس رحم

(شخصی که رحم پرولاپس شده و مقداری بیرون زده و پارگی های بعد زایمان باعث باز شدن شده)

اعلام میکنیم برای؛ افزایش قدرت انقباضی رباطها و عضلات نگهدارنده رحم و سرویکس

همچنین افزایش ترشح هورمون استروژن

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

درد لگن، پشت ران و زیر شکم

(ده سال پیش برای جلوگیری از بارداری آیودی گذاشتم ولی حرکت کرد و به سمت کبدم امد عملم کردن و در اوردن ولی ده سال درد لگن، درد توی پشت ران و درد زیر شکم دارم تو این ده سال هزاران دکتر رفتم همه میگن سالمی. سونو گرافی دادم هیچ مشکلی نیست ولی درد دارم و از لحاظ بدنی خیلی ضعیفم قرص مولتی ویتامین اهن میخورم ولی تاثیری نداره)

با توجه به این نکته که فرد ممکن است دچار سرویسیت یا التهاب دهانه رحم باشد برای هر دو قسمت اعلام میکنیم...

بازسازی اپیتلیوم سلولی سنگفرشی و استوانه ای بافت سرویکس و مهار عامل پاتوژن و التهابی بافت دهانه رحم

ترمیم زخم ایجاد شده در ناحیه سرویکس بدنبال تعبیه "ای یو دی" بواسطه ترشح و تولید فاکتورهای ضد التهابی و بازسازی سولهای مذکور

افزایش قدرت جذب مولکولهای آهن از اپیتیلوم روده ای

قوس کمر بعد از بارداری توام با درد

اصلاح قرارگیری مهره ها و دیسک های بین مهره یی در یک امتداد برای اصلاح لوردوز کمری، افزایش قدرت عضلات نگهدارنده مهره ها

سقط مکرر

(سقط مکرر - مشکل کروموزومی در کروموزوم های 4 و 10 - عدم بارداری و نارسایی تخمکها)

سلام دوستان. درمان سقط مکرر: سقط مکرر به سقط بیشتر از دو بار زیر بیست هفته گفته میشه. سه تا عامل کلی اصلی رو میتونیم برای سقط عنوان کنیم. اولین و مهم ترین عامل، نقایص ژنتیکی جنین هست. دومین گروه، علل مربوط به آناتومی رحم و ضمایم رحمی هست و دسته سوم عوامل مربوط میشه به شیوه های زندگی... درباره علت ژنتیکی میتونه نقایص ژنتیکی از والدین به ارث برسه و یا اینکه جهش ژنی به خاطر عوامل مثل شیوه زندگی، داروها، اشعه، مواد غذایی مصرفی مادر، و غیره پیش بیاد. تعداد زیادی از جنین های با نقص ژنتیکی قبل از تولد سقط و یا مرگ داخل رحمی میشن... به همین علت مادرهایی با جنین دارای نقص ژنتیکی میتونند سقط مکرر هم داشته باشن... به این مادرها توصیه میشه که از نظر پزشکی حتما قبل از تصمیم به بارداری مجدد آزمایش کاریوتایپ و در دوران بارداری تستهای غربالگری رو انجام بدهند. برای این مادرها میتونیم به صورت کمکی این موارد رو اعلام کنیم؛

اصلاح ساختاری و بهبودی در ژنهای مادر و پدر ...

اصلاح و بهبود روند تقسیم سلول جنسی مادر جهت تشکیل اووسیت..

اصلاح و بهبود تشکیل گامت نر...

اصلاح و بهبود روند تشکیل یاخته تخم...

اصلاح و بهبود روند لانه گزینی جنین در آندومتر رحم و تشکیل بهینه جفت جهت رشد بدون نقص جنین....

خانوم باردار ۴ ماهه که جفت در قسمت پایین رحم قرار دارد، برای تغییر محل جفت

اعلام می کنیم برای اصلاح شبکه عروقی آندومتر رحم برای تغییر محل غیرطبیعی جفت

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

کسی که سقط جنین داشته و الان دهانه رحم باز نیست و دفع هم نداشته

سوال واضح نیست. نیاز هست که دفع جنین صورت بگیره و یا اینکه بارداری مجدد بوده و جهت جلوگیری از دفع مجدد میخواهند کار بشود

ویار بارداری، تهوع و استفراغ

ویار بارداری علتهای متعدد و بعضا ناشناخته ای دارد برای مثال کمبود ویتامین های گروه B افزایش سطح استروژن خون، استرس های بدو شروع بارداری، به طور کلی میتوان برای کنترل تهوع و استفراغ بر روی مرکز تهوع واستفراغ مغز کار نمود....

کاهش و کنترل فعالیت مرکز تهوع و استفراغ مغز (area posteroma) در بصل النخاع

کاهش ترشح اسیدها به خصوص اسید کلرید ریک و گاسترین برای کنترل عوارض گوارشی

برای ویار شدید حاملگی اعلام میکنیم؛ کاهش حساسیت سلولهای بدن مادر به HCG (منبع تغذیه جنین در رحم که از جفت ترشح می شود)

نازایی ناشی از تخمدان ضعیف

ضعیف بودن تخمدانها علل مختلفی دارد ...

اعلام میکنیم برای؛ انجام بهینه روند تکاملی تولید مثل و تبدیل فولیکولها به فولیکول گراف

(یعنی یک فولیکولی که حاوی تخمک است در سیکل ماهانه شروع به بزرگ شدن می کند و در روز بین 12 تا 16 تبدیل به فولیکول گراف می شود و تخمک را آزاد می کند و سپس وارد شیپورک شده و منتظر ایجاد بارداری می شود)

ضخامت دیواره رحم

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ترشح هورمونهای جنسی زنانه گنادواستروییدها شامل استروژن و پروژسترون...

اصلاح ترشح و تولید فاکتورهای ضد التهابی و همچنین اصلاح سطح سیستم ایمنی و دفاعی بدن

نازایی

اعلام میکنیم برای؛ داشتن بهترین کیفیت اسپرم و تخمک در هر دو فرد

بهبود عملکرد سیستم رحم و تخمدان در خانم

بهبود عملکرد سیستم تناسلی مرد

تشکیل سلول تخم به بهترین شکل ممکن

چسبیدن سلول تخم به دیواره ی رحم

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

تشکیل جداره یا کیسه ها به دور سلول تخم به بهترین حالت

کیست بارتلون در واژن

اعلام میکنیم برای؛ حذف کانون عفونی در ناحیه ساک بارتولن بوسیله فعال سازی سیستم دفاعی پادتن ها و لنفوسیت هایT وB

سرویسیت (التهاب دهانه رحم)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سلول های دهانه رحم

غلبه ی گلبول های سفید بر میکروب هایی که عامل عفونت در دهانه رحم هستند

تخلیه ی لاشه های میکروبی توسط بدن

(در مورد **عفونت های خاص** می توان از ذهن اشتراکی درخواست کرد تا سیستم دفاعی بصورت تقویت شده تری عمل کند. سیستم دفاعی نیز بر اساس فاکتورهایی که دارد در برخی موارد باعث بروز تب می شود لذا برای تب هم می توانیم در ذهن اشتراکی اعلام کنیم که سلول ها رو با حداقل آسیب وارده به بدن، مورد هدف سیستم دفاعی قرار دهد)

تکرر ادرار خانم مسن

(برای برطرف شدن تکرر ادرار خانم سن بالا چی اعلام کنیم فقط حس ادرار داره وقتی دستشویی میره چند قطره بیشتر ادرار نمی کنه)

اعلام میکینم برای؛ افزایش قدرت اسفنکتر(دریچه) مجرای خروجی ادرار

بهبود عملکرد مغز در تنظیم اعصابِ آوران به سمت مثانه

بهبود و تقویت عضلات ترایگونِ مثانه (عضلاتی که در پشت مثانه مسول انقباض مثانه برای فشار ادرار به سمت تخلیه آن)

عدم رشد پستان دختر 20 ساله

اعلام می کنیم برای؛ اصلاح ترشح هورمونهای دخیل در پروسه رشد پستانی شامل استروژن، پروژسترون و پرولاکتین از مراکز ترشح کننده

عدم رشد پستان دختر 16 ساله

(برای یی که متاسفانه سینه هایش رشد نکرده و دکتر گفته باید پروتز کند چه ارتباطی را میتونیم اعلام کنیم)

اعلام میکینم برای؛ بهبود عملکرد غدد و هورمونها + افزایش تعداد و حجم سلولهای سینه

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

تنگی عروق

(خانمی هستم 59 ساله که به مدت 3 سال در ساق هر دو پا تا مچ، سرما و تورم کم به همراه تغییر رنگ پوست که لکه یی قهوه یی با درد در همین ناحیه است MRI کردم که تشخیص داده شد تنگی عروق شریانی در ساق هر دو پا وجود داره چی باید اعلام کنم)

به موازات درمان پزشکی و به صورت کمکی اعلام میکنیم برای؛

بهبود عملکرد دریچه های لانه کبوتری

رفع هرگونه فشار یا مانع بر سر راه بازگشت وریدی و بهبود عملکرد رگها و عضلات اون ناحیه (تا خون را به بهترین نحو به بالا برسانند)

بهبود عملکرد اعصاب اون ناحیه (اعصاب ساق پا و پشت پا از مهره های چهار و پنج کمری عصب دهی می شوند)

بهبود عملکرد اعصاب سمپاتیک در اون ناحیه

بهبود عملکرد سیستم ضد انعقادی بدن و تسهیل گردش خون در اون ناحیه

تالاسمی

دختر 9 ساله یی هست که تالاسمی مدیوم داره و دکتر گفته نباید غذاهایی که زیاد آهن داره استفاده کنه و در این صورت باید بعد از این غذاها چایی مصرف کنه و در غیر این صورت به کبدش آسیب میرسه. میخواستم بدونم آیا برای ذهن اشتراکی ایشان از همون تالاسمی استفاده و اعلام کنیم

بله. علت ارثی در هر مورد وجود دارد که باعث کمبود در پروتیین بتا در هموگلوبین می شود . برای تمامی موارد به یک صورت اعلام می شود

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ساختار ژن معیوب دخیل در بیماری و بدنبال آن تولید کافی پروتیین بتا هموگلوبین (نظر می کنیم به اصلاح فرایند اکسیژن رسانی در سلولهای قرمز خونی)

تالاسمی ها و کم خونی

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد ژن های تولید کننده ی زنجیره های آلفا و بتای تولید کننده ی هموگلوبین (تا شاید درمان رخ دهد)

رماتیسم مفصلی

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد استخوان و مفاصل

تداوم فعالیت سیستم های دفاعی با حداقل آسیب زدن به سلول های خودی

آسم

اعلام میکنیم برای؛ گشاد شدن تمام برونژها، برونشیول ها و داکت ها و مجاری های هوایی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

بهبود تخلیه و تنظیم ترشحات در مجاری هوایی

کبد چرب

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سلول های کبد برای تنظیم آنزیمهای کبدی و همچنین تنظیم فعالیت کبد

اعتیاد به انواع مواد مخدر

سلام دوستان. در مورد اعتیاد ما با یک فرآیند پیچیده جسمی و روانی روبرو هستیم که صحبت کردن در مورد آن نیاز به ساعتها بحث دارد... در پروسه اعتیاد علی رغم اینکه فرد به عواقب ناخوشایند کار آگاه است ولی عملا کنترلی روی رفتارهایش ندارد و بصورت ناخودآگاه کشیده میشود به سمت ماده اعتیاد آورش... در فرآیند اعتیاد ما با دو مقوله اعتیاد جسمانی و اعتیاد روانی روبرو هستیم. پس اگر قرار باشه درمانی برای فرد طراحی کنیم هر دو بُعد مساله باید در نظر گرفته شود. اول یه توضیح مختصر در مورد مراکز دخیل در پروسه اعتیاد بدهیم. در مصرف مواد مخدر ما یه وابستگی جسمانی یا سلولی داریم. در ابتدا که فرد بدنبال مصرف مواد سولهایش به ماده مخدر آداپته میشوند در سطح سلول ما پروتیین هایی داریم بنام گیرنده، هر ماده مخدری گیرنده داره در سطح هر سلول بدن، که بعد از مصرف مواد مکانیسم های تنظیمی سلول عادت میکنن به اون ماده، یه سری تغییرات ریز ملکولی در اونها ایجاد میشه که اگر با نبود یا کمبود ماده مخدر مواجه بشوند دچار تحریک شده و موادی از خودشون ترشح میکنند که باعث بروز علایمی مانند درد بدن و اضطراب و سایر علایم دوری از مواد میشود. اگر بخواهیم در بُعد روانی، مساله اعتیاد رو بررسی کنیم ما مراکز یا هسته هایی داریم توی مغز که با لذت و پاداش و انگیزش مرتبط اند، مثل ناحیه لیمبیک مغزی، هسته آمیگدال، مواد مخدر باعث تحریک این هسته ها میشود و ایجاد حالت لذت رو بدنبال مواد داریم. پس برای ترک دادن فرد باید هر دو بعد در نظر گرفته شود. یه ترک خوب اول باید ترک جسمانی یا سلولی باشد و بعدا بعد روانی ترک برایش کارشود. پس در اینجا ما صرف نظر از نوع ماده ای که مصرف میکنه دو تا کار برای یک فرد معتاد انجام میدیم؛

اول... ترک جسمانی و سلولی فرد معتاد که باید در مراکز ترک اعتیاد انجام بشه چون عوارض سلولی ناشی از کمبود ماده مخدر باید با یک دارو جایگزین بشه.. و بعد کم کم دارو هم قطع میکنیم

دوم بعد از ترک باید روی بعد وابستگی روانی فرد کار بشه که به مراتب مهم تر و اساسی تر هست... ترک جسمانی حدود یک تا دو هفته انجام میشه، اما ترک روانی بسیار سخت و نیاز به ماهها و سالها کار داره. ما می توانیم از ذهن اشتراکی به صورت بسیار مفید برای ترک روانی استفاده کنیم که قطعا جوابگو و کمک کننده خواهد بود..

اعلام میکنیم، برای؛ ترک تمام وابستگی های سلول های بدن و گیرنده های مخدر بدن به مخدرهای خارجی مثل، نیکونین، هروپین و ...

قطع و برداشته شدن وابستگی در سطح سلول و از بین رفتن این انطباق سلولی

در سطح روانی اعلام میکنیم برای مرکز لیمبیک مغز برای قطع و عدم دریافت پاداش و لذت متعاقب مصرف مواد..

اعلام برای هسته آمیگدال مغزی در عدم دریافت هیجانات و انگیزش های مثبت بعد از دریافت ماده مخدر...

قطع ارتباط مدارهای مغزی بین هسته سیاه با ترشح دوپامین و هسته های ونترال تگمنتال اریا و نئوکورتکس در دریافت لذت و پاداش ناشی از مصرف و تنظیم مدار....

و همچنین دریافت احساس تنفر و ناخوشایندی بدنبال مصرف ماده مخدر از تمامی مسیرهای ذکر شده...

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ترشح اسید معده

(رفلاکس معده و ترشح اسید بیش از حد، بقدری بالا میاد که گاهی گلو مثل تیروییید میسوزه و موجب بغض و عصبی بودن میشه)

اعلام میکینم برای؛ کاهش ترشح اسید معده

افزایش قدرت انقباضی عضله LES (پیوستگاه مری و معده)

هلیکو باکتری یا میکروب معده

سلام دوستان. هلیکو باکتر پیلوری نوعی از باکتری هست که به خاطر شرایط زیستی بی هوازی اش میتونه به راحتی در محیط معده گسترش پیدا کنه و باعث عفونتهای گوارشی و درمان مشکل زخم های گوارشی مانند اولسر پپتیک و گاستریت بشه...

این باکتری یه پمپی در سطح خودش داره بنام پمپ پتاسیم هیدرژن آ ت پی آز... این پمپ باعث مقاومت این باکتری در مقابل اسید معده و شرایط بی هوازی میشه. بنابراین کافیه برای این میکروب شایع گوارشی اعلام کنیم؛

اعلام میکینم برای؛ تخریب پمپ "پتاسیم هیدرژن آ ت پی آز" که در سطح غشای میکروبی قرار داره تا اسید معده بتونه تخریب باکتری رو انجام بده

هلیکوباکتری و التهاب معده و اثنی عشر

اعلام میکنیم برای؛ کاهش ترشح هورمون گاسترین و استیل کولین

غیر فعال کردن گیرنده های هیستامینی نوع H2 در جهت کاهش ترشح اسید معده و اثنی عشر

افزایش ترشح موکوس از سلولهای غدد ترشح کننده موکوس و ترمیم بافت اپی تیلیوم (مخاط) گوارشی

تخریب دیواره باکتریایی برای حذف هلیکوباکتر

حساسیت معده

(حساسیت معده به شیر و ایجاد دل پیچه، اسهال و تهوع)

برای عدم تحمل شیر به این صورت اعلام میکنیم؛

اصلاح ساختاری ژن معیوب تولید آنزیم لاکتاز

ترمیم و بازسازی مخاط سیستم گوارشی به خصوص روده کوچک در جهت بهبود هضم و جذب لاکتوز

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

زخم معده

برای زخم های گوارشی اعلام میکنیم برای؛

کاهش ترشح هورمون گاسترین و استیل کولین و بلاک گیرنده های هیستامینی نوع H2 در جهت کاهش ترشح اسید معده

افزایش ترشح موکوس از سلولهای غدد ترشح کننده موکوس و ترمیم بافت اپی تیلیوم (مخاط) گوارشی

اختلال عملکرد کلیه ها

(در سونوگرافی یکی از کلیه ها کوچک شده یکی بزرگ! گفتن کلیه ها اختلال عملکرد دارن. لطفا توضیح ذهن اشتراکی رو بفرمائید)

سلام دوستان، بیماری کلیوی طولانی مدت در اثر عدم درمان باعث میشود که به واحدهای عملکردی کلیه که گلومرول ها هستند آسیب وارد بشود و به مرور زمان باعث کاهش حجم کلیه بشود. آتروفی کلیه در واقع شروع نارسایی کلیوی هست که باز هم عدم درمان به موقع باعث نارسایی کامل کلیه می شود.

برای این بیمار علاوه بر درمان دارویی برای بهبود عملکرد کلیوی، میتوان در ذهن اشتراکی به این شکل اعلام کرد...

بهبود کارکرد واحد های عملکردی کلیه در برداشت و دفع مواد زایدی مانند اوره و کراتنین... .

کنترل و کاهش تخریب این واحدهای عملکردی و بازسازی سلولهای نفرونها

هیدرونفروز کلیه

(هیدرونفروز کلیه گرید 1 و یورتروسل و ریفلاکس)

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ارتباطات بین حالبها، مثانه و کلیه و رفع هر نوع انسداد یا تنگی مجرا در محل ارتباط حالب و کلیه

و همچنین بهبود کلیرانس کلیوی و انتقال از طریق گلومرولها و توبولهای کلیوی

آنژیومیولیپوم کلیه

اعلام میکنیم برای؛ قطع خونرسانی به توده در جهت نکروز ضایعه

شروع ترشح فاکتورهای پره آپپتوزی جهت حذف توده و بافت کلسیفیه و چربی مجاور توده

فیبرز کلیه

(همسرم بیماری دارد به نام فیبرز ریتوپری توان -اگر درست نوشته باشم- یک کلیه اش از کار افتاده ولی از بدن خارج نشده وکلیه سمت راست صد در صد کار می کند و حدود کُرتون پنج میلی استفاده می کند لطفا راهنمایی فرمایید)

بطور کلی برای فیبروز ها اعلام میکنیم برای؛ افزایش خونرسانی به بافت مورد نظر

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

افزایش تولید سلول سازی و تولید سلولهای جدید در همان ناحیه در جهت عملکرد نرمال عضو مورد نظر

پاکسازی بافت فیبروز شده از مواد غیر کاربردی و نامناسب

افزایش قدرت سیستم ایمنی و دفاعی بدن

کیست کلیه

کیست های ساده کلیه که در معمولا در سن بالا و به صورت تکی و یا چند تایی ایجاد میشود از نظر علم پزشکی نیاز به درمان خاصی ندارد مگر اینکه فشار روی قسمتی از کلیه ایجاد کنه به خاطر سایز بزرگ و یا فرد دچار خونریزی در ادرار و عفونت مکرر کلیه و مجاری ادراری شود. البته چک آپ دوره ای لازم هست به خاطر کنترل احتمال بدخیم شدن... هنوز علت مشخصی برای ایجاد کیستهای کلیه شناسایی نشده است. در ذهن اشتراکی میتوانیم به این شکل اعلام کنیم...

ایجاد تغییراتی در فعالیت سلولهای جدار کیست بصورت افزایش فعالیت ترانس پورترهای سلولی در برقراری تعادل مایعات داخل و خارج سلولی

حذف کانون عفونی احتمالی موجود در کیست با افزایش فعالیت سیستم ضد التهابی شامل ماکروفاژها نوتروفیل ها و لنفوسیت ها

کم کاری کلیه

برای بیماری، کلیوی که کلیه ها بر اثر دفع پروتین و کراتین بالا کم کار شده اند و کلیه ها کوچک شده اند)

واسه افزایش کراتی نین و دفع پروتیین در ادرار باید ذهن اشتراکی بدهیم برای؛

بهبود عملکرد گلومرولهای کلیه و تغذیه و تقویت سلولهای کلیوی

ندول اکوژن در کلیه در پارنشیم ثلث میانی کلیه

معادل دیگر انواع کیست ها یا تومورها، به این شکل اعلام میکنیم برای؛

محدود و محصور شدن توده توسط سیستم دفاعی و ایمنی بدن

قطع خونرسانی و تغذیه ی توده برای کوچک شدن و در نتیجه از بین رفتن آن

نوروفیبروماتوز

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد تک تک سلول های عصبی بدن و برداشته شدن فشار از روی این سلول ها در نواحی که باعث فیبروماتوز یا برجستگیهای زیر پوستی شده است

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

آنتی Tpo

(آنتی Tpo، نوعی آنتی بادی است که در بیماری های خود ایمنی مخصوصا برای تیروییدهای مخفی خود را نشان می دهد)

در صورت بالا بودن آنتی Tpo، اعلام میکنیم برای؛ کاهش حداقل آسیب از طرف سلول های ایمنی بدن به سلول های خودی

تورم پروستات

اعلام میکنیم برای؛ کوچک شدن سلولهایی که در پروستات بزرگ شده اند

محدود شدن و نابودی هر گونه سلولی که بصورت بدخیم، سرطانی و غیرمتعارف در پروستات شروع به رشد می کند

سرماخوردگی

اعلام میکنیم برای؛ تقویت بهینه سیستم دفاعی بدن در برخورد با هر نوع میکروب (باکتری یا ویروس) برای نابودی آنها

واریس

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد وریدهای سطحی و عمقی پا (تا به بهترین نحو، تخلیه خون سیاهرگی رو به قسمتهای بالاتر انجام بدهد)

لرزش دست (ترمور)

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم و بهبود عملکرد سلولهای عصبی در ورود و خروج یونها به داخل سلولها

تنظیم انقباضات عضلانی در پایانه های عصبی

میگرن شکمی

(دخترم ۲۲ ساله و مجرد هستند؛ هفته ای یک بار سردرد و چشم درد همراه با تهوع میگیره. وقتی که به این موضوع فکر میکنه به سراغش میاد به چشماش فشار میاد و رفلکس معده هم داره حدود هفت ساله که این مشکل رو داره)

در مورد سر درد و حالت تهوع دختر خانمی که مادرشان گفته ۲۲ ساله و مجرد هستند؛ چون این موضوع هفته ای یک بار اتفاق می افتد و ماهی یک بار نیست؛ پس ربطی به پریودشان ندارد، یعنی افزایش فشار مغز در اثر مشکلات قاعدگی ندارد. چون رفلاکس معده و حال تهوع دارد و ۷ ساله که این مشکل با ایشان همراه است و هفته ای یک بار و وقتی که به آن فکر می کند ممکن است که شروع شود؛ اینها اگر معمولا مشکل غدد، مشکل تیروئید نداشته باشند، آزمایشات انجام شده باشد، مشکل قلبی و یا فوق کلیوی نداشته باشد؛ اگر اینها را برایش انجام داده باشید، تنها چیزی که ما روی آن فوکوس می کنیم و روی آن فکر کنیم؛ میگرن شکمی است.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

یک سری میگرن های شکمی داریم که اینها در اثر ناراحتی معده، دچار سردرد می شوند که مانند سردرد میگرنی با حالت تهوع همراه است. به شرطی که کارهای اولیه انجام شده باشد، یعنی اگر پریودش منظم باشد، اگر مشکلی در وزن نداشته باشد، یعنی خیلی لاغر یا خیلی چاق نباشد و مشکل غددی نداشته باشد،

برایش دو نوع دارو شروع می کنیم، یکی از داروها مخصوص میگرن های شکمی است به نام باکلوفن، ۱۰ میلیگرمی دارد و ۲۵ میلیگرمی. باکلوفن ۲۵ میلیگرمی را شروع می کنیم، ۸ ساعت یک بار، البته به شرطی اینکه با غذا بخورد تا مشکل معده پیدا نکند، روزهایی هم که روزه است می تواند سحر و افطار و ۱۲ شب بخورد. اگر در عرض یک هفته که استفاده کرد سر دردش کمتر شد که چه بهتر، در کنار این یک داروی دیگر هست به نام سوماتریپتان ۵۰ میلیگرم، اگر سر درد خیلی شدیدی پیدا کرد در همان لحظه سوماتریپتان را بخورد که اگر افتاد، به نفع همان میگرن شکمی باشد، یعنی از مشکلات معده، میگرنش شروع شود، هست و می تواند درمان شود.

پس ذهن اشتراکی اعلام می کنیم برای همان میگرنی که قبلا اعلام کرده بودیم، تا رگ های مغز به حالت اولیه شان برگردد و قطرشان کم شود، از طرفی هم برای دستگاه گوارشی اعلام می کنیم، بهبود عملکرد دستگاه گوارش به اضافه ی بازگشت قطر رگ های مغز به حالت اولیه (که در میگرن گشاد می شود) این دوتا را اعلام می کنیم، در کنارش دارو هم می دهیم.

سردردهای شبه میگرنی

اعلام میکنیم برای؛ بازگشت رگهای مغزی به حالت نرمال و تنظیم ورود خون به آن

رقیق شدن خون

اعلام میکنیم برای؛ از بین رفتن هرعاملی که باعث افزایش چسبندگی خون شده است (تا بدن به حالت طبیعی برگردد)

کیسه صفرا

اعلام میکنیم برای؛ حل شدن سنگ یا تومور در صفرا (اگر موجود باشد)

باز شدن مجرای کیسه صفرا (در صورتی که تنگ یا بسته باشد)

برطرف شدن عواملی که باعث ایجاد سنگ یا موجب گرفتگی مجرای صفرا می شود

(توصیه می شود افراد چاق با رژیم مناسب از چاقی بیشتر، جلوگیری نمایند)

کم کاری تیرویید

اعلام میکنیم برای؛ جذب حداکثر یُد در بدن و افزایش ساخت هورمونهای تیروییدی.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

(درمورد کم کاری تیروییدانواع مختلفی داریم که شایعترین اونها کمبود ید در بدن و در نتیجه کاهش هورمونهای تیروییدی هست. البته بهتره آزمایشات تیروییدی رو زود به زود انجام بدیم تا نتیجه درمان اشتراکی مون رو با نتیجه درمان دارویی تطبیق بدیم)

کم کاری تیروییدبعد از خوردن یُد رادیواکتیو

اعلام میکنیم برای؛ افزایش فعالیت سلولهای فولیکولی برای تولید هورمونهای تیروییدی

اصلاح محور هیوفیز - هیپوتالاموس در ساخت هورمونهای تنظیم کننده ترشح تیروییدی

پرکاری تیروئید

پرکاری تیروئید که روی میل جنسی هم موثر بوده است

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم سلولهای تیروییدی در ترشح هورمونهای تیروییدی

بهبود عملکرد سلولهای بدن و تیروییدی (تا باعث رفع عوارض ناشی از پرکاری تیروئید شود)

کم خونی

(کم خونی که به قرص آهن جواب نمی دهد)

اعلام میکنیم برای؛ عملکرد صحیح کمپلکس آهن، B12 و فاکتور داخلی

جذب بهینه آهن توسط سلول ها

رفع هر گونه اختلال توی مسیر، در B12 و فاکتور داخلی و جذب آهن

تنظیم هورمونها

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم هورمونها در بهترین عملکرد برای سلولهای کل بدن

سرمایی و گرمایی

اعلام میکنیم برای؛ تقویت سیستم دفاعی بدن و کاهش پاسخدهی سیستمهای آلرژی و هیستامینی به محرک ها در حد تعادل

(توصیه: سرمایی و گرمایی بودن به دلیل نوع آفرینش خاص هر فرد، شاید برایش مفید بوده باشد اما اگر این حالت آزاردهنده است اقدام به درمان کنیم)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

پارکینسون

اعلام میکنیم برای؛ تولید دوپامین لازم بر اساس تنظیم عملکرد بدن توسط جسم سیاه - سابسنشن نیگرا – در مغز، برای داشتن یک بدن نرمال (به گونه یی که فرد نه دچار سایکوز و مشکلات روانی شود و نه علایم پارکینسون باقی بماند)

برای لرزش و بی حسی دست

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم عملکرد سیستم عصبی و کاهش تعداد انقباضات عضلانی در ناحیه مورد نظر

رشد تاخیری، عدم تکلم و تمرکز دختر چهار ساله پس از تشنج در 4 ماهگی

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد مرکز تکلم در مغز ناحیه بروکا و اصلاح ارتباطات مغزی بین نواحی کورتکس به خصوص ناحیه پریفرونتال و لیمبیک و آمیگدال

عدم توانایی تکلم بدلیل پارگی رگ گفتار در بدو تولد

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد و ترمیم بافتی در دو ناحیه ی مرکز گفتاری در لوب گیجگاهی و مرکز ارتباط گفتار در شکنج بروکا و ناحیه ورنیکه مغز

عدم قدرت تکلم کودک چهار ساله

کودکی که الان ۴ سالشه و به صورت مادرزادی قسمت حلزونی گوش نداشته و الان برایش حلزون گذاشتند ولی هنوز قدرت تکلم ندارد

بهبود عملکرد در دو ناحیه مرکز گفتاری در لوب گیجگاهی و مرکز ارتباط گفتار در شکنج بروکا و ناحیه ورنیکه مغز

تکلم رباتیک

(پسرم مثل ربات صحبت می کنه و کلمه کلمه و ۳ سالگی زبان باز کرد الانم ۴ سال و ۶ ماه جملات نامفهوم زیاد میگه و مورد تمسخر همسالان خودشه ۳ ساله که بود پیشانی خورد به لبه در و شکاف عمیقی برداشت و اسکن مغزی کردیم چیزی مشخص نبود و موقع دنیا اومدن هم با وکیوم به دنیا اومد. نمیدونم اینا میتونن علت لکنت باشن و یا نیاز به بررسی بیشتری داره. البته پدرش هم آدم تندخو و عصبانیه و خیلی پسرم رو سرزنش می کنه و هیچ کنترلی رو اعصابش نداره و حتی سر کوچکترین چیزی پسرم رو تنبیه می کنه و پسرم هم خیلی جیغ می کشه و هم می زنه)

واسه تکلم رباتیک علاوه بر توصیه به آرامش پدر و افزایش اعتماد به نفس در کودک، اعلام میکینم برای؛

بهبود عملکرد مغز در ناحیه تکلم Broca

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

عدم تکلم و راه رفتن

(دختر بچه ی چهار ساله که نه راه میره و نه صحبت میکنه و جواب تمام ازمایش ها هم سالم هست)

اعلام میکنیم برای؛ سیستم پردازش هوشمندانه اطلاعات مغز و رفتار حرکتی تمام اعضاء حرکتی

و همچنین برداشته شدن مهار از روی دستگاه حرکتی مغز

تعیین جنسیت

معمولا برای کسی که سالک الی الله است تسلیم بودن یک امر عادیست یعنی ما میپذیریم آنچه را که باعث خوشبختی ما میشود از طرف خداوند بر أساس علم الهی مقدر میگردد و با این تفکر خواسته های خود را از خداوند میخواهیم و میدانیم هنگامی که به او اعتماد کردیم رستگاری در چند قدمی ماست حتی در مورد سپردن جنسیت بچه به منبع آگاهی و نور هستی، اما با توجه به صحبتهای بالا؛ اگر بخواهیم برای تعیین جنسیت، ذهن اشتراکی کار کنیم موقع مناسب آن قبل از تلاقی سلولهای جنسیت است یعنی؛

اگر دختر خواستیم باید ذهن اشتراکی اعلام کنیم که، اسپرمِ حاوی سلول جنسی x به تخمک رسیده و سلول xx تشکیل بشه

اگر پسـر خواستیم باید ذهن اشتراکی اعلام کنیم که، اسپرمِ حاوی سلول جنسی y به تخمک رسیده و سلول xy تشکیل بشه

بی حسی انگشتان دست و پا

(حدود دو سال هست که کف دست چپم رو به انگشت دوم بعد از انگشت کوچک یک حالت گره داره که انگشتم رو نمی تونم درست صاف کنم و پای چپم هم از دومین بی حس هستش یه موقع میشه تا بالای رانم هم بی حس میشه)

اعلام میکنیم برای؛ تقویت و بهبود عملکرد سیستم عصبی دست و پا

تقویت و بهبود عملکرد اعصاب از نخاع، شبکه بازویی زیر بغل تا داخل انگشتان دست

تقویت و بهبود عملکرد اعصاب برای پنج مهره ی کمری تا داخل انگشتان پا

پیودرما گانگرنوزوم یا زخم اولسراتیو

پیودرما گانگرنوزوم یک زخم اولسراتیو غیر عفونی و التهابی است که معمولا با اختلالات زمینه ای و بیماریهای سیستمیک مانند کولیت اولسراتیو، لوکمی، میلوما، هپاتیت و لوپوس و ... همراه است. اعلام میکنیم برای؛

بهبود و کاهش اثرات التهابی مزمن سیستم گوارش روده ای و فعال شدن استرویید‌ها در جهت کنترل واکنش های التهاب روده ای...

کاهش فعالیا سیستم ایمنی در جهت جلوگیری از تشکیل ضایعات اولسراتیو

شروع فرایند نکروز بافت گانگرنه در جهت جداسازی قسمتهای نکروتیک بافت آسیب دیده

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

شروع فرآیندهای ترمیم بافت اپیدرمال و درمال در جهت ترمیم اولسر پوستی

هموروئید یا بواسیر

اعلام میکنیم برای؛

افزایش ترشح فاکتورهای ضدالتهابی در جهت کاهش درد و تورم ناحیه مقعد

بهبود اتساع وریدهای مجرای مقعدی

افزایش خونرسانی و سیرکولاسیون خون در عروق سر استخوان فمور

افزایش فعالیت سلولهای استوسیت و استحکام داربست استخوانی سر استخوان فمور

بهبود جذب کلسیم از سیستم گوارشی

شقاق

اعلام میکنیم برای؛ بهبود خونرسانی عروقی به آنودرم و رفع ایسکمی عروقی و اسپاسم اسفنگتر مقعدی

یبوست

(یبوست دایم به علت، تنبلی روده، عضله و ماهیچه های لگن ضعیف، درد در دنبالچه و کشاله ران، نفخ شکم بعد از هر وعده غذایی)

سلام دوستان. یکی از مهم ترین علتهای فیزیولوژیک یبوست مربوط می شود به اختلال در عملکرد قسمتی از سیستم اتونوم به نام سیستم پاراسمپاتیک... البته یبوست علتهای متفاوتی داشته ولی با توجه به توضیح ایشان به نظر میرسه صرفا روی این سیستم ذهن اشتراکی اعلام بشه نتیجه بهتری خواهند گرفت...

اعلام میکنیم برای؛ افزایش فعالیت سیستم پاراسمپاتیک به خصوص شاخه های اعصاب لگنی، اعصاب ناحیه رکتوم و افزایش ترشح عقده های عصبی در ناحیه جدار روده کوچک، روده بزرگ و دریچه پیلور در جهت افزایش ترشح استیل کولین و بهبود عملکرد انقباضی عضلات این ناحیه

یبوست مزمن و خشکی روده بزرگ منتهی به مقعد

افزایش فعالیت سیستم پاراسمپاتیک به خصوص شاخه های اعصاب لگنی. اعصاب ناحیه رکتوم و افزایش ترشح عقده های عصبی در ناحیه جدار روده کوچک. روده بزرگ و دریچه پیلور در جهت افزایش ترشح استیل کولین و بهبود عملکرد انقباضی عضلات این ناحیه

فیشر

(خواهرم مشکل فیشر دارن که مزمن شده و گوشت اضافی هم آورده است)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

در صورت داشتن فیشر، اعلام میکنیم برای؛ تزاید سلولی در ناحیه مقعد

توصیه پزشکی و دارویی: استفاده از پماد یا قطره MG استفاده از شربت های نرم کننده ی شکم مثل؛ لاکتولوز (بعد از هر وعده غذا 2 یا 3 قاشق غذاخوری) - کاهش مصرف غذاهایی که منجر به یبوست می شوند مثل؛ چای و نوشابه و ...

در صورت داشتن هموروئید یا بواسیر، مطابق واریس اعلام میکنیم؛

بهبود عملکرد تخلیه لنفاتیک در ناحیه مقعد

بهبود عملکرد تخلیه سیاهرگهای ناحیه مقعد

انقباض و جمع شدگی رگهای ناحیه مقعد

سرماخوردگی های طولانی با بزرگی غدد لنفاوی

(لطفا برای سرماخوردگی شدید و دل درد ناشی از اون و بزرگ شدن غدد لنفاوی شکم، توضیح بفرمایید)

سلام دوستان. سرماخوردگی های طولانی با بزرگی غدد لنفاوی؟؟! برای این مورد فکر میکنم بهتره با یه فوق تخصص خون حتما مشاوره بشه... من نگران بدخیمی های خونی شدم

نقص سیستم ایمنی

(دوستی دو سال پیش ضعف بینایی پیدا کرده بود و بعد از اون عفونت منتشر از مغز به همه اندامها داشته است. پزشکان تشخیص مننژیت و گاهی ام اس دادن! در حال حاضر نیز بواسطه ضعف عملکرد قلب و عفونت، تحت عمل قلب هستند. لطفا توضیح ذهن اشتراکی و اینکه اجازه دفاعی هم داده شده نظر رحمانی بفرمایید)

سلام دوستان. با توجه به علایم داده شده از بیماری در کل برای این بیمار می توان ابتلا به نقص سیستم ایمنی را مطرح کرد. بیماران مبتلا به سندرم های نقص ایمنی بعلت تضعیف سیستم ایمنی و دفاعی بدن مستعد ابتلا به مواردی مانند مننژیت.. میوکاردیت یا التهاب پریکارد قلب.. درگیری سیستم مغزی به التهابات مغزی و همچنین طیف وسیعی از بیماریهای عفونی بشوند. اختلال دید این فرد میتواند اولین نشانه تضعیف سیستم ایمنی بوده که در مجموع برای درمان این بیماران تمام مراکز دخیل در بهبود سیستم ایمنی را فعال و تقویت سازی میکنیم...

اعلام میکنیم برای؛ افزایش در ترشح ایمنوگلوبولین ها برای بهبود عملکرد سیستم ایمنی و دفاعی بدن

افزایش سطح تولید لنفوسیت های T در جهت بهبود و تقویت سیستم ایمنی لنفوسیتی

افزایش و بهبود تقویت سیستم ایمنی به کمک افزایش اثرات سیستم دفاعی فاگوسیتی

پلاکت خون پایین (آنمی)

در کم خونی، گلبولهای قرمز یا هموگلوبین ها ضیف هستند یا تعداد آنها کم شده است.

اعلام میکنیم برای؛ افزایش گلبولهای قرمز و یا ترمیم آنها

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

(برای مردان: 4.7 تا 6.1 میلیون گلبول قرمز در هر میکرولیتر - برای زنان: 4.2 تا 5.4 میلیون گلبول قرمز در هر میکرولیتر)

پلی سیتمی ورا

(برای بیماری با سابقه پلی سیتمی ورا که تبدیل به میلوفیبروز شده در کدام ناحیه باید کار کرد)

اعلام میکنیم برای؛ پلی سیتمی ورا بهبود عملکرد مغز استخوانها برای تولید نرمال سلولهای خونی و بهبود عملکرد کبد و طحال و کلیه ها برای دفع مواد و سلولهای ناکارامد

ایجاد وقفه در رشد مثلا در سن 15 سالگی برای خانم

اگر خانوم 15 ساله و بالغ شده باشه و پریودهای منظم داشته باشه میتونیم ذهن اشتراکی اعلام کنیم برای؛

تنظیم غدد بدن + افزایش رشد اپی فیز استخوانها (که شامل افزایش جذب املاحی مثل روی- کلسیم- منیزیوم و ویتامین D3 است)

برای افزایش قد پسر 13 ساله

اعلام میکنیم برای؛ افزایش ترشح هورمون رشد سوماتروپین از هیپوفیز قدامی

تاخیر در بسته شدن صفحه های رشد استخوانی در اندام ها

تبخال

بیماری تبخال به وسیله یکی از اعضای خانواده ویروسی هرپس ایجاد می‌شود. ویروس تبخال لب HSV۱ نام دارد، ویروس تبخال در بدن باقی مانده و به طرف عقده‌های عصبی حرکت می‌کند. سپس ویروس در سلولهای عصبی مستقر شده و اگر شرایط مناسب شود مجددا فعالیت خود را اینبار به شکلی خفیف‌تر از حالت اولیه ادامه می‌دهد. از اینجا به بعد است که زخم تبخال معروف بروز می‌کند.

اعلام میکنیم برای؛ تقویت و افزایش گلبولهای سفید خون در حد نرمال برای مبارزه با ویروسها

پای فیلی

برای پای فیلی بیش از ده مورد بیماری هست که اگر بدون اطلاع بخواهیم اعلام کنیم کلی ذهن اشتراکی میشه. برای اینطور موارد؛

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد تمام ارگانهای بدن مثل کلیه ها، قلب، کبد، سیستم درناژ و تخلیه لنف و خون و برطرف شدن عفونت احتمالی

کاهش آسیب پذیری اندام به سیستم ایمنی بدن (در صورت وجود بیماری خود ایمنی)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

بیماری ALS

(بیماری من ALS هست تمام بدنم فلج شده این پیام رو هم دخترم مینویسه چون حتی زبانم فلج شده هیچ ارتباطی نمیتونم با محیط اطرافم برقرار کنم از نظر تنفس هم مشکل دارم)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سلولهای عصبی و بهبود انتقال پیامهای عصبی از اندام به مغز و بالعکس

ترشح هورمون رشد

(برای ترشح هورمون رشد به کدوم قسمت مغز باید ذهن اشتراکی اعلام کنیم؟ یه مدته پشت چشمم حالت اسکن حس میکنم تو ارتباط بهم اومد برای ترشح هورمون رشد در اون قسمت کار میشه پشت چشم ها در داخل سر کدوم قسمت مغز قرار داره و کارش چیه؟ فاصله بین دو چشم)

ترشح هورمون رشد بعد از بلوغ باعث ناهماهنگی رشد میشه، در واقع باید سن و قد فرد باشه که بتونیم إظهار نظر کنیم

کشیدگی و تورم رباط مچ پا و پشت پا

برای بهبود ادم والتهاب رباط پشت پا اعلام میکنیم برای؛

مهار تولید واسطه های التهابی مانند پروستاگلاندین ها

مهار آنزیم سیکلواکسیژناز و سایتوکاین ها

بهبود و ترمیم سلولهای آسیب دیده

کشیدگی تاندون کشاله ران

اعلام میکنیم برای؛ ترشح استروییدها و توقف مسیر التهاب زایی در التهاب تاندون ایلیوپسواس(کشاله ران)

کشیدگی تاندون قوزک خارجی پا

برای قوزک خارجی پا ناشی از پیچ خوردگی ها اتفاق میفتد اعلام میکینم برای؛

ترمیم رباط های خارج مچ پا، کاهش التهاب، و ترمیم عروق و اعصاب قسمت خارجی پا

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

آب آوردن ریه

(برای ریه که آب آورده و عفونت داره و توده ی مشکوک، ذهن اشتراکی چطور کار کنیم؟)

علتهای مختلفی مانند مشکلات قلبی، سرطان ها، عفونتهای مزمن ریوی دارد و با توجه به علت بروز می توان برای بیماری مورد نظر اعلام کرد

واسه آب ریه به همراه عفونت که ممکنه مایع ریه ترانسودا یا اگزودا باشد همان دستورات عفونت و تومور + بهبود عملکرد قلب و کلیه و کبد

نارسایی قلبی و مغزی

(برای خانم 64 ساله بعد از آزمایشات کلونوسکوپی و آندوسکوپی: زخم اثناعشر عمیق وکهنه، نارسایی قلبی (دریچه های آئورت، میترال، ...) و نارسایی مغزی، آرتروز کل بدن + درست کردن استخوان در آرنج های دست، سنگ کیسه صفرا و چرب بودن کبد و بزرگ شدن آن و فشار خون بالا، لطفا با توجه به نظر اساتید، راهنمایی بفرمایید چگونه ذهن اشتراکی را بیان کنم)

اعلام میکنیم برای؛ افزایش قدرت سیستم ایمنی + بهبود عملکرد تمام اعضاء بدن + افزایش ترشح اینترفرون

منتژیومای داخل سینوس کاورنو

(مدت پنج سال پیش مبتلا به تومور منتژیومای داخل سینوس کاورنوس و تحت معالجه از طریق گامانایف قرار گرفتم حالا این تومور باعث بیماری تریژمینال سمت چپ صورتم شده حالا ذهن اشتراکی را از کدام ناحیه میتوانم انجام دهم)

برای منتژیومای داخل سینوس کاورنو ذهن اشتراکی را برای هر دو طرف اعلام کنید

تیرویید

(خانمی 56 ساله که سال قبل تیرویید سمت راستشون را برداشتن و حالا صداشون به سختی بیرون میاد و صداشون خش دار شده و در ضمن پزشک تشخیص دادن که در گردنشون لخته خون هست که براشون نمیشه کاری انجام داد و دارو لووتروکسین و ویتامینD مصرف میکنن)

در مورد اون خانومی که سمت راست تیرویید رو برداشتند باید سریعا به جراح مراجعه کنن و MRI رو انجام بدن ببینیم تشخیص چیه.

تخریب سلول های پانکراس

اعلام میکنیم برای؛ توقف روند تخریب سلول های پانکراس و افزایش بازسازی مجدد توسط سلول های پانکراس

ضربه مغزی

(بچه یی سه ساله که در اثر تصادف ضربه مغزی شده است، در ضمن چشمهایش نابینا و دست و پای راستش هم بی حرکت است)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد مغز

تخلیه ترشحات و رفع فشار از روی مراکز اصلی علائم حیاتی مثل تنفس و قلب

رفع فشار از روی کیاسمای اپتیک در وسط مغز جهت پردازش اطلاعات بینایی

فلج هیستریک

بیماری فلج هیستریک کاملا زمینه روانی داره. میتونه بیمار اسکیزو فرن باشه. خیلی از اختلالات عصبی میتونه به دلیل پایه استرس و اضطراب های دایمی ش فرد رو تو برخی شرایط برای فرار از بحران های روحی غیر قابل تحملش مجبور کنه که فرد رو به حالت هیستریک ببره. فرد هیستریک با زمینه بیماریهای اضطرابی و فرد اسکیزو فرن میتونه این حالت فلج را داشته باشه که بدون اختیار برای فرد ایجاد میشه. برای این فرد اینجور اعلام میکنیم...

بهبود فرایندهای فکری و توانایی پاسخگویی های عاطفی به شرایط اظطرابی....

بهبود عملکرد نورونهای مغزی در ناحیه پری فرونتال در بهبود فرایندهای رفتاری و اجتماعی....

بهبود عملکرد ترشح دوپامین از هسته سیاه...

بهبود و تنظیم ترشح سرتونین از هسته های رافه برای بالابردن خلق...

بهبود ادراک و تفکر

سندروم داون در کودکان

اعلام میکنم برای؛ کاهش فعالیت تک کروموزوم اضافه در تمام سلول های بدن و عدم مداخله در فرایند سلولی

بهبود عملکرد شعور سلولی به سمت عملکرد صحیحی که مربوط به انسان است

تومور شوانوما

(برای تومور شوانوما که تو عمل اعصاب 7 صورت (سمت چپ) آسیب دیده و دهنش وا نمیشه و غذا رو نمیتونه بجوه یا با زبونش بچرخونه، چشم سمت چپش وا میمونه و کامل نمیتونه بچرخونه. به کجا تخصصی ارتباط بدیم زود جواب میگیره؟!)

در مورد تومور شوانوما که در مورد این شخص سوال کردند باید بگویم

عصب فشیال یا عصب شماره ۷ وقتی که از داخل جمجمه بیرون می آید از سوراخ گوش داخلی رد می شود می آید داخل گانگلیونی به نام گانگلیون ژنیکولیت؛ از اینجا پایین می آید از بغل استخوان ماستوئید رد می شود و از سوراخ استیلو ماستوئید بیرون می آیداگر شخصی، عصب فیشالش از بالا که به پایین می آید و از سوراخ گوش داخلی رد می شود، در این منطقه؛ یعنی قبل از اینکه به گانگلیون ژنیکولیت برسد؛ دچار آسیب شود، علامت هایی که در سوال مطرح شده اتفاق می افتد!

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

در این مورد باید ذهن اشتراکی را برای بهبود عملکرد و برگشت عملکرد نرمال عصب فشیال در آسیبی که در آن منطقه دیده، یعنی منطقه ای که عصب فشیال (عصب۷) از جمجمه بیرون آمده و دارد وارد سوراخ داخلی گوش داخلی می شود؛ ما بهبود عملکرد را وقتی اعلام کردیم کمک می کند هم مشکلات چشمی و هم جویدن و دیگر موارد برطرف شود.

تومور مغزی

تومورهای مغزی وقتی ایجاد میشن به خاطر اینکه فضای داخل جمجمه ظرفیت پذیری محدودی داره باعث ایجاد فشار بر روی بافت نرم مغز میکنه. پرده یی روی بافت مغزی قرار داره که حافظ و حایل مغزی هست بنام مننژ، روی این ناحیه میتونه تومورهایی بنام مننژیوما به صورت خوش خیم ایجاد بشه، که علی رغم خوش خیم بودن در صورت عود مکرر میتونه باعث ایجاد ادم و التهاب در ناحیه مننژ و بافت مغزی بشه. گامانایف جلوگیری میکنه از پیشرفت و عود مجدد بیماری چه جراحی بشه و چه جراحی نشه،

اعلام میکنیم برای؛ محدود شدن رشد تومور مننژیوم با کنترل خونرسانی به سلولهای بافت توموری..

ایجاد لایه محافظ برای جلوگیری از پیشرفت و انتشار سلولهای تومور به نواحی مجاور...

کاهش التهاب و تورم پرده مننژ مغز و برداشته شدن ادم و فشار از روی بافتها درگیر در ناحیه تومور..

برداشته شدن فشار و تورم عصب گوش چپ و بهبود عملکرد سلولهای مرکز شنوایی در ناحیه گیجگاهی چپ..

برای دردش هم، بالا رفتن آستانه درد در نورون های درگیر...

تضعیف حافظه در اثر آلاینده های هوایی

آلاینده های هوایی عوارض زیادی دارند و امروزه یکی از مهم ترین عوارضشون که مورد بحثه اثر روی حافظه و بیماریهایی مثل آلزایمر و دمنشیا و آمنزیا یا فراموشی هست. در واقع آلاینده های هوایی تولید عاملهای اکسیدانی می کنند مثل اکسید نیتریک و اکسید سولفور و مونوکسید کربن و سرب، تمامی مواد هم اکسید کننده سلولی اند و هم روی بافتهای نرم مثل ریه و بافتهای سختی مثل استخوان اثرات تخریبی دارند، برای اختلالات حافظه ناشی از آلاینده ها میتونیم مصرف مواد غذایی آنتی اکسیدانی رو بیشتر استفاده کنیم ...

میتونیم به صورت کمکی به این شکل اعلام کنیم برای؛

برداشتن عاملهای اکسیدانی به کمک فرایندهای دتوکسی فای یا بی اثر کردن تاثیرات مخرب شان...

برداشتن Ros فعال به کمک افزایش فعالیت آنزیم SOD

بازسازی نورون های تخریب شده در منطقه هایپو کمپ مغز...

افزایش فعالیت و ترشح استیل کولین در ناحیه هایپوکمپ مغز برای کمک به بهبود حافظه

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

عفونت ریوی

(با توجه به این آزمایش .... دکتر گفته اگر آنتی‌بیوتیک اثر نکنه یعنی برگشت سرطان، الان یه هفته گذشته و بهتر نشده است)

گزارش ارسالی مشخص کننده ی بدخیمی نمی باشد. در صورتی که فرد بدخیمی اولیه (سابقه کانسر) داشته باشد می تواند مطرح کننده احتمالی متاستاز ریوی باشد که تشخیص قطعی با برونکو سکوپی و نمونه برداری از ضایعه یا مواد ساکشن شده ترشحی می باشد.

فعلا می توانیم برای مورد مذکور برای عفونت ریوی اعلا کنیم:

اعلام میکنیم برای حذف عامل عفونی باکتریایی و ویروسی و همچنین برای افزایش ترشح فاکتورهای ضدالتهابی برای رفع التهاب برونش ها و کاهش ترشح مخاط و جذب مایع ترشحی در ناحیه

عفونت ریوی کودکان

اعلام میکنیم برای؛ حذف عامل عفونی ویروسی و یا باکتریایی و همچنین افزایش سطح ایمنی برای مقابله با بیماری

پارگی شدید روده

اعلام می کنیم برای؛ ترمیم بافت همبند و مخاط و زیر مخاط (لنف و عروق) و شبکه عصبی روده یی

عفونت روده یی نوزدان

عفونت روده ای نوزدان میتواند بعلت عوامل متعددی ایجاد شود حتی بدنبال بیماریهای ویروسی و سرماخوردگی ها. شایع ترین علت، ابتلا به روتاویروس ها است. اعلام میکنیم برای؛

تخریب و حذف عامل ویروسی و باکتریایی

تخریب دیواره ویروس و افزایش قدرت سیستم ایمنی

انواع هپاتیت ها

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سلولهای کبدی

افزایش فعالیت سیستم دفاعی و تقویت سیستم ایمنی بدن

هپاتیت اتوایمیون

اعلام میکنیم برای؛ حذف فعالیت سیستم اتوایمیون شامل اتوآنتی بادی های

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

کاهش سطح گاماگلوبین های سرمی

بلاک فعالیت سیگنالینگ مرتبط با نکروز سلولی در سلولهای کبدی

عدم تمرکز در یادگیری و داشتن حافظه ضعیف در کودکان

اعلام میکنیم برای؛ بخش هیپوکامپ، پرفرونتا و کل نواحی که تو یادگیری و پردازش اطلاعات اثر دارن

غده هیپوفیز

(برای دختر هشت ساله ای که غده هیپوفیز نداره و هر روز باید هورمون تزریق کنه)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سلولهای تمام قسمتهای هیپوفیز

تب مالت

اعلام میکنیم برای؛ افزایش ایمنی سلولی بدن

شامل افزایش اینترفرون گاما اینترلوکین ده

ایجاد لخته خون ناشی از سکته قلبی

(مردی43 ساله هستم، چند سال پیش سکته قلبی کردم بخاطر لخته زدن خون همچنین چربی خون، 9 تا استنت گذاشتند البته تو چند مرحله، که یه بار هم دو تا از استنتهام گرفته بود جدیدا هم آزمایش رفتم که پروتئینc چهارتا از حداقل کم بود، ضمنا بیماری شبکیه چشم هم دارم که آب آورده البته چند سال بعد از سکته،خودم هم ترم6 هستم و ارتباطها را هم مرتب میرم البته آسپرین آتوروواستاتین هم میخورم. ضمنا دو بار هم زالودرمانی رفتم)

اعلام میکنیم برای؛ برای حذف و جلوگیری از تشکیل مجدد لخته خون....

غیر فعال شدن مسیرهای مرتبط با تبدیل فیبرینوژن به فیبرین و جلوگیری از تجمع پلاکتها و ترشح فاکتورهای انعقادی

افزایش سطح پروتین سی و ویتامین کا جهت مهار روند انعقاد

آب آوردن شبکیه چشم: اعلام میکنیم برای؛ افزایش ترشح پلاسمین در جهت لیز و برداشته شدن لخته خون و پلاکهای عروقی

اسکلرودرمی

(بیماری اسکلودرما داره و ریه درگیر شده و دکترش میگه چسبندگی ریه داره و فشار ریه بالا رفته)

اعلام میکنیم برای؛ کاهش و کنترل سنتز کلاژن در بافتها و عروق

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

حذف فعالیت سیستم اتوایمیون در جهت کنترل فعالیتهای ضد بافتی

از بین رفتن روند فعال شدن فراینید آپپتوز در سلولهای بافت همبند و عروق

حذف فعالیت و ترشح آنتی بادی های ضد آندوتلیوم عروقی

تحلیل بافت ریه

بیماریهای انسدادی مزمن ریه و فیروز ریوی می تواند باعث تخریب بافت ریه و مجاری ریوی گردد...

اعلام میکنیم برای؛ افزایش سطح فاکتورهای ضد التهابی و کورتیکو استرویییدها در جهت بهبود و ترمیم بافت پارانشیم ریه

افزایش و تقویت سطح ایمنی سلولی ایمنی هومورال

افزایش فعالیت ماکروفاژها، لنفوسیت های بی و تی

افزایش ترشح پادتن برای حذف عامل عفونی بیماری زا

باکتری کلبسیلا در واژن

باکتری کلبسیلا klebsiella بعنوان یک فلور طبیعی در دهان و سیستم گوارشی دیده می شود، ولی می تواند رفتارهای پاتوژنز یا بیماری زا هم داشته باشد و بیماریهای مانند پنومونی، عفونتی ادراری، واژنیت یا التهاب واژن، مننژیت و حتی اسهال ایجاد کند.

افزایش فعالیت سسیتم دفاعی ضد میکروبی در بدن شامل نوتروفیلها، لنفوسیتها و مونوسیتها در جهت بیگانه خوری و حذف عوامل

افزایش فعالیت سیستم ایمنی هومورال و ترشح پادتن ها بر علیه عوامل میکروبی

هیدروسفالی

اعلام میکنیم برای؛ کاهش ترشح و تولید مایع CSF توسط شبکه کورویید و افزایش سرعت بازجذب مایع تولید شده

رفع انسداد در مسیر گردش مایع CSF و به خصوص ترمیم و رفع انسداد در مجرای سیلویوس

کاهش فشار و ادم ناشی از تجمع و تولید بیش از اندازه مایع مغزی نخاعی

بهبود و افزایش روند جذب نیوترنتها از سیستم گوارشی + کاهش تهوع و استفراغ

فشار مغزی بالا

برای فشار خون داخل جمجمه ای یا ICP اعلام میکنیم برای؛

تعادل بین تولید مایع csf یا مغزی نخاعی و جذب در وریدهای سینوسی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

رفع انسداد در مسیر سیرکولاسیون مایع مغزی نخاعی

تنظیم ترشح مایع مغزی نخاعی از شبکه کورویید

رفع انسداد و یا اختلال در جذب مایع

تنظیم قطر عروق مغزی و فشار خون سیستمیک

فشار مغزی بالا و ایجاد نابینایی

(فردی به واسطه بالا رفتن مایع نخاع که به مرور باعث کم بینی و در نهایت نابینایی کامل شده و همچنان با شنت مایع نخاعش کنترل میشه)

اعلام می کنیم برای؛ تعادل بین تولید مایع csf یا مغزی نخاعی و جذب در وریدهای سینوسی و رفع انسداد در مسیر سیرکولاسیون مایع مغزی نخاعی و همچنین، بازسازی سلولهای استوانه ای، مخروطی و سلولهای بینابینی شبکیه و عصب بینایی تخریب شده از فشار داخل جمجمه ای بالا

ضخامت پشت گردن جنین

(در آزمایش غربالگری ضخامت پشت گردن جنین خیلی بالاست (7/6 میلی متر) و ضربان قلبش نرمال نیست)

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ساختاری ناهنجاری کروموزومی مربوط به کروموزم های 21 و 18 و 13

اصلاح ساختار ژنهای مرتبط با کروموزم های احتمالی جهش یافته

چربی خون ارثی و غیر ارثی

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ترشح اسید های صفراوی در جهت هضم و جذب صحیح چربی ها

تنظیم عملکرد ترانسپورتهای انتقال دهنده چربی ها به داخل سلولها

کاهش تبدیل گلوگز به چربی توسط انسولین و اصلاح ساختار ژن معیوب مرتبط

بیماری sma

(بیماری sma که بدن پروتیین تولید نمی کند و عضلات کم کم تبدیل به چربی می شوند)

بیماری sma فرم های حاد و خفیف دارد که با توجه نوع اعلامی فرم خفیف با سیر پیشرونده مطرح است.

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ساختاری ژن معیوبsmn1

بهبود و ترمیم دژنراسیون نورونهای شاخ قدامی نخاع

افزایش قدرت انقباضی عضلات چهار اندام، بهبود رفلکس های نخاعی و بهبود عملکرد عضلات درگیر در تنفس

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

سالک

برای سالک، برای سلولهای سیستم دفاعی بدن شامل ماکروفاژها و سلولهای فاگوسیت کننده اعلام میکنیم،

و همچنین؛ بلاک شدن تکثیر سلولی انگلها در داخل سلولهای بیگانه خوار

برای زخم سالک افزایش خونرسانی به ناحیه آسیب دیده و تکثیر سلولهای فیبروبلاست، اپیدرمال و ساخت کلاژن جهت ترمیم زخم

سارکوییدوز

سارکوییدوز بیماری التهابی مزمن هست که در طی بیماری ندولهای گرانولومی در بسیاری از بافتهای بدن تشکیل می شود و در عملکرد طبیعی ارگان مبتلا اختلال ایجاد می کند. این بیماری معمولا منتشره بود و چند اندام را مانند ریه ها، قلب، کلیه، کبد، طحال، غددلنفوی، مفاصل و مغز را درگیر می کند. برای ذهن اشتراکی به این شکل میتوانیم اعلام کنیم....

اعلام میکنیم برای؛ کاهش فعالیت و واکنش سیستم ایمنی بدن شامل لنفوسیت های تی، اینترلوکین هاTNF .آلفا به عوامل مهاجم محیطی

کاهش تشکیل گرانولوم در پاسخ سیستم ایمنی به فعال شدن انتی بادی ها علیه عامل آنتی ژن شناخته شده

اصلاح ساختاری ژن مرتبط با تسهیل تشکیل گرانولوم در پاسخ به ریسک فاکتور محیطی

کولیت مقعد

اعلام میکنیم برای؛ کاهش التهاب بافت کولون به واسطه ی ترشح فاکتورهای ضد التهابی پروستاگلاندین ها، لوکوترین ها و سیکلواکسیژناز

کاهش فعالیت تحریکی سیستم کولینرژیک و فعالیت شبکه مزانتریک روده ای

درد صورت ناشی از عصب سه قلو

اعلام میکنیم برای؛ میلینیشن و رفع فشار عروقی وارده بر عصب سه قلو وگانگلیون آن

آزاد سازی فاکتورهای ضد دردی ازماده خاکستری اطراف قنات سیلویوس در جهت کاهش درد و تورم گانگلیون

عفونت شدید هر دو پا و خشکی و انسداد عروق آن

در کل وقتی خونرسانی شریانی به اندام یا بافتی در اثر انسدادهای عروقی دچار کاهش بشود مسیرهایی در سلول فعال می شود که منجر به بروز نکروز یا تخریب بافتی میشود.

اعلام میکنیم برای؛ رفع انسداد عروقی و افزایش خونرسانی اندام های مبتلا بواسطه ترشح فاکتورهای

گشاد کننده عروق از اندوتلیوم دیواره عروق

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

غیر فعال شدن مسیر نکرز بافتی بواسطه بلاک ترشح فاکتورهای پیش نکروزی

ترمیم سلولی و بازسازی سلولی ناحیه تخریب شده

آنفولانزای جدید

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد تمام سلول های بدن و نیز تقویت کلی سیستم ایمنی و دفاعی بدن

افزایش قدرت سیستم دفاعی بصورت چند وجهی برای شناسایی، ساختن پادتن مناسب و مقابله با انواع میکروبهای مشابه یا ویروسهایی که به سرعت تغییر ماهیت می دهند

اورمی یا افزایش اسید اوره خون

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم بافت گلومرولی نفرونهای کلیوی

بهبود ترشح و تخلیه اوره از خلال سلولهای توبولهای کلیوی

اوره

(برای پایین اومدن اوره ذهن اشترکی چطور اعلام کنیم، و دستور غذایی لطفا)

در مورد پایین آمدن اوره پرسیده بودید .

در متابولیسم اسید اوریک در بدن یک سری اتفاقات می افتد. وقتی در اوره و اسید اوریک مشکل پیدا می کنیم، دو کار اساسی باید انجام دهیم.

یک سری اتفاقات می افتد که باید درخواست کنیم؛ افزایش دفع اسید اوریک را از بدن داشته باشیم.

یک سری بیماری ها هستند مثل کم کاری تیروئید و یا مصرف برخی از داروها، که این ها باعث می شوند اسید اوریک کم از بدن دفع شود و این برای ما مضر هست. پس در ذهن اشتراکی یکی اعلام می کنیم افرایش دفع اسید اوریک داشته باشیم و اگر بیماری یا مشکلی باعث کاهش دفع شده باشد؛ مثلا اگر کم کاری تیروئید وجود دارد، کم کاری برطرف شود.

برای کم کاری و برای بهبود عملکرد بدن هم اعلام می کنیم.

پس ما اولین کاری که می کنیم؛ اولین ذهن اشتراکی که اعلام می کنیم، افزایش دفع اسید اوریک از بدن هست .

۲ -افزایش دفع ادراری اسید اوریک - رژیم غذایی عدم مصرف الکل- عدم مصرف ماهی کولی - عدم مصرف جگر دل قلوه و اسفناج

فلج بلز یا فلج عصب صورت

(فلج سمت راست صورت و چسبندگی عصب چشم با دهان)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

فلج بلز، فلج عصب هفتم صورت است؛ عصبی که به عضلات صورت فرمان می‌دهد. در نتیجه اگر این عصب فلج شود، عضلات صورت قدرت حرکت را از دست خواهند داد. از عوارض عدم درمان به موقع و فلج بلز شدید، آسیب بازگشت ناپذیر به عصب فاشیال یا صورتی هست. رشد مجدد عصب یا رژنراسیون عصبی در مسیر نادرست باعث انقباضات ناخواسته و غیرارادی در عضلات مشخص میشود. اعصاب همانطور که بازسازی میشوند می توانند دژنراسیون یا تخریب هم داشته باشند، از نظر علم پزشکی با تمرینات بیوفیدبک میتوان کنترل مغزی را بر روی عضلات درگیر بیشتر کرد و به صورت کمکی ذهن اشتراکی را اعلام میکنیم برای؛

افزایش سطح ایمنی بدن در جهت مهار و حذف عامل ویروسی

افزایش ترشح کورتیکو استرویدها از غده فوق کلیوی در جهت برگشت و بهبود فلج عصب زوج هفت

فعال شدن مسیر تخریب آکسونال عصب فاشیال

رژنراسیون و بازسازی صحیح مسیر رشد آکسونی..

افزایش قدرت انقباضی عضلات درگیر ناحیه

عدم تعادل و حالت فلج داشتن عصب هفت و هشت سمت چپ صورت

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم عصب تخریب شده بواسطه افزایش فعالیت نوروژنز

افزایش ترشح فاکتورهای رشد عصبی شاملNGF وBDNF

ناخن فرو رفته در گوشت

افزایش ترشح فاکتورهای ضدالتهابی در جهت کاهش التهاب و درد موضعی

ترمیم و بازسازی بستر ناخن آسیب دیده برای رویش مجدد ناخن

جوش آکنه

اعلام میکنیم برای؛ کاهش و کنترل تولید سلولهای چربی از فولیکولهای مو

اصلاح روند شاخی شدن سلولهای سطحی اپیدرم

تنظیم سطح هورمونهای جنسی استروژن و پروژسترون و به خصوص آندروژن

کنترل سطح کلسیم پلاسما بدنبال برداشتن غده پارتیرویید

اعلام میکنیم برای؛ برقراری بالانس کلسیم در پلاسمای خون، شامل:

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

مهار برداشت کلسیم از سلولهای بافت استخوانی و کاهش جذب کلسیم روده ای

مهار سیستم سیگنالینگ سلولی مرتبط با رسوب یونهای کلسیم در عضلات و اندام ها و استخوانها

آرتریت روماتویید

اعلام میکنیم برای؛ متوقف شدن فعالیت سیستم خود ایمنی شامل سیستم ایمنی سلولی و ایمنی هومورال

ترشح و آزاد سازی فاکتورهای ضدالتهابی در جهت کنترل درد و تورم

درد دنبالچه

درد دنبالچه میتواند به دو علت باشد: التهاب دنبالچه - کیست پایلونیدال

برای التهاب دنبالچه اعلام میکنیم؛ کاهش فعالیت سیستم التهابی شامل پروستاگلاندین ها و لوکوترین ها

برای کیست پایلونیدال که اعلام میکنیم؛ شروع فرایند آپپتوز یا مرگ سلولی در ناحیه توده ایجاد شده و همچنین حذف عامل عفونی بواسطه فعالیت سیستم التهابی

هیدرادنیت چرکی

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم ترشحات غدد اپوکرین + باز شدن مجاری غدد

تومور GBM بدخیم

مشابه تومورهای مغزی اعلام میکنیم

بیماری پِرتس

برای بیماری perthes به این شکل اعلام میکنیم...

افزایش خونرسانی و سیرکولاسیون خون در عروق سر استخوان فمور..

افزایش فعالیت سلولهای استوسیت و استحکام داربست استخوانی سر استخوان فمور و همچنین بهبود جذب کلسیم از سیستم گوارشی

تورم مغز

اعلام میکنیم برای؛ متوقف شدن مسیرهای مرتبط با شروع ادم مغزی شامل آزادسازی گلوتامات

تغییر فعالیت پمپ سدیم پتاسیم و کلیه کانالهای یونی و آزادسازی رادیکالهای آزاد

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

همچنین بهبود خونرسانی به مویرگهای مغزی و از بین رفتن هایپوکسی سلولی متعاقب ترومای مغزی

نقرس

ذهن اشتراکی برای عفونت و التهاب مفصل مربوطه

کاهش تولید اسید اوریک خون

افزایش دفع اوره از ادرار

کاهش سطح گلبول های سفید خون (برای بیماری که تا 16000 واحد افزایش داره)

افزایش گلبول سفید علل مختلفی داره مثل عفونت التهاب، علتش باید مشخص باشه

متاکروماتیک لوکودیسترفی مخففش mld

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن + اصلاح مسیر متابولیسم چربی + بازسازی میلین اعصاب

افتادگی مثانه

اعلام میکنیم برای؛ افزایش ترشح استروژن و افزایش قدرت عضلات نگهدارنده مثانه در لگن

بیماری ریه تراکئو برانکو پاتیا استوکندری پلاستیک

عکس از ریپورت پاتولوژی در برونکوسکوپی یا گزارش سی تی اسکن ریه و گرافی قفسه صدری مورد نیاز است

سردی بیش از حد ناحیه انتهایی اندامها

سردی بیش از حد ناحیه انتهایی اندامها (مچ تا انگشتان دست و پا) می تواند به علل مختلفی شامل تنگی عروق انتهایی، اختلالات سیستم ایمنی، کم کاری تیروییید، کم خونی، کمبود ویتامین ها، برخی داروها، کاهش فشار خون و حتی استرس و اضطراب ایجاد شود. علت باید مشخص گردد

آتروفی بطن مغز

آتروفی بطن سوم و یا بطن های مغزی به علل بیماریهای متعدد و موارد ژنتیکی نوزادان و حتی کهولت سن ایجاد شود.

برای اعلام ذهن اشتراکی سن بیمار و نوع بیماری زمینه ای باید مشخص گردد

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

کیست ایوزینوفیلیک گرانولوما

(کیست ایوزینوفیلیک گرانولوما در فمور پای چپ در خانم ۲۴ ساله)

اعلام میکنیم برای؛ شروع فرایند آپپتوز سلولی در سلولهای بدخیم ناحیه هیپوفیز

ترمیم سلولهای ترشح کننده هورمون آنتی دیورتیک (ضد ادراری) از بخش خلفی هیپوفیز

تخریب بخش خلفی هیپوفیز(نورهیپوفیز)بعلت متاستاز و کمبود ترشح هورمون ضد ادراری

عفونت شدید ریه

(عفونت شدید ریه و صدمه دیدن ریه باز شدن راه تنفس)

اعلام میکنیم برای؛ حذف عامل عفونی باکتریایی و ویروسی

افزایش ترشح فاکتورهای ضدالتهابی برای رفع التهاب برونش ها و کاهش ترشح مخاط

بیماری ریتینید پیگمانتر

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ساختار ژن معیوب و دخیل در بیماری و بازسازی سلولهای تخریب شده شبکیه در ناحیه ماکولا

برای بالا رفتن گلبول سفید شخصی که داره شیمی درمانی میشه

اعلام میکنیم برای؛ افزایش فعالیت پیش سازهای لوکوسیتی در مغز استخوان نواحی خون ساز مثل استخوان استرنوم یا جناغ سینه و ناحیه فمور یا ران و لگن

ایکتیوز

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن معیوب دخیل در بیماری و ترمیم لایه گرانولار و اصلاح آتروفی اپیدرم و درم پاپیلار

تنگی نای به خاطر تراکستومی

اعلام میکنیم برای، حذف بافت همبند فیبروتیک تشکیل شده بدنبال ترومای ناحیه تراشه

و بهبود خونرسانی عروقی جهت ترمیم بافت آسیب دیده

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

تعریق کف دست و پا

اعلام میکنیم برای؛ کاهش و کنترل فعالیت سیستم سمپاتیک و تنظیم ترشح آدرنالین از بخش مرکزی غده فوق کلیوی

بیماری نیمان پیک سی

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن معیوب مرتبط با بیماری و اصلاح متابولیسم اسفنگولیپیدها

گل مژه

اعلام میکنیم برای؛ حذف عامل عفونی باکتریایی در قاعده مژه

فعالیت سیستم ضدالتهابی در جهت کاهش التهاب در غدد چربی ناحیه درگیر

سرفه های شدید و طولانی مدت ناشی از مصرف اسید برای باز کردن لوله ها

اعلام میکنیم برای؛ کاهش ترشح هیستامین و اینترلوکین از ماست سل ها و افزایش ترشح کورتیکواستروییدها

التهاب تیروییید

اعلام میکنیم برای؛ افزایش سطح ایمنی سلولی و هومورال در جهت کاهش التهاب و حذف عامل عفونی باکتریایی و ویروسی دخیل

آلرژی فصلی

اعلام میکنیم برای؛ کاهش آزادسازی هیستامین و اینترلوکین از ماست سل ها

لوپوس

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح شناسایی سلولهای بدن توسط سیستم دفاعی بدن و بلاک تولید اتوآنتی بادی ها علیه سلولها و افزایش ترشح کورتیکواستریییدها

التهاب گره های لنفاوی بدنبال عفونت

اعلام میکنیم برای؛ حذف عامل عفونی باکتریایی یا ویروسی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

مهار آنزیم سیکلواکسیژناز در جهت مهار پروسه التهاب

افزایش ترشح کورتیکواستروییدها از غده فوق کلیوی در جهت کاهش التهاب

اصلاح وضعیت سلولهای لنفاوی

بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن

بیماری هایپرموبیلیتی

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن معیوب دخیل در بیماری و استحکام بافت همبند

بیماران کمایی

برای بیمار کمایی علت کما باید مشخص شود

کما در اثر مننژیت

اعلام میکنیم برای؛ حذف عامل عفونی و یا ویروسی بر روی پرده های مننژ و فعالیت مسیر ضدالتهابی برای رفع ادم ناحیه مننژ و بافت مغزی

کما در اثر ضربه مغزی

کاهش التهاب و ادم ناشی از تروما در بافت مغزی به واسطه ترشح فاکتورهای ضد التهابی

افزایش جذب مایع میان بافتی و کنترل خونریزی از عروق به واسطه ترشح فیبرینوژن

فعالیت و ترمیم تشکیلات مشبک و ارتباطات نواحی کورتکس مغزی

خلط پشت حلق بخاطر حساسیت

معادل آلرژی فصلی اعلام میکنیم برای؛ کاهش آزادسازی هیستامین و اینترلوکین از ماست سل ها

از بین رفتن مایع دور جنین

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم پرده های جنینی و بهبود خونرسانی جفت، غشاآمنیوتیک، بند ناف و کلیه های جنین

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

بیماری میاستنی گراویس

بیماری میاستنی گراویس Myasthenia Gravis یک بیماری خودایمنی مزمن عصبی - عضلانی می باشد که در اثر نقص در انتقال پیام اعصاب به عضلات، رخ می دهد. هنگامی که ارتباط طبیعی بین عصب و عضله قطع می شود، این بیماری بروز می کند. پیام های عصبی در طول عصب حرکت می کنند تا به عضله برسند. فیبرهای عصبی به فیبرهای عضلانی متصل نیست. فضای ما بین این دو را ماده انتقال دهنده عصبی-عضلانی به نام استیل کولین پر کرده است. استیل کولین در طول اتصال عصبی- عضلانی حرکت می کند و به گیرنده های استیل کولین متصل می شود. در بیشتر بیماران مبتلا به میاستنی گراویس، گیرنده های استیل کولین در محل اتصال عصبی-عضلانی تخریب می شوند و جلوگیری از انقباض عضلانی می کنند. اگر چه ممکن است این بیماری بر هر عضله یی اثر کند، اما عضلاتی که کنترل چشم را بر عهده دارند و موجب حرکت پلک می شوند و عضلات صورت و همچنین عضلات بلع بیشتر تحت تاثیر این بیماری قرار دارند.

اعلام میکنیم برای؛ حذف فعالیت ایمنی بر ضد رسپتورهای استیل کولین در سیناپس های عصبی عضلانی

عدم تخلیه مدفوع

(مادرم در هشت سال پیش دو تا دیسک کمر عمل کرد موقعی عمل کرد که کار بجای باریک رسیده بود یعنی بی اختیاری ادرار ...، بعد از عمل فهمیدیم که عمل دفع رو نمیتونه انجام بده و مدفوع جمع میشه دم مخرج ولی خارج نمیشه و ایشان مجبورند که با دست عمل تخلیه رو انجام بدند. شرایط مادرم هنوز بعد از هشت سال همینطوره)

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم اعصاب پاراسمپاتیک شاخه لگنی و ریشه دم اسبی و بهبود عملکرد انقباضی عضلات ناحیه لگن و رکتوم

سکته روده باریک

(سکته روده باریک که با جراحی، بیشتر روده به امید عملکرد جایگزین روده بزرگ برداشته شده است)

روده بزرگ نقش جذبی ندارد و فاقد پرز لازم برای جذب است. اعلام میکنیم برای؛ باقی مانده روده کوچک افزایش فعالیت و وسعت پرزهای روده ای در جهت بهبود جذب و بهبود انتقال از سلولهای سطحی روده به سیستم عروقی

بیماری سیستیک فیبروزیس

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن معیوب دخیل در بیماری

اصلاح هیدراتاسیون (آبرسانی) داخل مجاری تنفسی از طریق اصلاح تبادل کانالهای سلولی

ام اس

سوال1 (در مورد جوانی که حدود 10 الی 15 سال بیماری MS داره و قسمتی از بدن مثل پا بحالت آویزانه و قسمت راست بدن دیگه هیچ حرکتی نداره و همچنین کنترل مثانه نیز وجود نداره - یک نفر دیگه که بعلت همین بیماری اختلال بلع هم پیدا کرده و چشم هم درگیره دختر خانمی هست که ام اس داره روش کار کردم الان تعادل راه رفتن نداره و انگار فراموشی داره)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

پاسخ1: اعلام میکنم برای؛ از بین رفتن پلاک هایی که روی غلاف های میلین قرار می گیرند و مانع از رسیدن تبالات عصبی می شوند

سوال2 (بنده ام اس دارم تمام ترمها رو گذروندم و با کمک حلقه های رحمانیت خداروشکر مشکلاتم حل شده، الان فقط مشکل راه رفتنم مونده، زانوهام خم نمیشه کدوم حلقه ها رو روش بیشتر کار کنم؟)

پاسخ2: اعلام میکنم برای؛ بهبود عملکرد عضلات سه سر ران، چهار سر ران، عضلات ساق پا و کپسول زانو

بهبود عملکرد اعصابی که به زانو عصب دهی می کنند (اعصاب زانو + اعصابی که از مهره ی دو و سه کمری می آید)

بهبود عملکرد سیستم عصبی

سوال3 (ام اس که با فرادرمانی پیشرفت بیماری متوقف شده)

پاسخ3: اعلام میکنم روی میدان شعوری میلین ها جهت ترمیم و بازسازی میلینها

افزایش تولید الیگودندروسیتها و فاکتورهای تروفیک در جهت بهبود ساخت میلی های آسیب دیده

مهار مسیر سیگنالیگ درون سلولی مهارگرهای بازسازی میلینی

نوریت اُپتیک در MS

نوریت عصب اپتیک یکی از اولین علامتهای مهم و شایع در شروع و عود حملات ام اس است و عبارت است از التهاب عصب بینایی که با تاری دید و اشکال در دید رنگی و نقص در حوزه و میدان بینایی مشخص میگردد. می تواند بعلت نقص عصب آوران مردمک و یا التهاب در دیسک بینایی باشد. مجموعه دمیلینیشن یا تخریب عصبی و التهاب هر دو می تواند منجر به کاهش تطابق مردمک و اختلال در دیسک بینایی و نقصان در دید شود.

اعلام میکنیم برای؛ تنظیم سطح ایمنی سلولی و تخریب و حذف فعالیت سیستم اتوایمیون (در سطح سلولهای T)

افزایش ترشح کورتیکو استروییدها از غده فوق کلیوی در جهت کاهش التهاب عصبی

افزایش تولید الیگودندروسیتها و فاکتورهای تروفیک در جهت بهبود ساخت میلی های آسیب دیده و مهار مسیر سیگنالیگ درون سلولی مهارگرهای بازسازی میلینی

بیماری ای ال اس

اعلام میکنیم برای؛ جلوگیری از تخریب پیشرونده نرونها و ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی،

ترمیم نورون های حرکتی قشر مغز، ساقه مغز و نخاع

جلوگیری از عملکرد ویروس ها از طریق ایجاد به نورون های حرکت، ترمیم و باز نویسی مجدد کروموزوم 17

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ام آر آی گردن

اعلام میکنم برای؛ در مورد جابجای مهره ای c5، c6 که بیرون زدگی پیدا کرده یا bulgin شده، جا انداختن مهرها در راستای صیح.

همچنین کاهش اسپاسم عضلات گردنی

بیماری مولتیپل میلوما

برای عود نکردن بیماری مولتیپل میلوما اعلام میکنیم برای؛ تقسیم صحیح و تکثیر سلولهای خونی پلاسماسل و سلولهای سازنده شان لنفوسیتها

بیماری توکسوپلاسموز

(بیماری توکسوپلاسما Toxoplasmosis که در دوران جنینی به جنین منتقل شده و روی یک چشم اثر گذاشته و دیدش کم شده)

یکی از بیماریهای انگلی انسان و حیوان توکسوپلاسموز می‌باشد. مادران باردار با ابتلا به عفونت اولیه در ابتدای حاملگی ممکن است باعث مبتلا شدن جنین به عفونت و مرگ آن شوند و یا این که نوزاد متولد شده دچار ضایعات مغزی، بزرگی و یا کوچکی جمجمه گردد؛ ممکن است علایم فوق در هنگام تولد کاملا مشهود باشد و یا در مدت کوتاهی بعد از تولد، شروع به ظاهر شدن کند. عامل این بیماری توکسوپلاسما گوندئی است که یک پروتوزای داخل سلولی است که از طریق مدفوعی - دهانی از مدفوع گربه که حاوی اووسیتها یا تخم انگل آلوده است منتقل می‌شود. عامل بیماری ممکن است از طریق خوردن گوشت پخته نشده، انتقال خون یا پیوند اعضا و یا از طریق جفت به جنین با وجود عفونت حاد در یک زن حامله اتفاق افتد.

اعلام میکنیم برای، حذف عامل انگلی توکسوپلاسمایی

افزایش فعالیت سیستم ایمنی سلولی بدن (آنتی بادی علیه انگل)

کاهش فعالیت سلولهای التهابی

افزایش ترشح ضد التهاب ها (کورتیکواستروییدها) برای کاهش درد و التهاب چشمی

اصلاح و بازسازی سلولهای شبکیه و مشیمیه چشم

سرفه های شدید بعد از سرما خوردگی

مشابه آلرژی تنفسی اعلام می شود

بالا آمدن ضریب هوشیاری

اعلام میکنیم برای؛ کنترل خونریزی و رفع ادم و التهاب بافت مغزی و برای بهبودی و افزایش تشکیلات مشبک مغزی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

فلج شبکه بازوی دست راست و ماهیچه ساعد

(بیمار فردی است ۲۸ سالشه که ۴ سال قبل تصادف کرده است. در این حادثه، عصب دست راست وی قطع شده و سه بار تحت عمل جراحی قرار گرفته و از رگ گردن و رگ پا پیوند خورده است. در حال حاضر فقط می تواند انگشتهایش را کمی به سمت بالا ببرد ولی در کل بی حرکت می باشد)

اعلام میکنیم برای؛ شروع فعالیت سلولهای شوآن در ناحیه و تولید و ترشح فاکتورهای رشد عصبی و دریافت ایمپالس های تروفیک توسط گیرنده های سلولی دو سر شاخه عصبی قطع شده

عقب ماندگی ذهنی

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد تمام سلولهای بدن(چون در عقب ماندگی ذهنی، نقص کروموزومی هم وجود دارد)

بهبود و نزدیک به نرمال عمل کردن تمام تمام سلولهایی که در بدن وجود دارند (تا فرد بتواند وجود موثری در جامعه داشته باشد)

همچنین، برطرف شدن مشکلات غددی (اگر وجود دارد)

بافت کلوئید

(دوستی بخاطر سوراخ کردن گوششون دچار کلوئید شدن، در طی ده سال گذشته چندین بار جراحی شده و هر بار دوباره زائده تشکیل شده و به هیچ درمانی جواب نمی ده. ذهن اشتراکی روی چه چیزهایی باید اعلام بشه)

بافت کلوئید ممکن است در اثر برخی جراحی های خاص و هر گونه دستکاری روی پوست اتفاق بیفتد. یک روش درمان جراحی دارد که در تهران و اصفهان انجام می دهند و این هم بستگی دارد نزد جراح پلاستیک فک و صورت ماهر بروند. یک روش دیگر هست که به آن انوکلئه می گویند و در آن علاوه بر برداشتن بافت مورد نظر، سلولهای پوششی آن ناحیه را هم بر عکس می کنند تا به سمت بیرون رشد نکند

در این مورد مشابه درمان تومورها اعلام میکنیم برای؛ محدود و محصور شدن توده توسط بدن و از بین رفتن منابع بقاء توده.

سندرم بهجت

اعلام میکینم برای؛ افزایش توان سیستم ایمنی بدن

پُر شدن صورت و بدن

(برای پر شدن صورت قسمت لپها و رفتن خط بزرگی که زیر چشمه و شدید شده و احتمالا بخاطر کبد هستش و پر تر شدن بدن)

اعلام میکینم برای؛ افزایش چربی زیر پوست + هیپرتروفی و افزایش حجم سلولهای ناحیه مورد نظر

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

کلانژیت اسکلروزان ، بیماری مزمن کبدی

اعلام میکنیم برای؛ افزایش ترشح فاکتورهای ضد التهابی در جهت کاهش التهاب منتشره در مجاری صفراوی

حذف عامل باکتریایی به خصوص گرم منفی ها از طریق افزایش فعالیت سیستم ایمنی ضدمیکروبی

بیماری پلی میوزیت یا تحلیل عضلات

برای پلی میوزیت اعلام میکنیم برای؛ حذف فعالیت سیستم اتوایمیون شامل پادتن هاBcell .ها وTcell ها و سیستم ایمنی هومورال

بهبود عملکرد طحال

اعلام می کنیم برای؛ اصلاح وظایف طحال با شناسایی گلوبولهای بی کیفیت و پلاکتهای غیر طبیعی و برداشت آنها. برداشت باکتری ها. خونسازی در صورت لزوم. و نقش دفاعی در سیستم ایمنی با تولید لنفوسیتها

بزرگ شدن طحال در اثر سیروز و مشکلpt

اعلام میکنیم برای؛ سیروز کبدی شامل بلاک فعالیت نکروزی سلولهای کبدی

افزایش خونرسانی ورید پورت کبدی و ترمیم و سلول زایی بافت همبند کبدی...

با بهبود فعالیت سیستم کبدی اسپلنومگالی یا بزرگی طحال نیز درمان خواهد شد

کیست روی طحال و پشت دیافرگم ناحیه اصلی لگن و شکم، با سابقه ۲ بار شیمی درمانی

برای این مورد مشابه درمان تومورهای بدخیم اعلام میکنیم...

فعال شدن فرایند آپپتوز یا مرگ سلولی از پیش برنامه ریزی شده در سلولهای بدخیم و بلاک فعالیت متاستاز سلولی به سایر مناطق

اختلال در ذخیره گلیکوژن

(بیماری اختلال در ذخیره گلیکوژن Jsd در دختر بچه 8 ساله بصورت ژنتیک و مادر زاد)

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ساختاری ژن معیوب دخیل در بیماری و اصلاح تولید آنزیم اختصاصی ناقص مربوطه

بهبود سنتز و ذخیره گلیکوژن در عضلات و اندام ها

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

سودوموناس

برای سودوموناس که یک میکروب بیماری زای فرصت طلب است اعلام میکنیم برای؛

افزایش فعالیت سیستم ایمنی شامل آنتی بادی ها، گلوبولهای سفید، لنفوسیت های B وT و پادتن ها برای مقابله و حذف عامل میکروبی

پلاکت پایین خون

برای کاهش پلاکت اعلام میکنیم برای؛ اصلاح روند تقسیم در سلوهای پیش ساز ترومبوسیتها (سلولهای مگاکاریوسیت)

هیپر هیدروز

(عرقهای شدید و غیر طبیعی در تمام سطح بدن و خیس شدن لباسها در چند دقیقه)

اعلام میکنیم برای؛ کاهش فعالیت سیستم سمپاتیک و مهار ترشح استیل کولین و افزایش تولید استیل کولین استراز

فیبرومایلوژی

اعلام میکنیم برای؛ ساپرسیون مسیرهای درد و کاهش ترشح فاکتورهای درد زا از مغز و نخاع و کنترل پاسخ به محرکهای دردزا (هایپرالجزیا)

ساپرسیون مسیر دردزای مرتبط با سیستم گلوتاماترژیگ و مونوآمینونرژیک و پیش التهابی سایتوکاین ها

اصلاح ژن های دخیل و مستعد کننده با بروز بیماری

افزایش ترشح سیستم اوپیوییدی و سرتونین در جهت کاهش درد و استرس

فِروزن شُلدِر

برای کپسولیت ناحیه شانه اعلام میکنیم برای.....

افزایش ترشح مایع سینوویال مفصل درگیر و افزایش ترشح کورتیکو استروییدها در جهت اثرات ضد التهابی بر روی مفصل و همچنین بازسازی سطوح مفصلی تخریب شده

خطوط شکننده عمودی ناخن

خطوط عمودی روی ناخن " Vertical Ridges on the Fingernails "Onychorrhexis میتواند با موارد مختلفی مانند فقر آهن، کمبود روی، کلسیم و کم خونی و کمبود ویتامین های نیاسین A و C مرتبط باشد...

اعلام میکنیم برای؛ بهبود و ترمیم عروقی و خونرسانی به عروق ناحیه انتهایی انگشت .

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

تورم مزمن پا

(ورم مزمن هر دو پا که ریشه ارثی داره، بدون مشکل های خونی و کلیوی)

اعلام میکنیم برای؛ ترمیم و بهبود جدار سیاهرگهای پا و دریچه های لانه کبوتری در جهت افزایش برگشت خون سیاهرگی و جلوگیری از تجمع آب میان بافتی در سلولهای ناحیه

شکستگی و قطع عصب انگشت حلقه بر اثر ضربه

برای این مورد افزایش فعالیت استوبلاستها برای بازسازی و اصلاح ناحیه تخریب شده استخوانی....

افزایش تولید سلولهای شوان و نوروتروفیک فاکتورها در جهت بازسازی عصب قطع شده ناحیه انگشت

بیماری کره هانگتینتون

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن کد کننده پروتیین هانگتینتون

بیماری سلیاک

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن، وضعیت ایمنی بدن به خصوص لنفوسیت ها و اصلاح وضعیت پرز روده

سردرد کِلاستر

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن مستعد کننده سردرد کلاستر و برای آزادسازی فاکتورهای اوپیوییدهای اندوژن اندورفین، نوراپی نفرین و سرتونین برای جلوگیری از انتقال و احساس درد

سندرم روده تحریک پذیر

(مبتلا به ای بی اس هستم، ورم شدید روده بزرگ و بدون درد دارم، همچنین مبتلا به هموروئید نیز می باشم)

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح محور مغزی -روده ای و پاسخ های تعدیل شده سیستم کولینرژیک به شرایط استرس زا

و همچنین برای کنترل فعالیت سیستم ایمنی و تنظیم ترشحات سیستم اندوکرین مغز و روده

نوروپاتی محیطی

اعلام میکنیم برای؛ بهبود خونرسانی مویرگی به نواحی انتهایی اندام ها و باسازی بستر مویرگهای خونی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

و همچنین کاهش آزادسازی واسطه ی تخریب گر گلوتامات بر روی نورونهای انتهایی اعصاب محیطی

گره تیروییید

معادل توده های خوش خیم اعلام می شود

گرفتگی عروق پا

(گرفتگی عروق پا بر اثر تصادف و توام با درد شدید، بمدت هفده سال ... دکترها گفتند دیگه خوب نمیشه)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود جریان خون سیاهرگی در نواحی درگیر و کاهش انعقاد پذیری و ترمیم دیواره عروقی لایه انتیما

تخریب بافت ناخن

(بافت ناخنهای شصتِ دست این شخص، از سالها پیش از کودکی به شکل کنگره ای مانده صاف نمیشه، و به تازگی روی ناخن رو سوهان کشیده و بافت ناخن رفته و دردناک شده است. برای صاف شدن روی بافت ناخن لطفا)

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح فعالیت بافت زایی بستر ناخن و مویرگهای ناحیه و کوتیکول (البته بیماریهای زمینه ای مانند تیروییید و ریوی ...

آلودگیهای قارچی نیز می توانند باعث تخریب بستر ناخن شوند که در این صورت بر روی بیماری مذکور نیز ذهن اشتراکی اعلام می گردد)

اختلال گفتاری - بیحسی دست چپ

(برادر42 ساله ام، حدود هفت سال پیش بر اثر مننژیت، قسمت گفتاری مغزشون آسیب دیده، و الان چند کلمه ای صحبت میکنه، البته واضح نه، و انگشتانه دست چپشون هم بی حسه)

برای اختلال گفتاری اعلام می کنیم برای ترمیم سلولهای عصبی ناحیه گفتاری مغز (بروکا) و ناحیه ارتباطی گفتاری و اصلاح ارتباطات بین کورتکس مغزی و مراکز مذکور...

و برای بی حسی دست چپ اعلام میکنیم برای مرکز حرکتی کورتکس مرتبط با حرکت انگشتان دست چپ در شکنج حرکتی

دررفتگی های مکرر شانه

(برای برطرف شدن مشکل بیرون زدگی استخوان کتف (scapula winging) و درد خیلی زیاد در منطقه ی کتف و کشیدگی شدید تاندون اون منطقه)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

برای دررفتگی های مکرر شانه اعلام میکنیم برای؛ افزایش قدرت انقباضی و ترمیم بافتی در رباط، لیگامان نگهدارنده شانه و ترمیم کپسول مفصلی ناحیه و برای کنترل درد میتوانیم اعلام کنیم برای ترشح فاکتورهای ضددرد اندورفین ها و فاکتورهای ضدالتهابی

بیماری استئوسارکوما

(استئوسارکوما یک عارضه ی مفصلی میباشد. ایشان ظرف مدت یکسال بیش از چند مرتبه شیمی درمانی کرده اند اما بی نتیجه بوده است)

برای بافت بدخیم استخوانی اعلام میکنیم برای؛ تقسیم سلولی صحیح سلولهای مزانکایمال استخوانی و فعال شدن فرایند مرگ از پیش برنامه ریزی شده در سلولهای بدخیم موجود

فیبروز ریه

بیمار مبتلا به فیبروز ریه هست (۶۰ درصدریه) با ظهور علایمی مثل؛ سرفه، تب، قند 134، بی اشتهایی و ...

اعلام میکنیم برای؛ افزایش سطح فاکتورهای ضد التهابی و کورتیکو استرویییدها در جهت بهبود و ترمیم بافت پارانشیم ریه

افزایش و تقویت سطح ایمنی سلولی ایمنی هومورال...

افزایش فعالیت ماکروفاژها، لنفوسیت های بی و تی...

افزایش ترشح پادتن برای حذف عامل عفونی بیماری زا

مشکل عدم تمرکز دختر ۱۱ ساله

اعلام میکنیم برای؛ بهبود ارتباطات بین قشرپریفرونتال با سایر نواحی کورتکس (مراکز بینایی، گفتاری، شنوایی، لیمبیک و آمیگدال)

برای بسته شدن رگهای سرکومفلکس چپ شریان کرونر، راست شریان قدامی چپ

اعلام میکنیم برای؛ غیر فعال شدن مسیرهای مرتبط با تبدیل فیبرینوژن به فیبرین

و جلوگیری از تجمع پلاکتها و ترشح فاکتورهای انعقادی

افزایش ترشح پلاسمین در جهت لیز و برداشته شدن لخته خون و پلاکهای عروقی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

آرتريد روماتويید کودکان

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ژن مستعد کننده بروز بیماری و شناسایی سلولهای ناحیه سینوویوم غضروف و مفاصل توسط سلولهای ایمنی بدن(توقف فعالیت اتوایمیون) و ترشح استروییدها در جهت کاهش التهاب و درد

****

151- گرفتگی دردناک انگشتان پا و آزاد شدن خودبخودی در کوتاه مدت

(بیشتر مواقع انگشتای پام میگیره و کج و در حالت دردناک که بعد از یکی دو دقیقه آزاد میشه و بدون درد، چی اعلام کنم؟)

152 – وقفه در رشد در سن جوانی

(کسی را که در یک سنی در جوانی دچار وقفه در رشد شده چه قسمتی از بدن را در حلقه ذهن اشتراکی کار کنیم؟)

153- یبوست کودک 13 ماهه

164- حملات ناشی از آسم شدید که در اثر عصبی شدن رخ می دهد

165 - بیمار دیالیزی

166- تنگی کانال شدید – فرسودگی و ارتروز مهره – بیرون زدگی دیسک – بی حسی و ضعف پای چپ

(من قبلا تا ترم 4 رفتم و مجدد دارم از اول کلاسارو میرم. متاسفانه من مرداد ماه کمرم رو عمل کردم تنگی کانال شدید و دیسکم دوتاش زده بود بیرون و دوتا از مهرهام هم ساییدگی داشت و استخوان جوش دادن. کلا مهرهام فرسودگی شدید دکتر گفته نسبت ب سنم بیست سال فرسوده تر شده و ارتروز مهره هم دارم. بعد عملم پای چپمو حسشو از دست دادم و بی حسی و ضعیف شده . البته نسبت ب سه ماه پیش خیلی بهترم با فیزی تراپ و چن جلسه هم طب سوزنی برام انجام دادن)

167- دیستونی گردن

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

۱۶۸- سنکوپ خوش خیم - انقباضات نا منظم مری و احساس گیر کردن غذا در گلو

169- تب و لرز شدید دختر چهار ساله

۱۷۱- ترک مشروب

۱۷۲- رفع لکه های قهوه ای صورت

۱۸۲- کسی که هر دو مورد دوربینی و نزدیک بینی رو با هم داره

۱۸۳- پای ضربدری

۱۸۵- خط اخم بین دو ابرو گاهی توام با سوزش

(وجود خط اخم بین دو ابرو که خیلی واضح هست و گاهی وسط خط اخم میسوزه، دکتر گفته از چربی شکم باید برداریم و به اونجا بزنیم تا خوب بشه، راهی با درمان ذهن اشتراکی داره؟)

۱۸۶- ناشنوایی کامل از بدو تولد

۱۸۷ - شب کوری - قرنیه ی نازک – دید ضعیف در روز

من ببماری شب کوری دارم یک بار لیزیک کردم قرنیه م نازکه علاوه بر اون دیدم در روز هم حتی با عینک کامل نیست

۱۸۸- احساس خواب رفتگی و مور مور شدن سمت چپِ پشت پای چپ

(من حدود یکماه هست که پای چپم، پشت پام، سمت چپش حس خواب رفتگی و مور مور داره)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

۱۹۰ - دو تا جواب ازمایش برای من فرستادن و پرسیدن چی اعلام کنیم؟

۱۹۸- کما بر اثر تصادف

ذهن اشتراکی اعلام میکنم برای؛

****

زونا یا ویروس آبله مرغان

سوال1: برونریزی (میشه به آقای دکتر این عکس رو نشون بدی ببینی این علایم زخم بستر هست؟! استخون این قسمتش فرو رفته برونریزی کرده یه مدت رو این سمت دراز کشیده از طرفی هم مشکل غیرارگانیکی داره این حالت غیرارگانیکیه یا زخم بستر یا چیز دیگه ست؟!)

عکس ارسالی نشان از زونا یا همون ویروس آبله مرغان رو دارد که بصورت دون دون و احتمالا دردناک بروز کرده است که از علایم زوناست. این موارد ممکن است در برونریزیها هم رخ دهد

توصیه پزشکی: علاوه بر داروهایی که استفاده میکند می تواند پماد یا کرم فنی توئین را برای کاهش درد استفاده نماید

سوال2: مسری بودن زونا (دوستم زونا گرفته میخوام برم عیادتش الان. لطفا از دکتر بپرسید که مسری هست یا نه؟ من تا حالا آبله مرغون نگرفتم، نکنه برم پیشش زونا بگیرم؟ اشتراکی چی براش اعلام کنم)

زونا همان ویروس آبله مرغان است. اگر کسی تا بحال آبله مرغان نگرفته باشد و با یک زونایی در تماس باشد .... باید همون کارهایی که برای عفونت لازم بود را برای او هم اعلام کند. اما نباید زیاد به او نزدیک شود و ترجیحا در جایی باشد که هوا در جریان باشد و محتبس نباشد.

سینوزیت مزمن

سینوزیت مزمن نوعی از سینوزیت است که سخت به درمان جواب میده، بخاطر اینکه در دراز مدت، این مسیری که ترشحات سینوس به سمت بیرون باید طی میکرده آلوده شده و ممکنه به جدار استخوان ها و مخاط آسیب زده باشه. ببینید چند تا چیز وجود دارد یکی اینکه تمام موانع بر سر راه تخلیه ترشحات سینوس هست برداشته بشه مثلا ببینید کسی که پلیپ توی بینیش وجود داره،کسی که انحراف بینی داره. این هم مانع تخلیه ترشحات میشه. چرا؟ چون سه چهار دسته سینوسی که ما داریم تمام ترشحاتشون در قسمت یک سوم فوقانی و میانی بینی تخلیه می شوند. حالا توی این مسیر مخصوصا توی خود بینی اگر تنگی مجرا بینی وجود داشته باشه طرف ممکنه بینیش را عمل کرده باشه تنگی مجرا وجود داره مخاطش مشکل داشته باشه پلیپ داشته باشه انحراف بینی داشته باشه. اینا همشون مانع این میشن که تخلیه ترشحات به خوبی انجام بشه، ترشحات محتبس میشه پشت اون و میشه محیط کشت خوبی برای باکتری.

اعلام میکنیم برای؛ پاکسازی و باز شدن مسیر تخلیه ترشحات سینوس

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

در صورت وجود عفونت و سرایت سینوزیت مزمن به ریه اعلام میکنیم برای؛ گشاد شدن برونش ها و تخلیه ترشحات از ریه (جهت خروج کامل عفونت از بدن)

پرهیز جدی از مصرف دخانیات مثل؛ سیگار کشیدن، دود و قلیون و ... ، که باعث فلج شدن مژک ها می شود

رگهای ریز سطح پوست

علت ایجاد رگهای ریز در سطح پوست چیست؟ این رگها در صورت و دست و پاهام دیده میشه. ذهن اشتراکی را برای کجا اعلام کنم؟)

هر نقطه از پوست که تحت فشاری باشد و جلوی تخلیه ی ترشحات یا پمپاژ خون به سیاهرگها را بگیرد می تواند باعث ایجاد رگهای ریز در سطح پوست شود مثل چاقی، خونریزی زیر پوستی و ...

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد تخلیه ی ترشحات و تخلیه ی خون و رفع هر گونه انسداد یا اختلال در مسیر پمپاژ خون به سیاهرگها و برگشت آن به قلب

برگشت حس عصب انگشت

(برای خانمی که حدود شش سال پیش دستش رو با چاقو زده باشند. بالای مچ و انگشت کوچک کامل جمع نمیشه، ده جلسه هم فیزیو تراپی رفته، ولی با گرفتن فرادرمانی یه چیزی حس کرد اما باز همون طوره، برای عصب یا چی اعلام کنیم)

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد اعصاب اون ناحیه و رشد دو سر عصب به سمت هم و تشکیل تنه یی واحد و مستحکم برای جلوگیری از ارسال پالسهای اشتباه عصبی و رفع گزگز و مورمور

توصیه ورزشی: آب درمانی، حرکتهای ورزشی دست، ماساژ ساده

کم خونی داسی شکل

بیماری سیکل سل آنمی sickle cell anemia یا کم خونی داسی شکل یک بیماری ژنتیکی و یک اختلال خونی است که در آن نوعی پروتئین خاص به نام هموگلوبین را که درون گلبول های قرمز خون قرار دارد و وظیفه ی اصلی آن حمل اکسیژن در خون از ریه ها به سایر نقاط بدن است را تحت تاثیر قرار می دهد و بجای تولید گلبول های قرمز طبیعی که به شکل دیسک هستند شکل آنها تغییر کرده و به شکل هلال ماه یا یک داس در می آیند. این گلبول های داسی شکل در درون رگ های خونی به هم می چسبند و نمی توانند به راحتی در داخل عروق حرکت کنند و مسیر رگ را مسدود می کنند، این انسداد موجب درد، اختلال عملکرد و آسیب به بافتهای بدن و افزایش احتمال عفونت می شود.

ما در این بیماری اگر بتوانیم با ذهن اشتراکی ژنها رو تحت تاثیر قرار بدهیم کم خونی داسی شکل بسیار بهتر به درمان جواب میدهد. کم خونی داسی شکل معمولا بدون علامت است اما اگر علامت دار شود هِماچولی بدون درد جزو اولین علامت هاست و فرد ممکن است در ادرار یا آزمایش ادرارش خون دیده شود بدون وجود هیچ مشکلی در کلیه، که البته با پیگیریهای بعدی می توانیم به کم خونی داسی شکل پی ببریم.

هموگلوبین دو بخش دارد. بخش "همو" که شامل پورتوپوفیلین و آهن است که کاری با آن نداریم. اما بخش دیگر آن نوعی پروتیین است که از زنجیره های آلفا و بتا تشکیل شده است که بیشتر در تالاسمی ها و کم خونی داسی شکل اتفاق می افتد بدین صورت که هموگلوبین در موقعیت ششم زنجیره ی بتا دچار تغییر می شود و والین بجای اسیدگلوتامیک قرار می گیرد.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

ذهن اشتراکی اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد و ایجاد عملکرد نرمال در سلولهای مغز قرمز استخوان های دراز را برای تولید گلبولهای قرمز سالم (میزان تولید گلبول قرمز در سلولهای مغز قرمز استخوانهای دراز فرد بالغ در شرایط نرمال، سه میلیون گلبول قرمز در ثانیه می باشد)

برای کم خونی داسی شکل اعلام میکنیم برای؛ اصلاح ساختار ژن معیوب hbs عامل ابتلا به کم خونی داسی شکل

قرارگیری و جذب اسیدگلوتامیک بجای والین در موقعیت ششم زنجیره ی بتا در تمام سلولها

گلبول قرمز داسی شکل و کم خونی مینور

(خانم گلبول قرمز داسی شکل داره و نامزدش کم خونی مینور)

درباره ی این دو جوان، باید بگویم این ها فاجعه است! مشکل هر دو در زنجیره های هموگلوبین هست. برای هر دو ذهن اشتراکی اعلام می کنیم؛ مغز قرمز استخوان ها، هموگلوبین های ساده و نرمالی تولید کنند. ولی حتما باید با یک پزشک هم مشورت کنند. هم روند ذهن اشتراکی و هم روند درمان را پیگیری کنند که چقدر تاثیر داشته، به خاطر اینکه ناآگاهانه نخواهند تصمیم بگیرند خدایی نکرده در آینده فرزندان مشکل داری را به دنیا بیاورند! خیلی وقتها، خیلی چیزها ممکن است منظم باشد ولی در جای خودش! همانطور که ما نمی توانیم اصرار داشته باشیم که به فرض، چوب تبدیل به لاستیک شود، چوب کار خودش را می کند لاستیک کار خودش را. ممکن است که شرایط زندگی طوری مقدر شود که نظمی که قرار است ایجاد شود، آن نظمی نباشد که مورد خواست ما است. یک مقداری باید روی اینها بیشتر کار کرد، سماجت به خرج نداد! ذهن اشتراکی از این طرف اعلام می کنیم از آن طرف روند درمان را دنبال می کنیم و نهایتا قبل از اینکه ازدواجی صورت بگیرد و قبل از اینکه علاقه ای به وجود بیاید صبر کنند ببینند نتیجه ذهن اشتراکی و تصمیم گیری پزشکان به کجا ختم می شود تا در مسیر اعتدال و درستی حرکت کنیم شاید خیرمان در جای دیگری باشد!

تاول و خارش ناشی از نیش حشره

(برای پسر بچه پنج ساله که نزدیک به دو سال است که وقتی حشره یی نیشش میزنه، بدنش تاول میزنه و خیلی خارش داره و اکثر مواقع از بین اعضا خانواده فقط بدن او را نیش میزند ذهن اشتراکی چی باید اعلام کرد)

اعلام میکنیم برای؛ کاهش واکنش تحریک پذیری سیتم آلرژی و هیستامین بدن

زگیل

اعلام میکنیم برای؛ قطع تغذیه و خونرسانی و تجزیه شدن سلولهای زگیل یا میخچه در ناحیه مورد نظر

میخچه

اعلام میکنیم برای؛ فعال سازی فرایند سیگنالینگ مرتبط با آپپتوز سلولی در جهت حذف سلولهای مرده پوست

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

پینه بستن محل میخچه یی که بهبود یافته است

مشابه میخچه اعلام می شود

کوچک شدن مخچه

طبق تحقیقات امریکایی ها در مورد روزه داری، دریافتند که در اثر گرسنگی، هورمون آی جی اف وان (IGF-1) افزایش می یابد و سلولهای عصبی که جزو اون دسته از سلولهایی هستند که بعد از تولد رشد آنچنانی ندارند - بر خلاف حالت عادیشون - شروع به تکثیر و رشد می کنند در صورتی که فرد شرایط روزه داری را دارد روزه در ماه رمضان و همچنین دو روز در هفته در غیر از روزهای ماه رمضان (بطور مثال دوشنبه و پنجشنبه) با تأیید پزشک خیلی مفید خواهد بود. در صورتی هم که فرد شرایط روزه داری را ندارد این گونه عمل کند که دو روز در هفته (بطور مثال؛ دوشنبه و پنجشنبه) صبحانه را کامل بخورد ولی از بعد از صبحانه تا فردا صبح فقط آب یا چای بخورد و روز بعدش رژیم عادی خودش را انجام دهد

برای تمام اتفاقاتی که در مغز رخ می دهد بخصوص با افزایش سن، اعلام میکنم برای؛ بهبود عملکرد و اندازه تمام سلولهای عصبی مغز و مخچه

افزایش سروتونین

(چگونگی افزایش سروتونین در مغز توسط ذهن اشتراکی برای شخصی که بدلیل مصرف مواد مخدر و داروهای ضد افسردگی، بعد از قطع مصرف مغزش قادر به ترشح سروتوتین نمی باشد)

در مورد ترشح سروتونین در مغز، سروتونین نوعی هورمون هست که توسط سلولهای عصبی در مغز و در سلولهای عصبی دستگاه گوارشی تولید می شود که معمولا پیش ساز آن، تریپتوفان هست که یک اسید آمینه است.

اعلام میکنیم برای؛ افزایش میزان تولید سروتونین از طریق افزایش تبدیل تریپتوفان به سروتونین توسط سلولهای عصبی دستگاه گوارش و سیستم عصبی مرکزی که همان مغز است (که با افزایش ویتامین B6 انجام میشد)

توصیه غذایی: افزایش مصرف مواد غذایی که می تواند باعث افزایش سروتونین شود مثل؛ بوقلمون، ماهی هایی چون ساردین، سالمون.

سکته مغزی

اعلام میکنیم برای؛ بهبود عملکرد سلول های مغزی در ناحیه آسیب دیده (سمت چپ یا راست)

محدود شدن کانونهای سکته های مغزی (که ممکن است عامل تشنج و اختلالات مغزی شوند)

سکته مغزی ناشی از افزایش فشار خون دیاستولی

(کسی که سکته مغزی کرده و نصف بدنش بیحسه باید دقیقا کجاش کار کرد. در سن 28 سالگی سکته کرده و هنوز سه ساله در ناحیه پاراآئورت یه مَس هموژن وجود داره البته و این علت سکته بود و به اضافه فشار بالا که همیشه روی بیست هستش)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

یکی از دلایل سکته های مغزی، افزایش فشار خون دیاستولی هست. البته دیاستول مهم تر از سیستول هست در این کار. معمولا کسی که فشارش روی 12 روی هشت هست، که همان 120 روی هشتاد، هر چقدر فشار مینیموم از 5/8 ،،هشت ونیم،، بالاتر باشد، ریسک به خونریزی مغزی زیاد است! وقتی مینیموم به 11 یا 12 یا بالاتر برسد خیلی راحت رگ مغز پاره می شود و سکته مغزی اتفاق می افتد. یکی از دلایل افزایش فشار خون که در کتابهای رفرنس دنیا هست، افزایش فشار ورید کلیه هست، همان ناحیهء پاراآئورتی که توی قسمت (احتمالا) پاراآئورت شکمی دیده شده یک تودهء هموژن بوده.

این توده را نمی دانیم چه توده ای است، ممکن است توده خوشخیم یا بدخیم باشد، انشاالله که خوشخیم است، هر چه که هست داره فشار روی ورید کلیوی می آورد و این ورید کلیوی یک سری اتفاقات براش می افتد که از طریق کلیه فشار می آورد یا اینکه خود ورید کلیه را مورد آسیب قرار می دهد، افزایش ورید کلیوی جزو دلایل اصلی فشار خون بالا هست.

کافی است ما اعلام کنیم این توده ی یکنواخت، این توده که در قسمت پاراآئورتیک شکم، به احتمال زیاد نزدیک به ورید کلیوی دیده شده، اگر برایش مثل تومورها اعلام کنیم از بین برود، اگر مانعی دارد، اگر سیستم عملکرد بدن دارد مانع ایجاد می کند تا اندازه ای که این مانع برطرف شود آن مانع برداشته شود، ورید کلیوی آزاد شود، خیلی راحت می شود که فشارشان کنترل شود، فشار خونی که همیشه ۲۰ هست پایین می آید، قطعا فشار مینیموم هم پایین می آید و دیگر این حالت ها را ندارد.

البته تا آن زمان، می شود از دارو استفاده کند ولی همزمان با آن ما می توانیم این ها را برایش اعلام کنیم، تحت نظر پزشک هم باشد تا این اعلام ها و ذهن اشتراکی ها عملکردش را شروع کرد قطعا کم کم نیازش به دارو کمتر می شود. بنابراین ببینید اینجا با یک کنترل فشار خون از طریق کنترل ورید کلیوی خیلی راحت می شود جلوی این بیماری را گرفت و بیمار را به سمت بهبودی برد، انشاالله!

آلزایمر

اعلام میکنیم برای؛ بهبود خونرسانی به ناحیه هایپوکمپ دو طرف

حذف و برداشتن پلاکهای آمیلوییید بتا

بازسازی نورونهای تخریب شده هایپوکمپ

افزایش فعالیت ارتباطی کورتکس مغز با ناحیه هایپوکمپ

آلزایمر و سکته مغزی

(لطفا برای مادربزرگم که بدلیل افسردگی، آلزایمر، دیابت و سکته مغزی، دست و پای چپ از کار افتاده و سرده و کلا قادر به حرکت، کنترل ادرار، حرف زدن، غذا خوردن و حتی باز کردن چشمهاش نمی باشد و سطح هوشیاری پایینه و ماههاست غذا را از طریق بینی به معده میفرستیم و چون ریه خوب پر و خالی نمیشه، دایم دچار خلط زیاد پشت حلق و عفونت گلو میشه و گاهی دچار تشنج...)

در مورد بیماری آلزایمر اعلام میکنیم برای؛ ترمیم بخش هایپوکمپ و تولید استیل کولین به مقدار نرمال،

جلوگیری از تجمع بتا آمیلوئید در خارج سلولهای مغزی،

حفظ ساختار طبیعی پروتئینی به نام tau و جلوگیری از پیچ خوردگی آن.

در مورد سکته مغزی اعلام میکنیم برای؛ تنظیم خونرسانی به بافت مغز و جلوگیری از لخته خون بخصوص سمت راست مغز

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

دیستروفی یا ضعف عضلانی

(برای بیماری دیستروفی یا ضعف عضلانی در سه تا خواهر و برادر به نامهای مهدی، وحید و فاطمه سوال بشه درمان با ذهن اشتراکی روی چه چیزی باید کار بشه اگه ممکن شما هم براشون اعلام کنید)

دیستروفی های عضلانی، به یک گروه از بیماری های ژنتیکی گفته می شود که با پیشرفت و ضعیف شدن و انحلال اسکلت و ماهیچه های ارادی در کنترل بدن همراه است. در واقع دیستروفی یک بی نظمی در ماهیچه هست. وقتی ماهیچه ای تحلیل می رود، بافت چربی جانشینش می شود. ما بیش از چهل نوع دیستروفی داریم. این دیستروفی ها در واقع یک اختلال ارثی و ناهنجاری های ژنتیکی هستند. چیزی که مطمئنا وجود دارد، نقص ژنی هست که باعث دیستروفی می شود. علت دیستروفی چیزی نیست به جز وجود اشکالات روی پروتئین های ژن های معینی از بدن. این انواع مختلف هر کدامش یک مورد، مثلا در مورد دیستروفی دوشن، نبودن دیستروفین موجب از کار افتادن فیبرهای ماهیچه می شود،

ذهن اشتراکی اعلام کنیم برای؛ اصلاح ژنی و بهبود عملکرد نرمال ژن های بدن برای کارکرد و عملکرد نرمال فیبرهای ماهیچه ای(که اگر این اتفاق بیافتد و پروتئین ها بتوانند کار اصلی خودشان را انجام دهند، بافت ماهیچه حفظ می شود و سلامت بافت ماهیچه حفظ می شود)

زردی نوزاد

هشدار بسیار مهم پزشکی: برای موارد اورژانسی و مواردی که در کل زمان کافی نداریم، همزمان با اعلام حلقه؛ سریعا اقدامات پزشکی لازم را فراهم نماییم و پس از بهتر شدن شرایط و یا مرخصی بیمار، بصورت کمکی ذهن اشتراکی رو تا بهبودی کامل ادامه دهیم. علت چنین هشداری این است که بطور مسلم، میزان آگاهی و اثربخشی انسانها در زمینه کار روی شعور سلولی نسبت به هم تفاوت دارد و ...

رسیدگی دیرهنگام به زردی نوزاد عواقب جبران ناپذیری رو به دنبال دارد. زردی نوزاد انواع مختلفی دارد که خطرناکترین آن به گونه یی است که بیلی روبین در داخل کبد کُنژولیه نمی شود یعنی؛ تبدیل به ترکیبی بی ضرر برای بدن نمی شود و به داخل خون ریخته می شود و بصورت غیر قابل کنترل به بالا می رود و اگر بیلی روبین در خون کودک به بالای 15 تا 20 برسد می تواند به خیلی از جاها مثل مغز، کلیه و کبد نفوذ کند که خطرناکترین جا مغز است و احتمال دارد کودک بطور دائم عقب مانده ی ذهنی شود. لذا؛ در مورد زردی نوزاد همزمان با اعلام حلقه سریعا همه ی اقدامات لازم پزشکی مثل؛ تعویض خون، مصرف دارو یا بستری شدن را انجام دهید تا وقتی که بیلی روبین به 10 یا 10.5 رسید و کودک مرخص شد سپس بصورت کمکی ذهن اشتراکی رو اعلام کنید.

اعلام میکنیم برای؛ افزایش دفع بیلی روبین از طریق سیستم گوارشی و کبدی

بیماری کرنیکتروس

(خواهرم وقتی بدنیا اومد زردیش بالا رفت شیر مادرم هم خشک شد شش بار تعویض خون شد از سرش سوراخ کرده بودن بعد دیگه عقب مونده شد بخاطر فشار بیش از حدی که زردی به مغزش آورد الان 14سالشه ولی راست یه بچه هفت هشت ساله س)

سلام دوستان، افزایش و عدم کنترل و درمان به موقع زردی نوزادی یا افزایش بیلی روبین می تواند باعث بروز بیماری کرنیکتروس شود. در این بیماری در اثر افزایش بیلی روبین نکروز و تخریب سلولهای عصبی ایجاد می شود...

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

اعلام میکنیم برای؛ بهبود و بازسازی یا نورو رژنراسیون عصبی در سلولهای کورتکس مغزی

و همچنین بهبود ترشح فاکتورهای رشد عصبی شامل NGF و BDNF در بازسازی نورونی ناحیه تخریب شده

همچنین افزایش تولید و ترشح سرتونین و دوپامین در جهت افزایش کارایی و ارتباطات بین سلولی

عفونت ادراری

(عفونت ادراری ناشی از بی حرکتی وe.coli نوعی باکتری مقاوم در عفونت ادراری)

اعلام میکنیم برای؛ تخریب دیواره باکتریایی e.coli و حذف عامل میکروبی و همچنین ترشح فاکتورهای ضدالتهابی برای رفع التهاب پوشش داخلی مثانه و مجاری و افزایش قدرت انقباضی اسفنگترهای مجرا

فرو رفتگی مادرزادی دنده و ایجاد عارضه قلبی

(فردی که بصورت مادرزادی یکی از دنده های پایینی قفسه سینه سمت قلب فرو رفتگی داره که به مرور قلب رو تغییر فرم داده و مشکلات قلبی پیدا کرده وچندین بار مرگ رو تجربه کرده است)

اعلام می کنیم برای؛ اصلاح ژن معیوب دخیل در بیماری و فعال شدن استیوکلاستها در تخریب و حذف استخوان معیوب و بازسازی صحیح توسط سلولهای استخوان ساز

دفع پروتئین در ادرار

برای بهبود عملکرد کلیوی به این صورت میتونیم اعلام کنیم...

بهبود کارکرد واحد های عملکردی کلیه در برداشت و دفع مواد زایدی مانند اوره و کراتنین... .

کنترل و کاهش تخریب این واحدهای عملکردی و بازسازی سلولهای نفرونها

رفلاکس ادراری در کودک چهار ساله

در کسی که رفلاکس دارد، دریچه ها خوب کار نمی کنند و جهت ادرار به سمت بالا عوض می شود، اضافیِ ادرار به سمت بالا حرکت می کند که ممکن است منجر به آسیب دیدن کلیه ها بشود.

اعلام میکنیم برای؛ تقویت و بهبود عملکرد دریچه هایی که بین کلیه ها تا مثانه وجود دارند (تا این دریچه ها کارآیی لازم را داشته باشند و مانع بازگشت ادرار از مثانه و حالب به کلیه ها شوند) و همچنین رفع هر گونه عفونت احتمالی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

* هشدار پزشکی: البته باید خیلی مراقب باشیم چون کلیه عضو خاموشی است و حتی اگر یک و نیم ازکلیه ها را از دست بدهیم، متوجه نمی شویم چون نصف کلیه، کار بقیه ی کلیه را انجام می دهد، این است که باید پیگیری کنیم؛ در کنار ذهن اشتراکی، پیگیری کنیم که آسیبی به بچه نرسد!

خونمردگی و تورم بعد از عمل رینو

در مورد خون مردگی و ورم بعد از عمل، همان کاری که برای هماتوم ها و خون مردگی های دیگر انجام می دادیم، انجام می دهیم. یک سیستم داریم که سیستم درناژ یا همان تخلیه است که معمولا این ها باید آرام آرام تخلیه شوند در عروقی که آنجا هستند، این تخلیه به نحو احسنت باید انجام شود.

اعلام می کنیم برای؛ بهبود عملکرد سیستم تخلیه در وریدهای لنفاوی و سیاهرگها (به آرامی این کار انجام شود که آسیبی به بدن نرسد)

بیماری کرون

(برای جمع شدن آب در لگن برای خانمی که بیماری کرون دارن و روده شون آب جذب نمیکنه چطوری ذهن اشتراکی اعلام کنم)

آب که در لگن جمع نمی شود. چند مدل اتفاق در کرون می افتد. دو بیماری شبیه به هم هستند که سیستم گوارش را درگیر می کنند، کرون و ،کولیت اولسرو. خیلی وقتها هست که حتی تا ۸ سال تشخیص دادن ،کرون، است و بعد از ۸ سال فهمیدند کولیت اولسرو است یا بالعکس... اول اینکه دنبال تشخیص صحیحش باشند، دوم این که در این بیماریها پُرزهای روده، خراب می شوند، سیستم جذب به هم می ریزد، یکی از چیزهایی که قرار است جذب شود آب است؛ حالا این آب ممکن است به اسهال منجر شود و اگر خیلی زیاد باشد یا بیماری های دیگری همراهش باشد، آب میان بافتی زیاد می شود که همین است که در سوال اشاره شده و گفته اند آب در لگن جمع شده، در اینجا آب میان بافتی زیاد شده است. که باز همین، چند مدل دارد، نمی دانم ایشان کدام مدلش را گفته اند ولی روی هم رفته ما می توانیم در مورد زیر کار کنیم

ذهن اشتراکی اعلام می کنیم برای؛ بهبود عملکرد پُرزهایی که در روده باریک و روده بزرگ هستند و اینکه سیستم جذب آب و مواد غذایی شان بالا برود و موانعی که منجر به این عملکرد طبیعی شان می شود، برداشته شود. که به امید خدا این اتفاق کمتر برای شان بیافتد.

پیوند مغز استخوان و پایین آمدن پلاکت تا ۲۰ هزار

در این باره قبلا هم گفته بودم، وقتی مغز استخوان را پیوند می کنیم، تولید گلبولها و فرآورده های خونی نرمال، آغاز می شود به همین دلیل، پلاکت ها، گلبولهای سفید و قرمز، شروع می کنند به نرمال تولید شدن. معمولا پلاکت خون، وقتی که هر یک از فرآورده های خونی مثل پلاکت یا گلبول ها، ناجور تولید بشوند، اینها یک سری شان توسط سیستم دفاعی بدن، به عنوان ناشناس گرفته می شوند و از بین می روند. در مورد پلاکت هم اتفاقی که می افتد، همین است. ما وقتی پیوند مغز استخوان می زنیم پلاکت ها شروع به اضافه شدن می کنند؛ درست است که ۲۰ هزارتا کم است، ما باید حداقل ۱۵۰ هزار پلاکت داشته باشیم ولی ۲۰ هزار، حداقل پلاکتی است که می توان امیدوار بود این شخص بتواند به ادامه زندگی خودش با حمایت های طبی و دارویی امیدوار باشد.

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

برای این فرد ذهن اشتراکی را اینطور اعلام می کنیم: افزایش تولید گلبولها و فرآورده های خونی و پلاکت نرمال توسط مغز استخوان و انطباق پیدا کردن و متجانس شدن آن بافتی را که پیوند کردیم به مغز استخوان، با بدن.

هر چقدر این هماهنگی بیشتر شود، خوشبختانه تولید فرآورده های خونی نرمال هم افزایش پیدا می کند. پس همانقدر که برای بهبود عملکرد و ایجاد عملکرد نرمال مغز قرمز استخوان اعلام می کنیم، به امید خدا کمک کننده خواهد بود.

درد معده و آروغ

در مورد فردی که درد معده دارد و آروغ پی در پی می زند؛ موضوع کمی خطرناک است!

در بیماری هایی که مری دارد مثل مری آشالازی، اسپاسم منتشر مری یا مری فندق شکن، این ها یک سری بیماری هستند که در آن، حرکات دودی مری دچار مشکل می شود، هم لقمه ها که پائین می رود دچار مشکل می شود و هم اینکه گاهی اوقات در پیوستگاهای مری به معده یک تنگی خیلی شدید داشته باشیم که اسم این بیماری آشالازی هست که ورود مواد غذایی به معده، بسیار بسیار سخت انجام می شود؛ این خودش می تواند عوارض زیادی داشته باشد منجمله منجر به پارگی مری در آن ناحیه یا پارگی وریدهای آن ناحیه بشود که هر دو خیلی خطرناک است!

به همین خاطر ما برای این فرد، هم زمان که باید عکس رنگی از مری و معده گرفته شود که ببینیم مشکل کجا هست همزمان هم ذهن اشتراکی اعلام می کنیم برای برداشته شدن هر گونه فشار از روی سیستم گوارشی؛ معده و مری.

از طرف دیگر بهبود عملکرد حرکات دودی مری را اعلام می کنیم که اگر حرکات دودی مری مشکل دارد، این حرکات به خوبی انجام شود و یک مشکل دیگر، اسپاسمی هست که ممکن است به صورت بیماری، یک اسپاسم خیلی شدید داشته باشند، در پیوستگاه مری به معده، بعضی اوقات آنجا اسپاسم پیدا می کند و مانع ورود می شود. البته چیزهای دیگر مثل تومورها، زخم های پیش رونده، اینها هم می توانند باعث این مشکلات شوند.

پس همزمان که برای بهبود عملکرد و بهبود عمل حرکات دودی مری اعلام می کنیم و همچنین برداشته شدن فشار از روی مری و معده و برداشته شدن هرگونه تنگی ناخواسته، مثل اسپاسم های بسیار شدید همان دریچه مری به معده؛ همزمان که اینها را اعلام می کنیم، بیمار را می فرستیم عکس بگیرد که ما متوجه شویم مشکل بیشتر کجا هست تا ذهن اشتراکی اعلام کنیم و مستقیما روی آن قسمت کار کنیم.

آتاکسی فردریش ataxi feredrish

اعلام میکنیم برای؛ اصلاح جهش ژنی در کروموزوم 9 + اصلاح نورونهای عصبی + اصلاح تشکیل میلین عصب

مسمومیت غذایی، همراه با تب و استفراغ

اعلام می کنیم برای؛ کنترل فعالیت اعصاب گوارشی پاراسمپاتیک و برای اسهال و بهبود فعالیت پرزهای روده ای و بازجذب آب از روده ها و دفع عامل عفونی

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

مسمومیت با دارو (آمپول استامینوفن)

اعلام میکنیم برای؛ احیا و حذف متابولیت سمی استامینوفن وبرداشت ان از سرم خون وهمچنین ترمیم سلولهای کبدی آسیب دیده

سندرم تونل کارپ مچ دست

دلیل سندرم تونل کارپ تحت فشار قرار گرفتن عصب مدین، غلاف تاندون هست که بهم چسیبیده است.

اعلام می کنیم برای؛ رفع چسبندگی اعصاب غلاف تاندونها و کاهش التهاب

بیماری E.T و pt

با توجه به بررسی مدارک آزمایشگاهی ارسالی مورد مذکور احتمال اختلال میلوپرولیفراتیو (بدخیمی های مغز استخوان) و اختلالات دیگری مطرح است شامل سیروز کبدی. واریس های عروقی در ناحیه مری و ناف کبد و سیستم صفراوی و ترمبوز وریدی در ناحیه عروق پورت که تمامی موارد می تواند مرتبط با اختلال سلولهای خونساز در مغز استخوان باشد....

اعلام میکنیم برای؛ فعال شدن مسیر آپپتوز برای حذف سلولهای بدخیم در مغز استخوان و اصلاح روند تقسیم سلولی در نواحی خونساز و حذف ترومبوز با افزایش انعقادپذیری و ترمیم دیواره عروق نواحی واریس شده و ترشح فاکتورهای ضد لخته (پلاسمین)

مرگ سلول های مغز در کودک ۶ ساله

(در صورتی که این بچه هم حرکت دست و پا داره هم وقتی صداش میکنی به سمت صدا برمیگرده میخنده غلط میزنه ولی حرف نمیزنه و راه هم نمیره و چیزی رو با دستش نمیگیره)

اعلام میکنیم برای ترمیم نورونهای تخریب شده در ناحیه آسیب دیده و همچنین برای بهبود ارتباطات بین نواخی قشری مغر با سایر نواحی (مراکز حرکتی و حسی. بینایی.گفتاری.شنوایی .لیمبیک و هیپوکمپ)

از کار افتادن مغز و هوشیاری صفر

اعلام برای بهبود ارتباطات مدارهای مغزی) ارتباطات کورتکس با مراکز هوشیاری (RAS)و مراکز تنفسی و تالاموس وهیپوکمپ(

کارکرد نامناسب طحال و کلیه و ریه و دستگاه گوارش و معده

(بیمار دختر ۳۶ ساله هستند که پزشک تشخیص طحال و کلیه و ریه و دستگاه گوارش بیشتر معده رو دادند که خوب کار نمی کنه)

Telegram.me/EHbooks کتابخانه عرفان حلقه

سوال کلی است. با توجه به علت بیماری برای هر قسمت کار می شود

ایدز

اعلام می کنیم برای؛ غیر فعال شدن ویروس HIV و جلوگیری از فعالیت مجدد ویروس و بهبود فعالیت سیستم ایمنی، افزایش سلولهای CD+T و فعالیت سلولهای ایمنی CD8+T در کنترل و مقابله با بیماریهای عفونی ناشی از ضعف سیستم ایمنی

استومیلیت و نکروز بافتی

برای استیومیلیت اعلام می کنیم برای؛ حذف عامل عفونی باکتریایی و فعالیت سلولهای سیستم ایمنی در برداشت مناطق نکروزه استخوانی و فاکتورهای ضدالتهاب در جهت کاهش درد و ادم ناحیه