
اسئلة علي جزء الفاكة العمل "بساتين"

- 1_ المجموع الجذري في اشجار الفاكة هو وتدي وعرضي ()
- 2_ المجموع الخضري مكون من 5 جزء ()
- 3_ الافرع ثلاث انواع رئيسية مسنة وثانوية وحديثة ()
- 4_ تسمى منطقة التفريع بالمنطقة التاجية ()
- 5_ تقسم البراعم حسب موضع النشأة الى ورقية وزهرية ()
- 6_ الازهار الخنثى كالموالح والخوخ ()
- 7_ من امثلة الازهار المؤنثة الزيتون والبكان ()
- 8_ تقسم البراعم حسب موضع النشأة الى ابطية وعرضية فقط ()
- 9_ من امثلة الازهار المؤنثة البابا والخيول ()
- 10_ الثمار عبارة عن مبيض ناضج بعد حدوث اخصاب وتلقيح ()

- 11_ الثمار الكاذبة عبارة عن مبيض غير ناضج وتخت
وانبوبة كاسية ()
- 12_ الانبوبة الكاسية في الثمار الكاذبة عبارة عن التحام
قواعد الاسدية والبتلات والسبلات ()
- 13_ التفاح والكمثرى والرمان ثمار كاذبة ()
- 14_ الثمار الغضة لا يظل جدار المبيض باجزائه الثلاثة في
حالة لينة ()
- 15_ من امثلة الثمار الغضة.....
(البلح_ الخوخ_ المانجو)
- 16_ في الثمار النصف غضة يجف الجزء المحيط بالبذرة
ويسمى Endo carp ()
- 17_ من امثلة الثمار نصف الجافة.....
(البكان_ الخوخ_ الكمثرى)
- 18_ الثمار الجافة Nutsfruit جف بها الاجزاء الثلاثة من
المبيض ()
- 19_ يراعى في المشاتل الا تكون الاراضي الخصبة خالية
من الاملاح ولها مصدر دائم من المياه العذبة ()
- 20_ من انواع الصوب
(الزجاجية - الثيران -المهاد - جميع ماسبق)
- 22_ الاجنة الجسمية الحضرية مشابهة للام ()

- 21_ كل الاكثار الجنسي بذري وليس كل الاكثار البذري جنسي ()
- 23_ تعدد الاجنة ينتج من حدوث تبرعم في نسيج النيوسيطة ()
- 24_ في التخزين الجاف للبذور تكون البذرة ذات نسبة رطوبة عالية ()
- 25_ الكمر البارد هو خليط من الطمي والبيتموس والرمل بنسبة (3:2:1) ()
- 26_ في اكمر البارد والتنضيد تكون البذرة في طور السكون ()
- 27_ تزرع الفاكهة متساقطة الاوراق بعد كسر طور السكون ()
- 28_ تزرع الفاكهة مستديمة الاوراق قبل طور السكون ()
- 29_ لا يفقد جنين المانجو حيويته بالتخزين ()
- 30_ عملية التفريد والنقل تتم للبادرات المنزرعة بكثافة عالية ()
- 31- يستخدم الاكثار الخضري في :
- أ- ترقيع الجور الغائبة
- ب- النباتات التي يصعب اكثارها بالبذرة
- ج- سرعة الوصول لمرحلة الاثمار
- د- جميع ما سبق

32- ينتج الاكثار الخضري نباتات كاملة غير مشابهة للام
()

33- في الاكثار بالعقلة يستخدم انواع عقل كالورقة البرعمية
او الجذرية ()

34- تقسم العقل الساقية حسب شكل القاعدة فقط ()

35- تقسم العقل الساقية حسب موقع العقلة في الفرع لطرفية
و عادية وتحت طرفية ()

36- شكل قاعدة العقل الساقية اما مستقيمة او مطرقة او ذات
كعب ()

37- سمك العقلة الجيدة 5سم وعمرها 3 سنوات ()

38- تستخدم العقل النادرة لإكثار الجور الغائبة ()

39- تستخدم العقل الملتفة لترقيع الجور الغائبة ()

40- تستخدم العقل الطويلة في الاراضي مرتفعة مستوى
المياه ()

٤١- تستخدم العقل علي شكل حرف راء من افرع اشجار
الزيتون ()

٤٢_ تجهز العقل الخشبية في موسم السكون ()

٤٣_ تخزن العقل الطرفية والورقية في اي وقت من السنة
()

٤٤_ تخزن العقل تحت طرفية والورقية البرعمية في طور السكون فقط ()

٤٥_ تخزن العقل الطرفية و تحت طرفية بنظام الري الضبابي في الصوب ()

٤٦_ من أنواع صعبة الاكثار....

(العنب – التين – الزيتون – الكمثري)

٤٧_ من انواع سهلة الإكثار...

(الكمثري – الخوخ – التفاح – الرمان)

٤٨_ من المعاملات التي تزيد من نسبة نجاح العقل قبل التجهيز المعاملة الهرمونية ()

٤٩_ من معاملات العقل قبل التجهيز.....

(الاظلام- الجروح الاضافية- التحليق – الاولي والثالثة)

٥٠_ من المعاملات للعقل بعد التجهيز المعاملة الهرمونية والجروح الاضافية ()

٥١_ الاظلام عميلة لتقليل الكلورفيل ويتحول النبات من منتج لمخزن ()

٥٢_ التحليق هو ازالة حلقة كاملة من قلف الخشب لزيادة تخزين المواد اعلي الحلقة المزالة ()

٥٣_ المعاملات الهرمونية للعقل من خلال.....

(IAA-IBA-NAA-جميع ماسبق)

٥٤_ يتم الاكثار بالخلف في نبات عشبي ذو فلقة كالموز ()

٥٥_ يتم الاكثار بالسرطنات في....

(الزيتون- التين- الرمان- جميع ما سبق)

٥٦-الاكثار بالترقيد مجهد لنبات الام ويعيق العمليات
الزراعية حول الاشجار ()

٥٧-من انواع الترقيد الهوائي...

(بالبولي إيثيلين – خندقي – هرمي)

٥٨-من انواع الترقيد الهوائي ثني الافرع بالاصص او
اصص ذات مفصلات ()

٥٩_من انواع الترقيد الأرضي

(الهرمي-المستمر-اللولبي-الخندقي- جميع ما سبق)

٦٠_ في الاكثار بالتطعيم الطعم مسئول عن النمو الخضري
و الثمري بينما الأصل مسئول عن الإمداد بالغذاء والماء
()

٦١_ جزء من فرع عليه أكثر من برعم يسمى

(تطعيم بالترقيد- بالقلم _ بالفسائل)

٦٢-الاكثار بالتطعيم ينتج نباتات مشابهة لنبات الأم ()

٦٣-انواع الاصول التي يجري عليها التطعيم عقل فقط ()

٦٤_ تستخدم العيون علي الافرع الناضجة وقت سريان
العصارة ليسهل فصل القلف عن الخشب ()

٦٥_ التطعيم بالعيون تقطع الافرع لاجزاء صغيرة من ١٥ ل
٢٠ سم ()

٦٦_ في التزير تترك الأعناق و تزال الإنصال ()

٦٧_ الأزرار الحابسة نسبة من البراعم تسكن في الربيع
()

٦٨_ نجاح الاكثار بالتطعيم يعتمد علي انتفاخ البراعم مع
الاحتفاظ باللون الاخضر و سقوط عنق الورقة ()

٦٩_ عملية التزير و التركيب القلبي والتركيب بالالصق تتم
اثناء سريان العصارة ()

٧٠_ التركيب بالشق والجانبى العظمي والمنضدي يتم اثناء
سكون العصارة ()

٧١_ في التطعيم بالعين يجهز اقلام الطعم ()

٧٢_ في التركيب بالقلم يجهز خشب الطعم ()

٧٣_ من انواع التطعيم التركيب بالقلم والتزير ()

٧٤_ من انواع التزير....

(الدرعى- الجانبى – القلبي-الشق)

٧٥_ من انواع التركيب بالقلم....

(الدرعى-الحلقى- القلبي- الرقعة)

٧٦_ في الاكثار بالانسجة تجهز غرفة الزراعة حيث يتواجد
بها laminar Air الهود ()

٧٧_ غرفة التحضين لزراعة الانسجة من مكونات المعمل
()

٧٨_ غرفة تجهيز البيئات لحفظ العينات ومنظمات النمو

()

٧٩_ من مكونات البيئة لزراعة الانسجة....

(فيتامينات – فحم نباتي نشط- اجار – جميع ما سبق)

٨٠_ يوكل في الثمرة الجافة المتخشبة الجنين ()

٨١_ نباتات ذات الفلقة يوجد بها أفرع و ذات الفلقتين لا

يوجد بها ()

هنبقي ننزل الاجابات علي القناة ان شاء الله

<https://t.me/cairouniver>

Rahma.mohamed. :")