



محتويات الوحدة

الصفحة	الموضوع
	المقدمة
	تمهيد
	اهداف الوحدة
	1. تعريف القطع الزائد وعناصره
	2. المعادلة القياسية للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل
	3. إيجاد عناصر القطع الزائد
	4. اشتقاق المعادلات بصورة عامة
	5. إيجاد العناصر من المعادلة العامة
	6. معادلة المماس والعمودي على المماس
	الخلاصة
	لمحة مسبقة عن الوحدة الدراسية التالية
	إجابات التدريبات
	إجابات اسئلة التقويم الذاتي
	مسرد المصطلحات
	المراجع

مقدمة

تمهيد

نقدم إليك عزيزي الدارس الوحدة الرابعة من مقرر 161 رياضيات (1) الهندسة التحليلية وهي بعنوان " القطع الزائد " .

إن القطع الزائد هو أحد القطوع المخروطية والتي تنتج من خلال قطع مخروط بسطح مستو ، وكغيره من القطوع فهو ذو اهمية كبيرة في علم الرياضيات ويرتبط ايضاً بعلوم أخرى كعلم الفيزياء والفلك وغيرها من العلوم.

وسف نتعرف في هذه الوحدة على تعريف القطع الزائد وعناصره مثل البؤرتين والرأسين ومحاور التماثل ومعادلة القطع الزائد بالصورة القياسية والصورة العامة ومعادلة المماس للقطع الزائد ومعادلة العمودي على المماس والرسم البياني لمنحنى القطع والاختلاف المركزي.

اهلاً بك مرة أخرى في هذه الوحدة ، نرجو أن تستمتع بدراستها أن تساهم في تقييمها.

أهداف الوحدة



عزيزي الدارس، بعد فراغك من دراسة هذه الوحدة ينبغي أن تكون قادراً على أن

1. تعرف القطع الزائد .
2. تشتق معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل .
3. تشتق معادلة القطع الزائد الذي مركزه $M(h, k)$.
4. تجد خصائص القطع الزائد
5. تعرف الاختلاف المركزي للقطع الزائد .
6. تؤسم منحنى القطع الزائد .
7. تجد معادلة المماس عند نقطة للقطع الزائد .
8. تجد معادلة العمودي على المماس عند نقطة للقطع الزائد .
9. تشرح مفهوم المحل الهندسي للقطع الزائد .

1. تعريف القطع الزائد وعناصره

سنتعرف في هذه الوحدة على نوع آخر من القطوع المخروطية وهو القطع الزائد. حيث سنتناول في هذا البند تعريف وعناصر القطع الزائد .
لتكن $F_1(-5, 0)$, $F_2(5, 0)$ نقطتين في المستوى الديكارتي نعينهما في المستوى ولنأخذ النقاط التالية :


$$D\left(5, \frac{9}{4}\right), W\left(6, \frac{\sqrt[3]{5}}{2}\right), D'\left(-5, \frac{9}{4}\right), W'\left(-6, \left(\frac{\sqrt[3]{5}}{2}\right)\right)$$

$$D''\left(5, \frac{-9}{4}\right), W''\left(6, \frac{\sqrt[3]{5}}{2}\right), E\left(-5, \frac{-5}{4}\right)$$

$$Q\left(-6, \frac{-\sqrt[3]{5}}{2}\right)$$

ثم نعين هذه النقطة في المستوى الاحداثي ونصل بينهما بخط منحن ممهد متصل فنحصل على المنحنى الموضح في الشكل (1) .

الشكل رقم (1)



وبحساب الفرق المطلق لبعدي النقطة $D\left(5, \frac{9}{4}\right)$ عن النقطتين F_1, F_2 نجد أن:

$$|D F_1 - D F_2| = \left| \sqrt{(5+5)^2 + \left(\frac{9}{4}\right)^2} - \sqrt{\left(\frac{9}{4}\right)^2} \right| = 8$$

ونلاحظ أيضاً أن الفرق المطلق لبعدي النقطة $W\left(6, \frac{\sqrt[3]{5}}{2}\right)$ عن النقطتين F_1, F_2 يساوي:

$$\left| \sqrt{(6+5)^2 + \left(\frac{\sqrt[3]{5}}{2}\right)^2} - \sqrt{(6-5)^2 + \left(\frac{\sqrt[3]{5}}{2}\right)^2} \right|$$

$$= \left| \sqrt{\frac{529}{4}} - \sqrt{\frac{49}{4}} \right|$$

$$= \left| \frac{23}{2} - \frac{7}{2} \right| = \left| \frac{16}{2} \right| = 8$$

ويكون هذا صحيحاً لبقية النقط الواقعة على المنحنى كما في الشكل (1) .
وبشكل عام: لتكن F_1, F_2 نقطتين في المستوى الديكارتي ، تامسافة بينهما $2c$ وليكن $2a$ عدداً حقيقياً موجباً حيث $2c > 2a$ وإذا كانت $N(x, y)$ أي نقطة في المستوى الديكارتي تتحرك بحيث إن الفؤق المطلق بين بعديهما عن النقطتين F_1, F_2 يكون دائماً ، مساوياً للعدد الثابت $2a$ ، فإنها ترسم منحنياً هو المحل الهندسي لها ، يسمى قطعاً زائداً وبناءً عليه فإن:


تعريف (1)

القطع الزائد هو المحل الهندسي لمجموعة النقط المستوية $N(x, y)$ والتي تتحرك بحيث يكون الفرق المطلق بين بعدي $N(x, y)$ عن نقطتين ثابتتين F_1, F_2 (تسميان البؤرتين) يساوي مقدار ثابت.

* عناصر القطع الزائد:

بالنظر إلى الشكل (2) نلاحظ الخصائص التالية للقطع الزائد وهي:

الشكل (2)



(1) للقطع الزائد محوران للتماثل هما:

(a) المستقيم المار بالبؤرتين F_1, F_2 والمركز O يسمى المحور البؤري أو المحور القاطع.

(b) المستقيم العمودي على المحور القاطع والمار بالمركز O ويسمى المحور المرافق.

- (2) مركز القطع الزائد هو النقطة O.
- (3) رأسا القطع الزائد هما النقطتان v, v' .
- (4) يسمى البعد بين البؤرتين $(F_1 F_2)$ البعد البؤري ويساوي $2c$.
- (5) نصف البعد البؤري هو المسافة بين البؤرة والمركز ويساوي c .
- (6) البعد بين الرأسين $(v v') =$ طول المحور القاطع ويساوي $2a$.
- (7) طول القطعة المستقيمة $(R R') =$ طول المحور المرافق ويساوي $2b$.

تعريف (2):


الاختلاف المركزي للقطع الزائد هو النسبة بين نصف البعد البؤري إلى نصف طول المحور القاطع ويرمز له بالرمز $e = \frac{c}{a}$

وبما أن $c > a$ إذن $e > 1$ أي الاختلاف المركزي في القطع الزائد اطر من واحد صحيح .

مثال (1):

أوجد العناصر الأساسية للقطع الزائد في الشكل (3)

الشكل (3)



الحل:

- (1) طول المحور القاطع $(v v') : vv' = 2a = 2 \times 3 = 6$
- (2) طول المحور المرافق $(R R') : R R' = 2b = 2 \times 2 = 4$


(3) البعد البؤري $(F_1 F_2)$: $F_1 F_2 = 2c = 2 \times 5 = 10$

(4) الاختلاف المركزي (e) : $e = \frac{c}{a} = \frac{5}{3} > 1$

تدريب (1)

أوجد طول المحور القاطع و المرافق والبعد البؤري والاختلاف المركزي للقطع المرسوم في الشكل (4):


الشكل (4)



2. المعادلة القياسية للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل

في هذا البند سوف نشق المعادلة القياسية للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ومحوره القاطع ينطبق على محور x أو محور y .
 أولاً: القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ومحوره القاطع ينطبق على محوره x .
 لنأخذ القطع الزائد في الشكل (5).

الشكل (5)



ونطبق تعريف القطع الزائد:

$$|NF_1 - NF_2| = 2a \quad \text{أي أن:}$$

$$NF_1 - NF_2 = \pm 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$$

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \quad \text{أو:}$$

وبتربيع الطرفين:

$$(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2$$

وبفك الأقواس والاختصار:

$$x^2 + 2cx + c^2 + y^2 = 4a^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + x^2 - 2cx + c^2 + y^2$$

وبتبسيط المعادلة :

$$\pm a \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - cx$$

وبتربيع الطرفين :

$$a^2(x^2 - 2cx + c^2 + y^2) = a^4 - 2a^2 cx + c^2 x^2$$

$$a^2 x^2 - 2a^2 cx + a^2 c^2 + a^2 y^2 = a^4 - 2a^2 cx + c^2 x^2$$

$$a^2 x^2 + a^2 c^2 + a^2 y^2 = a^4 + c^2 x^2$$

$$a^2 x^2 - c^2 x^2 + a^2 y^2 = a^4 - a^2 c^2$$

$$x^2 (a^2 - c^2) + a^2 y^2 = a^2 (a^2 - c^2)$$

وبقسمة طرفي المعادلة على $(a^2 - c^2)$ نجد:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

وبما أن $a < c$ من تعريف القطع الزائد وأن كلاً من العددين a و c موجب فإن المتباينة

$a < c$ لا تتغير بتربيع طرفيها أي أن $a^2 < c^2$ أي $a^2 - c^2 < 0$.

وإذا عرفنا المقدار الثابت b بالشكل $-b = a^2 - c^2$

فإننا نستطيع كتابة المعادلة :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{a^2 - c^2} = 1$$

بالصورة :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

حيث a, b عدنان حقيقيان موجبان .


ويطلق على العلاقة (1) الصورة القياسية لمعادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل

ومحوره القاطع ينطبق على محور x حيث أن :

$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

ثانياً: وإذا كانت البؤرتان للقطع الزائد هما $F_1(0, -c)$, $F_2(0, c)$ فيكون المحور القاطع منطبقاً على محور y كما في الشكل (6) .

الشكل (6)



وبالأسلوب السابق نفسه في إيجاد معادلة القطع تحصل على معادلة أخرى قياسية للقطع الزائد هي :

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad \dots(2)$$

حيث a, b عدنان حقيقيان موجبان ، $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

ويطلق على العلاقة (2) الصورة القياسية لمعادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ومحوره القاطع ينطبق على محور y .

ملاحظات:

(1) a^2 دائماً مقام الكسر الأول والمتغير الموجود في البسط الذي مقامه a^2 يكون دائماً هو المحور القاطع أو يكون المحور القاطع يوازيه .

(2) من المعادلة : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2} = 1$

أي أن :

$$x^2 - y^2 = a^2 \dots \dots *$$

ويسمى القطع الزائد الذي معادلته على صورة المعادلة (*) القطع الزائد متساوي الاضلاع.

$$(3) \text{ قيمة } c \text{ تعطى دائماً بالعلاقة : } c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

مثال (2):


أوجد معادلة القطع الزائد الذي بؤرتاه $(\pm 4, 0)$ ويتقاطع مع محور x عند $x = \pm 3$

الحل :

بما أن البؤرتين تقعان على محور x ، إذن محوره القاطع ينطبق على محور x ، ومركزه $(0,0)$ انظر الشكل (7) .

لاحظ أن: $C = 4$, $a = 3$

الشكل (7)



ومن العلاقة $c = \sqrt{a^2 + b^2}$

$$c^2 = a^2 + b^2$$

$$b^2 = c^2 - a^2 = 16 - 9 = 7$$

$$b = \pm\sqrt{7}$$

إذن معادلته :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

وبتعويض قيم a^2 , b^2 نجد أن :

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{7} = 1$$

مثال (3):

أوجد معادلة القطع الزائد الذي محوره القاطع ينطبق على محور x ومركزه نقطة الأصل وطول محوره القاطع (8) والمرافق (4)
الحل:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ : المعادلة هي}$$

$$2a = 8 \Rightarrow a = 4 \text{ : طول المحور القاطع}$$

$$2b = 4 \Rightarrow b = 2 \text{ : طول المحور المرافق}$$

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1 \text{ : إذن المعادلة هي}$$

مثال (4):

جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ويمر بمنحناه بالنقطة (2,3) وطول محوره المرافق (2,√3) ثم ارسم منحناه.

الحل : (يوجد حلان)

أولاً: نفرض أن محوره القاطع ينطبق على محور x ومعادلته :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$2b = 2\sqrt{3} \Leftarrow$$

$$b = \sqrt{3}$$

طول المحور المرافق

إذن تصبح المعادلة:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{3} = 1$$

وبما أن منحناه يمر بالنقطة (2,3) إذن تحقق معادلته :

$$\frac{4}{a^2} - \frac{9}{3} = 1 \Rightarrow \frac{4}{a^2} - 3 = 1$$


$$\frac{4}{a^2} = 4 \Rightarrow$$

$$a^2 = 1$$

إذن تصبح المعادلة :

$$\frac{x^2}{1} - \frac{y^2}{3} = 1$$

انظر الشكل (8)



ثانياً: نفرض أن محوره القاطع ينطبق على محور x

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1 \quad \text{ومعادلته:}$$

$$2b = 2\sqrt{3}b = \sqrt{3} \Leftrightarrow \Leftrightarrow \text{طول المحور المرافق}$$

$$\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{3} = 1 \quad \text{إذن تصبح المعادلة :}$$

وبما أن منحناه يمر بالنقطة (2,3) إذن فهي تحقق معادلته :

$$\frac{9}{a^2} - \frac{4}{3} = 1$$

$$\frac{9}{a^2} = 1 + \frac{4}{3}$$

$$\frac{9}{a^2} = \frac{7}{3}$$

بالضرب التبادلي:

$$7a^2 = 27$$
$$a^2 = \frac{27}{7}$$


إذن تصبح المعادلة :

$$\frac{y^2}{\frac{27}{7}} - \frac{x^2}{3} = 1$$

إي أن :


$$\frac{7y^2}{27} - \frac{x^2}{3} = 1$$

انظر الشكل (9)



تدريب (2)

جد معادلة قطع زائد بؤرتاه (7 ± 0) وطول محوره القاطع (8) وحدات .



أسئلة تقويم ذاتي



(1) جد معادلة قطع زائد بؤرتاه $(0,6\pm)$ ويتقاطع مع محور y عند $y = \pm 4$.

(2) جد معادلة القطع الزائد الذي طول محوره المرافق (4) وحدات وبؤرتاه $(0, \pm\sqrt{8})$ ثم ارسم منحناه.

(3) جد معادلة قطع زائد مركزه نقطة الأصل وإحدى بؤرتيه $(2,0)$ ويمر منحناه بالنقطة $(2,3)$.

3. إيجاد عناصر القطع الزائد

في هذا البند سوف نتعلم كيف نجد عناصر القطع الزائد الذي معادلته على الصورة (1) أو (2) والامثلة التالية توضح ذلك :
مثال (5):

أوجد بؤرتي ورأسي وطولي المحورين القاطع والمرافق ومعادلاتهما والاختلاف المركزي للقطع الزائد:

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{1} = 1$$

ثم ارسم المنحنى البياني له
الحل:

احداثيات المركز $(0,0)$

$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$$

وبما ان البسط الذي مقامه a^2 يحتوي على المتغير x ورأس القطع هو نقطة الأصل

اذن المحور القاطع ينطبق على محور x إذن احداثيات الرأسين $(\pm 2, 0)$

$$2a = 2 \times 2 = 4 \Leftarrow \text{طول المحور القاطع}$$

ومعادلته $y = 0$

$$b^2 = 1 \Rightarrow b = 1 \text{ الثاني}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 = 4 + 1 = 5 \Rightarrow c = \sqrt{5} \text{ ولكن}$$


إذن احداثيات البؤرتين $(\pm\sqrt{5}, 0)$

$$2b = 2 \times 1 = 2 \Leftarrow \text{طول المحور المرافق}$$

$$x = 0 \text{ ومعادلته}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{5}}{2} > 1 \Leftarrow \text{الاختلاف المركزي}$$

انظر الشكل (10)



مثال (6):

أوجد بؤرتي ورأسي وطولي المحورين القاطع والمرافق ومعادلاتهما واختلاف المركزي للقطع الزائد .

$$\frac{y^2}{81} - \frac{x^2}{25} = 1$$

الحل:

احداثيات المركز $(0,0)$

$$a^2 = 81 \Rightarrow a = 9 \text{ الأول}$$

وبما أن بسط a^2 يحتوي على المتغير y إذن المحور القاطع ينطبق على محور y .

إذن احداثيات الرأسين $(0, \pm 9)$

$$2a = 2 \times 9 = 18 \Leftarrow \text{طول المحور القاطع}$$

$$x = 0 \text{ ومعادلته}$$

$$b^2 = 25 \Rightarrow b = 5 \text{ الثاني}$$

$$2b = 2 \times 5 = 10 \Leftarrow \text{طول المحور المرافق}$$

$$\text{ومعادلته } y = 0$$

$$\text{لكن : } c^2 = a^2 + b^2 = 81 + 25 = 106$$

$$c = \sqrt{106}$$

$$\text{إحداثيات البؤرتين } (0, \pm\sqrt{106})$$

$$\Leftarrow \text{الاختلاف المركزي}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{106}}{9} > 1$$

مثال (7):

أوجد العناصر الأساسية للقطع الزائد:

$$4x^2 - 16y^2 = 64$$

نكتب المعادلة بالصورة القياسية:

نقسم جميع الحدود على 64 فنحصل على :

$$\frac{x^2}{\frac{64}{4}} - \frac{y^2}{\frac{64}{16}} = 1$$

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$$

إحداثيات الرأس (0,0)

$$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$$

وبما أن بسط a^2 يحتوي على المتغير x إذن المحور القاطع ينطبق على محور x إذن

الرأسان $(\pm 4, 0)$

$$\text{طول المحور القاطع : } 2a = 2(4) = 8$$

$$\text{ومعادلته } y = 0$$

$$b^2 = 4 \Rightarrow b = 2$$

$$\text{طول المحور المرافق } 2b = 2(2) = 4$$

ومعادلته : $x = 0$

ولكن : $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 4 = 20$

$$c = \sqrt{20}$$

إذن إحداثيات البؤرتين $(\pm\sqrt{20}, 0)$


الاختلاف المركزي :

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{20}}{4} > 1$$

تدريب (3)

اكتب المعادلة التالية بالصورة القياسية:

$$2x^2 - 4y^2 = 8$$



أسئلة تقويم ذاتي



1- جد إحداثيات المركز والرأسين والبؤرتين ومعادلة كل من المحورين

القاطع والمرافق وطولهما للقطع الزائد :

$$\frac{x^2}{49} - \frac{y^2}{16} = 1$$

2- جد إحداثيات المركز والرأسين والبؤرتين ومعادلة كل من المحورين

القاطع والمرافق وطولهما للقطع الزائد:

$$16x^2 - 9y^2 = 144$$

3- احسب طول المحور القاطع للقطع الزائد:

$$\frac{x^2}{8} - \frac{y^2}{5} = 1$$

4- إذا كانت : $9x^2 - 25y^2 + 225 = 0$ تمثل معادلة قطع زائد وكانت N

(x, y) نقطة واقعة عليه فجد الفرق المطلق بين بعدي النقطة N عن بؤرتي

هذا القطع .

4. اشتقاق المعادلات بصورة عامة

في هذا البند سوف نشق معادلات عامة للقطع الزائد الذي مركزه $M(h, k)$ ومحوره القاطع يوازي محور x او يوازي محور y .
أولاً: إذا كان محوره القاطع يوازي محور x .

وفي هذه الحالة نجري إنسحاب للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ومحوره القاطع ينطبق على محور x وستكون معادلته كما نعرف بالنسبة للمحاور x', y' الجديدة هي:

$$\frac{x'^2}{a^2} - \frac{y'^2}{b^2} = 1 \dots (*)$$

ومن علاقة الانسحاب:

$$\begin{aligned} x' &= x - m \\ y' &= y - n \end{aligned}$$

نطبق هذه العلاقة على المحاور الجديدة x', y' والتي مركزها $M(h, k)$ فينتج أن :


$$\begin{aligned} x' &= x - h \\ y' &= y - k \end{aligned}$$

نعوض قيم x', y' في المعادلة (*) فينتج أن :

$$\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1 \dots (1)$$

وتسمى العلاقة (1) معادلة قطع زائد مركزه $M(h, k)$ ومحوره القاطع يوازي محور x (انظر الشكل (11)).

الشكل (11)



ملاحظات:

من خلال الشكل (11) نستطيع كتابة الملاحظات التالية :

1- المحور القاطع يوازي محور x وطوله $2a$ ومعادلته $y = k$.

2- المحور المرافق يوازي محور y ومعادلته $x = h$.

3- احداثيات البؤرتين: $F_1(-c + h, k)$, $F_2(c + h, k)$

4- احداثيات الرأسين: $V'(-a + h, k)$, $V(a + h, k)$

ثانياً: إذا كان محوره القاطع يوازي محور y

وفي هذه الحالة نجري انسحاب للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل ومحوره القاطع ينطبق على محور y ، وستكون معادلته كما نعرف بالنسبة للمحاور $x' y'$ الجديدة هي:

$$\frac{y'^2}{a^2} - \frac{x'^2}{b^2} = 1 \quad (**) \dots\dots\dots$$

وبالتعويض بقيم $x' = x - h$

$y' = y - k$


في المعادلة (**) نحصل على :

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1 \quad (2)' \dots\dots\dots$$

تسمى العلاقة (2)' معادلة

$M(h, k)$ ومحوره يوازي محور y انظر الشكل (12) .

الشكل (12)



ملاحظات :

وبالنظر الى الشكل (12) نستطيع كتابة الملاحظات التالية :

- (1) المحور القاطع يوازي محور y وطوله $2a$ ومعادلته $x = h$.
- (2) المحور المرافق يوازي محور x وطوله $2b$ ومعادلته $y = k$.

(3) احداثيات البؤرتين : $F_1(h, -c+k)$

$F_2(h, c+k)$

(4) احداثيات الرأسين :

$V(h, -a+k)$

$V'(h, a+k)$

مثال (8):

أوجد معادلة قطع زائد محوره القاطع مواز لمحور y ومركزه النقطة $(1, -2)$ وطول محوره القاطع (8) والبعد البؤري له يساوي (10) .

الحل:

بما أن المحور القاطع يوازي محور y غذن المعادلة :

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

طول المحور القاطع : $2a = 8 \Rightarrow a = 4$

البعد البؤري: $2c = 10 \Rightarrow c = 5$

ومن العلاقة: $c^2 = a^2 + b^2$

$$b^2 = c^2 - a^2 = 25 - 16 = 9$$

$$b = 3$$

وبتعويض احداثيات المركز $(1, -2)$ وقيم a, b في المعادلة نجد أن :

$$\frac{(y-1)^2}{16} - \frac{(x+2)^2}{9} = 1$$

مثال (9):

جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه $(-4, 7)$ وطول محوره القاطع (8)

الحل :

بما أن البؤرة والمركز على مستقيم يوازي محور x ومركزه $(-4, 2)$ إذن المعادلة :

$$\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$$

طول المحور القاطع : $2a = 8 \Rightarrow a = 4$

$$c = 7 - 2 = 5$$

$$b^2 = c^2 - a^2$$

$$= 25 - 16 = 9$$

وبتعويض احداثيات المركز وقيم a, b في المعادلة :


نجد أن :

$$\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y+4)^2}{9} = 1$$

تدريب (4)

أوجد معادلة قطع زائد بؤرتاه $(5, 2)$, $(-1, 2)$ ورأساه $(0, 2)$, $(2, 2)$

(4)



أسئلة تقويم ذاتي



- 1- جد معادلة قطع زائد مركزه (3, 2) وإحدى بؤرتيه (3, 8) والبعد بين رأسيه بمقدار (6) عن البعد بين بؤرتيه .
- 2- جد معادلة قطع زائد بؤرتاه (1, 0) , (1, 6) ورأساه (1, 1) , (1, 5)
- 3- جد معادلة قطع زائد إحدى بؤرتيه (4, 3) ومركزه (-4, 3) وطول محوره القاطع (10).

5. إيجاد العناصر من المعادلة العامة

في هذا البند سوف نجد عناصر القطع الزائد والذي معادلته معطاه بالصورة العامة والأمثلة التالية توضح ذلك :

مثال (10):

أوجد العناصر الأساسية للقطع الزائد

$$\frac{(x+1)^2}{4} - \frac{(y-1)^2}{2} = 1$$

ثم ارسم منحناه .

الحل:

إحداثيات المركز M(-1,1)

$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2$$

وبما أن بسط a^2 يحتوي على المتغير x إذن المحور القاطع يوازي محور x إحداثيات

$$V(-a+h, k) = V(-2+(-1), 1) = V(-3, 1)$$

$$V'(a+h, k) = V(2+(-1), 1) = V(1, 1)$$

$$2a = 2 \times 2 = 4 \quad \text{طول المحور القاطع :}$$

$$Y = k \Rightarrow y = 1 \quad \text{ومعادلته :}$$

$$\text{الثاني} = b^2 = 2 \Rightarrow b = \sqrt{2}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 : \text{ومن العلاقة}$$

$$= 4 + 2 = 6$$

$$c = \sqrt{6}$$

إذن إحداثيات البؤرتين :

$$F_1 (-c + h, k) = F_1 (-\sqrt{6} + (-1), 1) = F_1 (-\sqrt{6} - 1, 1)$$

$$F_2 (c + h, k) = F_2 (\sqrt{6} + (-1), 1) = F_2 (\sqrt{6} - 1, 1)$$


$$2b = 2 \times \sqrt{2} = 2\sqrt{2} : \text{طول المحور المرافق}$$

$$x = h \Rightarrow x = -1 : \text{معادلته}$$

$$e = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{6}}{2} : \text{الاختلاف المركزي}$$

ورسمة المنحنى كما في الشكل (13)

الشكل (13)



مثال (11):

أوجد العناصر الأساسية للقطع الزائد الذي معادلته :

$$\frac{(y-1)^2}{8} - \frac{(x-2)^2}{8} = 1$$

ثم ارسم منحناه:

الحل:

احداثيات المركز $M(h, k) = M(2, 1)$

$$a^2 = 8 \Rightarrow a = \sqrt{8}$$

وبما أن بسط a^2 يحتوي على المتغير y إذن المحور القاطع يوازي محور y .

$$2a = 2\sqrt{8} : \text{طول المحور القاطع}$$

$$x = h \Rightarrow x = 2 : \text{معادلته}$$

احداثيات الرأسين :

$$V(h, -a + k) = (2, -\sqrt{8} + 1)$$

$$V'(h, a + k) = (2, \sqrt{8} + 1)$$

$$b^2 = 8 \Rightarrow b = \sqrt{8} : \text{الثاني}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 : \text{ولكن}$$

$$= 8 + 8 = 16$$

$$C = 4$$

$$2b = 2\sqrt{8} : \text{طول المحور المرافق}$$

$$y = k \Rightarrow y = 1 : \text{معادلته}$$


احداثيات البؤرتين :

$$F_1(h, -c + k) = (2, -4 + 1) = (2, -3)$$

$$F_2(h, c + k) = (2, 4 + 1) = (2, 5)$$


ومنحنى القطع كما في الشكل (14).

الشكل (14)



تدريب (5)

عين نوع المنحنى الممثل بالمعادلة : $9x^2 - 16y^2 - 36y = 124$
ثم اوجد عناصره الأساسية ، ثم ارسم منحناه



أسئلة تقويم ذاتي

1- اوجد المركز واحداثيات الرأسين والبؤرتين وطول المحور القاطع والمرافق ومعادلاتهما والاختلاف المركزي للقطع الزائد الذي معادلته:

$$\frac{(x-2)^2}{36} - \frac{(y-3)^2}{25} = 1$$

2- أوجد احداثيات البؤرتين والرأسين والمركز وطول المحور القاطع والمرافق ومعادلاتهما والاختلاف المركزي للقطع الزائد الذي معادلته:

$$\frac{(y-5)^2}{81} - \frac{(x+4)^2}{64} = 1$$



6. معادلة المماس والعمودي على المماس

في هذا البند سوف نتعرف على معادلة المماس و العمودي على المماس لمنحنى القطع الزائد :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

عند النقطة (x_1, y_1) .

وإن معادلة هذا المماس تعطى بالعلاقة التالية :

$$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

وميل هذا المماس يعطى بالعلاقة التالية :

$$m_1 = \frac{b^2 x_1}{a^2 y_1}$$

حيث m_1 : ميل المماس :

وميل العمودي على المماس عند النقطة (x_1, y_1) = $\frac{-1}{\text{ميل المماس}}$

$$m_2 = \frac{-1}{m_1}$$

أي :

حيث m_2 ميل العمودي على المماس .

مثال (12):

أوجد معادلة المماس و العمودي على المماس لمنحنى القطع الزائد : $x^2 - 9y^2 = 9$ عند النقطة $(5, \frac{4}{3})$

الحل:

النقطة $(5, \frac{4}{3})$ تقع على منحنى القطع لأنها تحقق معادلته .

نقسم جميع الاطراف على (9)

$$\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{1} = 1$$

ومعادلة المماس هي :

$$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

وبالتعريف بقيمة (x_1, y_1) وقيم a, b نجد :

$$\frac{5x}{9} - \frac{\frac{4}{3}y}{1} = 1$$

$$\frac{4}{3} y = \frac{5}{9} x - 1$$

$$y = \frac{5}{12} x - \frac{3}{4}$$

ميل المماس:

$$m_1 = \frac{b^2 x_1}{a^2 y_1}$$

إذن العمودي:

$$m_2 = \frac{-1}{m_1} = \frac{-1}{\frac{5}{12}} = \frac{-12}{5}$$

إذن معادلة العمودي على المماس

$$y - y_1 = m_2 (x - x_1)$$

$$y - \frac{4}{3} = \frac{-12}{5} - (x - 5)$$

$$y - \frac{4}{3} = \frac{-12}{5} - x + 5$$

$$y = \frac{-12}{5} x + 12 + \frac{4}{3}$$

أسئلة تقويم ذاتي

إذا كانت $x^2 - 4y^2 = 16$

تمثل معادلة قطع زائد أوجد .



- 1) ميل المماس لمنحنى القطع الزائد عند النقطة $(\sqrt{32}, 2)$.
- 2) أوجد معادلة المماس لمنحنى القطع الزائد عند النقطة $(\sqrt{32}, 2)$.
- 3) أوجد معادلة العمودي على المماس عند النقطة $(\sqrt{32}, 2)$.

الخلاصة

عزيزي الدارس، مع نهاية هذه الوحدة دعنا نستعرض معاً أهم النقاط التي وردت فيها:

(1) تعريف القطع الزائد : وهو المحل الهندسي لمجموعة النقط المستوية $N(x, y)$ بحيث يكون الفرق المطلق بين بعدي $N(x, y)$ عن نقطتين ثابتين F_1, F_2 يساوي مقداراً ثابتاً .

(2) الاختلاف المركزي : وهو بالنسبة بين نصف البعد البؤري إلى نصف طول المحور القاطع ويرمز له بالرمز e حيث $e = \frac{c}{a}$

(3) المعادلة القياسية للقطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل وهي :

(A) محورها القاطع ينطبق على محور x ومعادلته : $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

(B) محوره القاطع ينطبق على محور y ومعادلته : $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

(4) المعادلة القياسية للقطع الزائد الذي مركزه (h, k) وهما :

(A) محوره القاطع الذي يوازي محور x ومعادلته : $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

(B) محوره القاطع يوازي محور y ومعادلته : $\frac{(y-k)^2}{a^2} - \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$

(5) إيجاد عناصر القطع وهي احادثيات المركز والبؤرتين والرأسين وطول المحور القاطع والمرافق ومعادلاتهما والاختلاف المركزي ورسم منحنى القطع .

6- إيجاد معادلة المماس لمنحنى القطع الزائد :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$

عند النقطة (x_1, y_1) وهي :

$$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

(7) إيجاد معادلة العمودي على المماس لمنحنى القطع الزائد عند نفس النقطة (x_1, y_1)

وهي : $y - y_1 = m_2 (x - x_1)$

حيث m_2 ميل العمودي وتساوي $-\frac{1}{m_1}$ ، حيث m_1 ميل المماس

$$m_1 = \frac{b_1 x_1}{a^2 y_2} : \text{وتعطى بالعلاقة}$$

لمحة مسبقة عن الوحدة الدراسية التالية

عزيزي الدارس، نستعرض في الوحدة الأخيرة تعميماً للوحدات الاربعة الأول، حيث نتناول المعادلة العامة من الدرجة الثانية" وكيف نحدد أي قطع تمثل تلك المعادلة، وكيفية رسمها في الفضاء الثلاثي ضمن المحاور الديكاريتية او الكروية. إنها وحدة ممتعة بحق، أرجو أن تجدها سهلة ومشوقة .

إجابات التدريبات

تدريب (1)


طول المحور القاطع : $2a = 2(2) = 4$

طول المحور المرافق : $2b = 2(1) = 2$

البعد البؤري : $2c = 2(4) = 8$

الاختلاف المركزي : $e = \frac{c}{a} = \frac{4}{2} = 2 > 1$

تدريب (2) انظر الشكل



نلاحظ أن $c = 7$

طول المحور القاطع $= 8$ أي $a = 4 \Rightarrow 2a = 8$

لكن $c^2 = a^2 + b^2$

$b^2 = c^2 - a^2 = 49 - 16 = 33 \Rightarrow b = \sqrt{33}$

المعادلة :

$$\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{33} = 1$$

تدريب (3)

$$\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{2} = 1$$

تدريب (4)

$$(2,2) = \left(\frac{4+0}{2}, \frac{2+2}{2} \right) = \text{احداثيات المركز}$$

$$a = 4 - 2 = 2$$

$$c = 5 - 2 = 3$$

$$b^2 = c^2 - a^2 = 9 - 4 = 5$$

إذن المعادلة هي :

$$\frac{(x-2)^2}{4} - \frac{(y-2)^2}{5} = 1$$

تدريب (5)

$$9x^2 - 36x - 16y^2 + 32y = 124$$

$$9(x^2 - 4x) - 16(y^2 - 2y) = 124$$

$$9(x^2 - 4x + 4) - 16(y^2 - 2y + 1) = 124 + 36 - 16$$

$$9(x-2)^2 - 16(y-1)^2 = 144$$

$$\frac{(x-2)^2}{16} - \frac{(y-1)^2}{9} = 1$$

معادلة قطع زائد مركزه (2,1)

$$a^2 = 16 \Rightarrow a = 4$$

وبما أن بسط a^2 يحتوي على المتغير x ، إذن المحور القاطع يوازي محور x ،

$$2a = 2(4) = 8 \Leftarrow \text{طول المحور القاطع}$$

ومعادلته : $y = 1$

$$b^2 = 9 \Rightarrow b = 3$$


$$c^2 = a^2 + b^2 = 25 \Rightarrow$$

$$c = 5$$

ومعادلته : $x = 2$

احداثيات الرأسين : (6 , 1) , (-2, 1)

احداثيات البؤرتين: $(-3, 1)$ $(7, 1)$
منحناه كما في الشكل:



مسرد المصطلحات

* قطع زائد Hyperbola

هو المحل الهندسي للنقطة $N(x, y)$ المتحركة في المستوى بحيث يكون الفرق المطلق لبعديهما عن نقطتين ثابتتين (تسميان البؤرتين) يساوي مقداراً ثابتاً .

* الاختلاف المركزي Eccentricity

وهي نسبة تحدد نوع القطع المخروطي و كما يلي :

$e = 1$ للقطع المكافئ ، $e > 1$ للقطع الزائد ، $0 < e < 1$ للناقص

* إنسحاب المحاور Translation of Axes

هو تحويل هندسي للمحاور للحصول على نظام جديد $x' y'$ من النظام القديم $x y$ بحيث

$$x' = x - m$$

تكون $y' = y - n$ ، حيث (m, n) إحداثيات مركز النظام $x' y'$ عن إنسحاب النظام $x y$.

المراجع العربية والاجنبية

المراجع العربية:

- 1- عوض عدنان؛ وعزام، مفيد ؛ وعلاونه، أحمد؛ وعثمان، أحمد ، الهندسة الاحداثية، عمان: جامعة القدس المفتوحة، ط 2 ، 2003 .
- 2- نصير، عبدالمجيد؛ والناشف، بسام، الحسبان: التفاضل والتكامل والهندسة التحليلية، عمان: دار البشير 1989م.
- 3- سمور، خالد الرياضيات والهندسة التحليلية، عمان: دار الفكر ، ط 1، 1999م.

المراجع الاجنبية:

- Silverman R. A, Calculus with Analytic Geometry , New Jersey: Prentice – Hall,1985. – Stokowski , E. W , Calculus with Analytic Geometry Prindle , Weberand Schmidt, rded . 1984.
- Salas S. I , Calculus; one and Several Variables . Wiley , 1980.

