

سکشن (1) :-

سمیشل

فکرۃ المجموع :- $\sum$

المتغيرات $\leftarrow x, y, z$

الثوابت $\leftarrow a, b, c$

الرقم الى هنا
عنه

$\sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ $\rightarrow$ رقم x

لو $(i=2)$ $\leftarrow$ هنجم من اوله (x_2)

$\sum_{i=2}^3 x_i = x_2 + x_3$

ثابت
الحد
 $\sum_{i=1}^n c = nc$

$(x_1=2) (x_2=3) (x_3=4)$
 $(x_1=4) (x_2=6) (x_3=8)$ (x_2)
 $\sum_{i=1}^3 2x_i = 2x_1 + 2x_2 + 2x_3$
 $2(2) + 2(3) + 2(4) = 18$
 $\downarrow$
 $2 \sum_{i=1}^3 x_i = 2(x_1 + x_2 + x_3)$
 $= 2(9) = 18$

مسائل السكشن :-

	x	y
1	2	1
2	2	0
3	1	1
4	1	0
5	2	2
6	0	1
7	3	1

$\rightarrow \sum_{i=1}^7 xy = \sum x \sum y$

$\sum x^2 = (\sum x^2)$

$\sum x - y = \sum x - \sum y$

$\sum x^2 - y^2 = \sum (x - y)(x + y)$

$\sum (x - y)(x + y) = \sum (x - y) \sum (x + y)$

← رقم 1 - رقم 2 نضربهم في بعضنا ونجمعهم

X	y	xy	x ²	y ²	X-y	(x-y)(x+y)	x ² -y ²	x+y
2	1	2	4	1	1	3	3	3
2	0	0	4	0	2	4	4	2
1	1	1	1	1	0	0	0	2
1	0	0	1	0	1	1	1	1
2	2	4	4	4	0	0	0	4
2	0	0	0	1	-1	-1	-1	1
3	1	3	9	1	2	8	8	4
3								
11	6	10	23	8	5	15	15	17

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^7 xy &\neq \sum x \sum y & \sum x^2 &\neq (\sum x)^2 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 10 &\neq 66 & 23 &\neq 121 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum x - y &= \sum x - \sum y & \sum x^2 - y^2 &= \sum (x-y)(x+y) \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 5 &= 5 & 15 &= 15 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum (x-y)(x+y) &= \sum (x-y) \sum (x+y) \\ \downarrow & \downarrow \\ 15 &\neq 85 \end{aligned}$$

$$\bullet \sum_{i=1}^6 X_i = -4$$

$$\bullet \sum_{i=1}^6 X_i^2 = 10$$

المطلوب :

$$1 \rightarrow \sum_{i=1}^6 X_i (X_i - 1) = \sum X_i^2 - \sum X_i = 10 - (-4) = 14.$$

$$2 \rightarrow \sum_{i=1}^6 (2X_i + 3) = 2 \sum_{i=1}^6 X_i + 3(n) = 2(-4) + 3(6) = -8 + 18 = 10.$$

$$3 \rightarrow \sum_{i=1}^6 (X_i - 5)^2 = (\sum X_i^2 - 10 \sum X_i + 25n)$$

$$\sum X_i^2 - 10 \sum X_i + n(c)$$

$$10 - 10(-4) + 6(25) \rightarrow 10 + 40 + 150 = 200.$$

مربع أول
مربع ثاني
الاول * الثاني * 6
التي في
النتيجة

الزسمنت تفصیلاً :-

1
2
3
4
5
6
7

X

Y

2

1

2

0

1

1

1

0

2

2

0

1

3

1

$$1 - \sum_{i=1}^7 xy = \sum x \sum y$$

$$2 - \sum x^2 = (\sum x^2)$$

$$3 - \sum x - y = \sum x - \sum y$$

$$4 - \sum x^2 - y^2 = \sum (x - y) (x + y)$$

$$5 - \sum (x - y) (x + y) = \sum (x - y) \sum (x + y)$$

الحل :- آتہ رقم سے X ضربہ فی Y واحدہم فی الآخر

X	Y	XY	X ²	Y ²	X-Y	X+Y	X ² -Y ²	(X-Y)(X+Y)
2	1	2	4	1	1	3	3	3
2	0	0	4	0	2	2	4	4
1	1	1	1	1	0	2	0	0
1	0	0	1	0	1	1	1	1
2	2	4	4	4	0	4	0	0
0	1	0	0	1	-1	1	-1	-1
3	1	3	9	1	2	4	8	8
11	6	10	23	8	5	17	15	15

$$1 - \sum_{i=1}^7 xy = \sum x \sum y$$

$$10 = 11 \times 6 \rightarrow \boxed{10 \neq 66}$$

$$2 - \sum x^2 = (\sum x)^2$$

$$23 = 11^2 \rightarrow \boxed{23 \neq 121}$$

$$3 - \sum x - y = \sum x - \sum y$$

$$5 = 11 - 6 \rightarrow \boxed{5 = 5} \checkmark$$

$$4 - \sum x^2 - y^2 = \sum (x-y)(x+y)$$

$$23 - 8 = 15 \rightarrow \boxed{15 = 15} \checkmark$$

$$5 - \sum (x-y)(x+y) = \sum (x-y) \sum (x+y)$$

$$15 = 5 \times 7$$

$$\boxed{15 \neq 35}$$

← مساوية
على
2

$$6 - \sum (x-y) - \sum (x+y) = \sum (x-y)(x+y)$$

$$-12 \neq 15$$

مقدمة (2) جدول التوزيع التكراري

لأنه تحول من بيانات عادية إلى بيانات مبنية.

مثال البيانات العادية:

4, 11, 6, 8, 2

7, 6, 5, 10, 3

5, 7, 4, 10, 6

خطوات تأويل
الجدول

(1) المدى الكلي

الفرق بين أكبر قيمة وأقل قيمة.

$$\text{Range} = \text{Max} - \text{Min} \rightarrow = 11 - 2 = 9.$$

(2) عدد الفئات

$$n, \text{classes} = 1 + 3.3 \log(n) \rightarrow 1 + 3.3 \log(15) = 4.8 \approx (5)$$

لأنه عدد فئات كصغر.

(3) طول الفئة

$$\text{طول الفئة} = \frac{\text{المدى الكلي}}{\text{عدد الفئات}} = \frac{9}{5} = 1.8 \approx (2)$$

البيانات العادية أدق من البيانات المبنية، لأننا
في البيانات المبنية مشرقة موضحة بالتساوي الكافي وكمكان
ينحله للأرقام تقريبا.

الحد الأدنى للفترة
الحد الأعلى للفترة
الجدول

classes	tallap	f_i	x_i	$F_i <$	$F_i >$
الفئات	العلامات				
2-4	11	2	3	2	15
4-6	1111	4	5	6	13
6-8	11111	5	7	11	9
8-10	1	1	9	12	4
10-12	111	3	11	15	3

الحد الأعلى للفترة الأخيرة.
على العلامات بنافذ الأرقام من الفترة والنفس
يعني مثلاً (2-4) بنافذ (2-3) فقط.

الحد الأعلى للفترة + الحد الأدنى للفترة $\div 2 = x_i$
مركز الفترة


عدد الأفراد الأقل من الحد الأعلى للفترة $F_i <$
العبارة منها

التكرار التجميعي
الصاعد


التكرار التجميعي الصاعد = التكرار المطلق
عند ما يكون الجدول منتظماً

F_i يساوي F_i ناقص الحد الأعلى للفترة

① المخطط التكراري




② المخطط التكراري ③ المخطط التكراري



المتكرر التجميعي الصاعد

② التكرار التجميعي الصاعد
③ التكرار التجميعي الهابط




المتكرر جدول التوزيع التكراري مع رسم:
المتكرر التكراري - المتكرر التكراري - المتكرر التكراري
المتكرر التجميعي الصاعد - التكرار التجميعي الهابط


Classes	f_i	x_i	$P<$	$P>$
0-10	---	5	4	44
10-20	7	---	---	---
---	---	25	20	---
30-40	---	---	35	---
---	5	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	1

حل الاسئلة


الفئات	f_i	x_i	f_c	f_{7i}
0-10	4	5	4	4.4
10-20	7	15	11	4.0
20-30	9	25	20	3.3
30-40	15	35	35	2.4
40-50	5	45	40	9
50-60	3	55	43	4
60-70	1	65	44	1

① المبرج التكراري





④ التكرار التجسيمي الماعد.
⑤ التكرار التجسيمي الهابط.



مقاييس النزعة المركزية

سلسلة (3) :

1) $(\bar{X}_A)$ Mean → المتوسط الحسابي

2) (Median) → الوسيط

3) (Mode) → المنوال

4) $(\bar{X}_G)$ → المتوسط الهندسي

5) $(\bar{X}_H)$ → المتوسط التوافقي

المتوسط الحسابي

$$\bar{X}_i = \frac{\sum X_i}{n} = \frac{2+3+4}{3} = 3 \quad 2, 3, 4.$$

2, 1, 5, 4, 7 → 1, 2, 4, 5, 7.

الوسيط

في حالة الفردى ← $\frac{n+1}{2} = 3$ الرتبة

1, 2, 4, 5, 7, 7

الوسيط

في حالة الزوجي ← $\frac{4+5}{2} = 4.5$

• الوسيط في الزوجي $\left(\frac{n}{2} + 1 \text{ و } \frac{n}{2}\right)$ هنجمع الرقمين

الـ ٢ ونقسم على 2.

• الوسيط في الزوجي أو الفردى بيطلع على حسب المسألة
ممثلة أمثاله وممكنة لا

• المثال :- القيمة التي تكرر

لا يوجد مثال $(1, 2, 2, 3, 1, 3)$ →

المثال هنا (2) . $(1, 2, 2, 3)$ →

• المتوسط الهندسي $\sqrt[n]{(x_1)(x_2) \dots (x_n)} = \sqrt[3]{(2)(3)(4)} = 2.8$

$\bar{x}_G$ $\leftarrow \frac{\sum \log x_i}{n} = \frac{\log x_1 + \log x_2 + \log x_3}{3}$

$= \frac{\log(2) + \log(3) + \log(4)}{3} = 0.46$

• $\text{Shift} \log(0.46) = 2.8$

مقلوب المتوسط الحسابي

$$\bar{X} = \frac{\sum X}{n}$$

• المتوسط التوافقي

$$\bar{X}_H = \frac{N}{\sum \frac{1}{X}} = \frac{3}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4}} = 2.7$$

$$\bar{X}_A = 3$$

$$\bar{X}_G = 2.8$$

• المتوسط التوافقي = المتوسط الحسابي عندما تكون الأرقام متساوية

$$\bar{X}_A > \bar{X}_G > \bar{X}_H$$

لون الثمرة	برتقالي	أصفر	أصفر	أصفر	أصفر	أخضر
وزن الثمرة	50.5	52.4	55	56	51	48
غلاف الثمرة (فطريات)	1120	1150	515	40	14	321512
درجة حرارة التخزين	-2	0	1	2	3	4
نسبة الرطوبة	7.70	7.50	7.77	7.80	7.81	7.15

• في لون الثمرة لمستخدم (الحناء).

• في وزن الثمرة لمستخدم (المتوسط الحسابي).

• غلاف الثمرة لمستخدم (المتوسط الهندسي).

• درجة حرارة التخزين لمستخدم (المتوسط الحسابي).

• نسبة الرطوبة لمستخدم (الوسيط).

لأنه عشوائياً فيه قيمة شاذة.

(لأنه مفضل سالب تحت الجذر و
 zero سالب و لا zero ولا
 جذر zero)

مش لمستخدم الهندسي
 ولا التوافقي

$$\sum (X_i - \bar{X}) = \text{Zero}.$$

(ثابت $\rightarrow \bar{X}$) ($X_i \leftarrow$ متغير)

← المتوسط المرجح

أحادي

$$\begin{array}{l} 85 = 90 \\ 85 = 85 \end{array}$$



$$83 = \frac{(2 \times 90) + (3 \times 85)}{5}$$

$$85 = \frac{(2 \times 85) + (5 \times 85)}{5}$$

$$\begin{aligned} \bar{X}_w &= \frac{(w_1)(X_1) + (w_2)(X_2) + \dots + (w_n)(X_n)}{w_1 + w_2 + \dots + w_n} \\ &= \frac{\sum w_i X_i}{\sum w_i} \end{aligned}$$

مثال ١

١- إذا انتقل شخص من منطقة A لمنطقة B لمتوسط سرعة ٥٥ كم/س ورجع لمتوسط سرعة ٦٥ كم/س أصعب متوسط السرعة الخاصة به ذهاباً وإياباً؟

2- مصنع به (100) عامل به (60) عامل يحصل على (15) دولار
وآخر يحصل على (25) دولار احسب
متوسط الأرباح؟

3- احسب: 1) الوسيط . 2) المنوال . 3) المتوسط
الحسابي . 4) المتوسط التوافقي . 5) المتوسط الهندسي .

3, 5, 2, 6, 5, 9, 2, 8, 6.

~~80.3~~ 80.3, 79.5, 78.2, 80.6, 78.7.